

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986
يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

ريفوتريل
2.5 ملغ/ملل
قطرات

المادة الفعّالة

يحتوي 1 ملل ريفوتريل على:

كلونازيبام 2.5 ملغ (clonazepam 2.5 mg)

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية في المستحضر: انظر الفصل 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

ينتمي هذا الدواء إلى مجموعة البنزوديازيبينات، ذات الخصائص المميزة التي تتطلب توخي الحذر الشديد عند استعمالها. هنالك أهمية كبيرة لمتابعة طبية حثيثة عند تناول هذا الدواء.

عندما تتناول هذا الدواء، احرص على التوجه إلى الطبيب بعد 2 حتى 4 أسابيع، لأن العلاج معدّ لفترات قصيرة فقط. قد يسبب الاستعمال المتواصل للدواء تقليل تأثير الدواء.

قد يؤدي الاستعمال المتواصل إلى عرض خطير من التعلّق، ما يصعب على المريض إيقاف تناول الدواء. قد يكون إيقاف العلاج غير المراقب مصحوبًا بأعراض فطام، مثل توتر، عصبية، ارتباك، رجفة، أرق، آلام في البطن، حالات تقبؤ، غثيان، تعرّق، تشنجات.

قد يؤدي أحيانًا استعمال الدواء بشكل متواصل إلى تغييرات في أنماط السلوكيات وإلى أفكار مزعجة. يوصى لدى المسنين بشكل خاص بتوخي الحذر أثناء المشي، لأن الدواء يلحق ضررًا باليقظة وبتناسق حركات الجسم أحيانًا، لذلك يخشى من الانزلاق أو السقوط.

قد يؤدي تناول هذا الدواء مع أدوية من مجموعة الأفيونيات، أدوية أخرى تثبط جهاز الأعصاب المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو الكحول إلى الشعور بالنعاس العميق، صعوبات في التنفّس (تثبيط تنفسي)، غيبوبة وإلى الوفاة.

1. لم أعد هذا الدواء؟

الدواء معدّ لعلاج الصرع (epilepsy) أو نوبات القلق.

المجموعة العلاجية:

ينتمي ريفوتريل إلى مجموعة أدوية تدعى البنزوديازيبينات.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعّالة كلونازيبام أو لأي بنزوديازيبين آخر أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر الفصل 6 - "معلومات إضافية"). يمكن أن تكون الأعراض لرد فعل تحسسي ضيق تنفس، حالات صفيبر أو صعوبات في التنفس، انتفاخ في الوجه، الشفتين، اللسان أو أجزاء أخرى في الجسم، طفح، حكة أو شرى.
- كان لديك قصور كبد خطير لأن البنزوديازيبينات قد تسرّع الاعتلال الدماغي الكبدي.
- تطور لديك إدمان/تعلّق بمخدرات تسبب الإدمان، بما في ذلك الكحول.
- يوجد لديك مرض مزمن خطير في الرئتين.
- يوجد لديك مرض خطير في الكبد.

تحذيرات خاصة متعلّقة باستعمال الدواء

المخاطر المتعلقة بالإدمان أكبر بالنسبة للمتعالجين بجرعات مرتفعة أو علاج طويل الأمد، أو لدى المتعالجين الذين لديهم سابقة لإدمان الكحول أو تعاطي المخدرات. يجب تناول ريفوترييل على شكل قطرات فقط. انظر الفصل 3 – "كيف تستعمل الدواء؟" لمزيد من المعلومات. إذا لم تكن متأكدًا، فيما إذا كان يتعين عليك استعمال ريفوترييل، توجه إلى الطبيب.

قبل بدء العلاج ب ريفوترييل أخبر الطبيب إذا

- كنتِ حاملاً أو تخططين للحمل
- كنتِ مرضعة أو تخططين للإرضاع
- كانت لديك مشاكل صحية بما في ذلك:
 - مرض في الكبد، الكلية أو الرئة
 - ضغط دم مرتفع أو منخفض
 - وهن عضلي وبيل (ضعف عضلات شديد)
 - انقطاع النفس (حالة تتعرض فيها لانقطاع التنفس المؤقت خلال النوم)
 - جلوكوما (حالة يكون فيها لديك ضغط مرتفع في العين)
 - اكتئاب، ذهان أو فصام و/أو إذا كان لديك اكتئاب أو أفكار انتحارية
 - فرقرية (اضطراب نادر في صبغة الدم)
 - سابقة من سوء استعمال الكحول أو المخدرات
 - إذا كنت تشرب الكحول

تحذيرات إضافية

- أخبر الطبيب، طبيب الأسنان، والصيدلي الذين يعالجونك بأنك تتناول ريفوترييل.
- أخبر الطبيب إذا لم تتناول المستحضر لأي سبب كان وفق تعليماته. وذلك لأن الطبيب قد يعتقد أن المستحضر ليس ناجعاً وقد يغير علاجك دون الحاجة إلى ذلك.
- أخبر الطبيب إذا كنت تشعر أن ريفوترييل لا يساعد في حالتك الطبية.
- يجب الحرص على الخضوع لمراقبة طبية متواصلة.
- يجب التعامل بجدية مع أي تصريح يشير إلى الانتحار أو العنف. أخبر طبيبك فوراً إذا كانت لديك أي أفكار انتحارية أو تغييرات نفسية/مزاجية أخرى مثل عدم راحة، عدوانية، غضب، هلوسات، أو أي أعراض جانبية سلوكية أو تصرفات غير عادية.
- يُمنع استعمال ريفوترييل لعلاج حالات طبية أخرى دون تعليمات من الطبيب.
- يجب توخي الحذر لدى المسنين، المتعالجين الذين يتناولهم شعور غير جيد بعد استهلاك الكحول أو بعد تناول أدوية أخرى.
- قد يشعر بعض المستعملين بأعراض جانبية مثل النعاس، الارتباك، الدوار أو نقص الثبات وقد تزيد هذه الأعراض خطر حالات السقوط.

الأطفال والمراهقون

إن أمان ونجاعة ريفوترييل لعلاج نوبات القلق لدى الأطفال دون عمر 18 سنة غير معروفين.

الفحوصات والمتابعة

خلال فترة العلاج ب ريفوترييل، قد يطلب منك الطبيب إجراء فحوصات دم وفحوصات أخرى بين حين وآخر لفحص تقدمك واكتشاف أعراض جانبية.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول:

- أقراص للنوم، أدوية للنوم أو أدوية مهدئة
- أدوية للاكتئاب
- أدوية للصرع
- أدوية للحساسية أو للرشح مثل مضادات الهيستامين
- مُسكِّنات الألم
- مرخيات العضلات
- مواد مخدرة
- سيميبتيدين – دواء يُستعمل لعلاج النقرحات
- ديسولفيرام – دواء يستعمل لعلاج إساءة استعمال الكحول

قد تتأثر هذه الأدوية من ريفوتريل أو قد تؤثر هذه الأدوية في طريقة عمل ريفوتريل. يمكن أن يخبرك الطبيب أو الصيدلي ما الذي عليك القيام به إذا كنت تتناول أي من هذه الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، لديهما قائمة أكبر بالأدوية التي تتطلب توخي الحذر أو الامتناع عن تناولها عند تناول ريفوتريل.

تناول الأدوية التي تثبط الجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك المخدرات غير القانونية)/أدوية مهدنة
يمنع تناول الأدوية التي تثبط الجهاز العصبي المركزي، مثل أدوية مهدنة والأدوية المنومة، أثناء استعمال ريفوتريل. قد تزيد هذه الأدوية من تأثيرات ريفوتريل، مما قد يتجلى بأعراض جانبية خطيرة، بما في ذلك نعاس شديد، صعوبات في التنفس، غيبوبة ووفاة.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول
لا تشرب الكحول عندما تتناول ريفوتريل. قد يزيد الكحول تأثيرات ريفوتريل وقد يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة، التي قد تنتهي بحدوث غيبوبة أو وفاة.

الحمل والإرضاع
إذا كنت حاملاً، تخططين للحمل أو مرضعة أو تخططين للإرضاع فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

الحمل
إذا كانت هناك حاجة إلى تناول ريفوتريل عندما تكونين حاملاً، فسوف يناقش الطبيب معك المخاطر والفائدة لك وللجنين. الأمهات اللاتي يتناولن أكثر من دواء واحد لعلاج الصرع قد يتعرضن لخطر متزايد لحدوث تشوهات جنينية مقارنة بالأمهات اللاتي يتناولن دواء واحد فقط للصرع.
تناول ريفوتريل أثناء الحمل قد يتسبب في أعراض الفطام لدى الرضيع، مثل انخفاض درجة حرارة الجسم، ارتخاء الأطراف، مشاكل في الإطعام وصعوبات التنفس.

الإرضاع
إذا كنتِ مرضعة أو تخططين للإرضاع: ينتقل ريفوتريل إلى حليب الأم وقد يسبب النعاس و/أو صعوبات في الإطعام. لا يوصى باستعمال ريفوتريل أثناء الإرضاع.

السياسة واستعمال الماكينات
لا يجوز القيادة أو تشغيل الماكينات حتى تعرف كيف يؤثر المستحضر عليك.
قد يؤدي ريفوتريل إلى النعاس أو الدوار لدى بعض المتعالجين، لهذا قد يؤثر في اليقظة.
تأكد من أنك تعرف كيف يؤثر المستحضر عليك قبل أن تقود سيارة أو تشغيل مكنات أو تقوم بأي نشاط آخر قد يكون خطيراً إذا كنت تشعر بالنعاس، الدوار أو من عدم اليقظة.
بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو من اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.
يمكن تناول ريفوتريل مع طعام أو من دونه.

الجرعة المتبعة في داء الصرع
يجب ملائمة جرعة ريفوتريل لكل متعالج على حدة وفق إستجابة المتعالج السريرية، تحمّل الدواء، وعمر المتعالج.
تبدأ جرعة واحدة عن طريق البلع من ريفوتريل بالتأثير خلال 30-60 دقيقة ويظل هذا التأثير ناجحاً لمدة 6-8 ساعات لدى الأطفال و- 8-12 ساعة لدى البالغين.

لتجنب حدوث أعراض جانبية عند بدء العلاج، من المهم بدء العلاج ب ريفوتريل بجرعة منخفضة ورفع الجرعة اليومية تدريجياً حتى الوصول إلى جرعة الصيانة الملائمة لكل متعالج على حدة.

الأطفال الصغار والأطفال حتى عمر 10 سنوات (أو حتى وزن 30 كغم): الجرعة الابتدائية هي 0.01-0.03 ملغ لكل كغم من وزن الجسم في اليوم، تُعطى في 2-3 جرعات مقسمة. الجرعة اليومية القصوى للأطفال هي 0.2 ملغ لكل كغم من وزن الجسم ويجب عدم تجاوزها.

الأطفال بأعمار 10 حتى 16 سنة: الجرعة الابتدائية هي 1.5-1 ملغ لليوم تُعطى في 2-3 جرعات مقسمة. يتم رفع الجرعة تدريجيًا حتى الوصول إلى جرعة الصيانة الشخصية (عادة 3-6 ملغ في اليوم).
البالغون: يُمنع تجاوز الجرعة الابتدائية للبالغين وهي 1.5 ملغ لليوم مقسمة على 3 جرعات. عادة ما تكون جرعة الصيانة من 3-6 ملغ في اليوم كافية. الجرعة القصوى للبالغين هي 20 ملغ في اليوم ويجب عدم تجاوزها.

يجب تقسيم الجرعة اليومية إلى 3 جرعات متساوية. إذا لم تُقسم الجرعات بشكل متساوٍ، يجب تناول الجرعة الأكبر قبل النوم. يتم التوصل إلى مستوى جرعة الصيانة بأفضل شكل بعد علاج مدته 3-1 أسابيع. بعد التوصل إلى مستوى جرعة الصيانة، يمكن تناول الكمية اليومية في جرعة واحدة في المساء.

الجرعة المتبعة في نوبات القلق

الجرعة الابتدائية للبالغين الذين لديهم قلق هي 0.25 ملغ مرتين في اليوم (0.5 ملغ في اليوم).

جرعة الصيانة الاعتيادية للبالغين هي 1 ملغ مرتين في اليوم (2 ملغ في اليوم). في حالات شاذة، قد يصف الطبيب جرعة قصوى مقدارها 2 ملغ مرتين في اليوم (4 ملغ في اليوم).

بعد التوصل إلى جرعة ثابتة، يمكن للمعالجين أن يستبدلوا الجرعة بجرعة واحدة في اليوم، تُعطى قبل النوم عادة. يجب إيقاف العلاج تدريجيًا.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

عليك قياس جرعة ريفوتريل التي تم وصفها على شكل قطرات فقط.

لا يجوز التقطير من الفنتينة في الفم مباشرة.

بعد كل إعطاء، تأكد من أن القطارة في مكانها في عنق الفنتينة. يجب إعطاء القطرات بمعلقة صغيرة.

بعد كل مرة تفتح فيها الفنتينة، تأكد من أن القطارة مثبتة في مكانها في عنق الفنتينة.

يمكن تخفيف مستحضر ريفوتريل بالماء، الشاي أو شراب الفواكه.

يجب مواصلة تناول ريفوتريل حتى يطلب منك الطبيب إيقافه. يُمنع تناول المستحضر لفترة أطول من تلك التي وصفها لك الطبيب.

إذا لم تكن متأكدًا فيما عليك القيام به أسأل الطبيب أو الصيدلي.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى

إذا كنت تعتقد أنك أنت أو أي شخص آخر قد تناولت جرعة مفرطة من ريفوتريل، أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، أخبر الطبيب بذلك فورًا أو توجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، مصطحبًا عبوة الدواء معك. قم بذلك حتى إذا لم تكن لديك علامات انزعاج أو التسمم. من شأنك أن تحتاج إلى علاج طبي طارئ. إذا تناولت كمية أكبر مما ينبغي من ريفوتريل فقد تشعر بنعاس، إرهاق، ارتباك، دوار، تعاني من صعوبات في التنفس، ضعف أو قد تتعرض لفقدان الوعي.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا حان تقريبًا موعد تناول جرعتك التالية، تخطّ الجرعة المنسية وتناول الجرعة التالية في الوقت المحدد. إذا لم يكن الأمر كذلك، تناول الجرعة المنسية فور تذكرك وبعد ذلك واصل تناول الدواء كالمعتاد. يُمنع تناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

يجب خفض الجرعة أو إيقاف العلاج وفق تعليمات الطبيب وبشكل تدريجي. قد يسبب إيقاف العلاج بـ ريفوتريل فجأة ظهور أعراض غير مرغوب بها. سيشرح لك الطبيب كيف عليك تقليل جرعة ريفوتريل تدريجيًا حتى تتمكن من إيقاف استعماله كليًا.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال ريفوتريل أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها. قد تحتاج إلى علاج طبي إذا اختبرت بعض الأعراض الجانبية. أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي في أسرع وقت ممكن إذا شعرت بسوء خلال العلاج بـ ريفوتريل.

أعراض جانبية خطيرة

يجب التوجه إلى الطبيب فورًا أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى القريب من منزلك إذا شعرت بأحد ما يلي:

- صعوبات في التنفس
 - قلق أو توتر مفاجئين
 - هلوسات أو أفكار باطلة
 - اضطرابات شديدة في النوم
 - أعراض فطام شديدة بعد التوقف عن العلاج بـ ريفوتريل (بما في ذلك الاضطرابات النفسية مثل هلوسات، الشعور بالانفصال عن الجسم، ارتباك، هذيان، حالات ذهان).
- هذه الأعراض الجانبية نادرة.

أعراض جانبية أقل خطورة

أخبر الطبيب إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية التالية:

- نعاس، إرهاق
- دوار، نقص الثبات
- ضعف العضلات
- رجفة
- مشاكل في الذاكرة، نقص الانتباه، ارتباك، نقص التركيز
- صداع، شعور بخُمار (hangover) في الصباح
- كلام غير واضح (بلع كلمات)
- أحلام غير لطيفة
- خفقان القلب
- حالات تقيؤ

أعراض جانبية إضافية:

- نعاس
- دوار
- تناسق غير سليم
- ترنح
- خلل في النطق
- اكتئاب
- اضطرابات في الذاكرة
- عصبية
- فقدان القدرة الذهنية
- عدم استقرار عاطفي
- انخفاض الرغبة الجنسية (libido)
- ارتباك
- عدوى في المسالك التنفسية العلوية
- التهاب الجيوب الأنفية
- التهاب الأنف
- سعال

- التهاب البلعوم
- التهاب الشعب الهوائية
- إمساك
- انخفاض الشهية
- ألم في البطن
- إرهاق
- رد فعل تحسسي
- آلام في العضلات
- إنفلونزا
- تبول متكرر
- عدوى في المسالك البولية
- تشوش الرؤية
- النساء: آلام الطمث، التهاب في المهبل
- الرجال: تأخر في قذف المنى، عجز جنسي
- الجسم عمومًا: ارتفاع الوزن، حادث، انخفاض الوزن، جرح، وذمة، سخونة، قشعريرة، خدوش، وذمة في الكاحل، وذمة في الرجل، وذمة حول العينين، الشعور بتوعلك، ألم، التهاب في النسيج تحت الجلد (cellulitis)، التهاب موضعي.
- اضطرابات في القلب: ألم في الصدر، انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف
- اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي: الشقيقة، تنميل، ثمالة، شعور بعدم السيطرة على التبول، شلل نصفي، رجفة، حرقة في الجلد، حالات سقوط، ثقل الرأس، بحّة، فرط النشاط، خدر، لسان سميك، تشنجات.
- اضطرابات في الجهاز الهضمي: انزعاج في البطن، التهاب في الجهاز الهضمي، فساد المعدة، ألم في الأسنان، انتفاخ، حرقان، فرط اللعاب، اضطرابات في الأسنان، حركات أمعاء (تغوطات) متكررة، ألم في الحوض، صعوبات في الهضم، بواسير
- اضطرابات في السمع والأذنين: دوار، التهاب الأذنين، آلام في الأذنين، داء السفر
- اضطرابات نظم القلب: خفقان القلب
- اضطرابات في الأيض والتغذية: عطش، نقرس
- اضطرابات في جهاز العضلات-الهيكل العظمي: ألم في الظهر، كسر رضخي، التواء، ألم في الرجل، ألم في الجزء الخلفي من الرقبة، تشنجات في العضلات، تشنجات في الرجل، ألم في الكاحل، ألم في الكتف، التهاب في الوتر، ألم في المفصل، فرط التوتر، ألم في الظهر السفلي (lumbago)، ألم في راحتي القدمين، ألم في الفك، ألم في الركبة، انتفاخ الركبة
- اضطرابات في جهاز الدم: نزيف جلدي
- اضطرابات نفسية: أرق، إزالة الكبح، قلق، شعور بالانفصال عن الجسم، أحلام مبالغ بها، زيادة الشهية، زيادة الرغبة الجنسية (libido)، انخفاض ردود الفعل، عدوانية، لا مبالاة، اضطراب في التركيز، انفعال، غضب، جوع شاذ، أوهام، كوابيس، اضطراب في النوم، أفكار انتحارية، تناؤبات
- اضطراب في الجهاز التناسلي الأنثوي: ألم في الثديين، طمث غير منتظم
- اضطرابات في الجهاز التناسلي الذكري: انخفاض قذف المنى
- اضطرابات في أجهزة المقاومة: عدوى فطرية، عدوى فيروسية، عدوى المكورات العقدية، عدوى الهربس البسيط، عدوى كثرة الوحيدات العدائية، داء المبيضات
- اضطرابات في الجهاز التنفسي: فرط العطس، نوبة ربو، ضيق في التنفس، رعاف، التهاب في الرئتين، التهاب الجنبة (pleuritis)
- اضطرابات الجلد وملحقاته: اندلاع حب الشباب، صلح، جفاف الجلد، التهاب الجلد التماسي، تورّد، حكة، رد فعل قيحي، حروق في الجلد، اضطرابات في الجلد
- اضطرابات في الحواس: فقدان حاسة التذوق
- اضطرابات في جهاز البول: ألم أثناء التبول، التهاب في المثانة، فرط التبول، عدم السيطرة على التبول، خلل في أداء المثانة، احتباس البول، نزيف في جهاز البول، تغيير لون البول
- اضطرابات في الأوعية الدموية: التهاب الأوردة الخثاري في الرجل (thrombophlebitis)
- اضطرابات في الرؤية: تهيج العين، اضطرابات في الرؤية، رؤية مزدوجة، تشنجات في العين، شحاذ العين، خلل في مجال الرؤية، جفاف العين

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

تبلغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية جراء علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة والقنينة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

- يُمنع التخزين في درجة حرارة تزيد عن 25°C. يجب تخزين القنينة بوضعية عمودية.
- يمكن استعمال الدواء حتى 120 يومًا منذ فتحه.
- في حالة وجود شكّ، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
- تخلص بشكل ملائم من أي دواء غير مستعمل. يُمنع إلقاء الأدوية في سلّة المهملات في البيت أو مياه الصرف الصحيّ. اسأل الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص أدوية التي لم تعد بحاجة إليها. هذه الخطوات ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعّال، يحتوي الدواء أيضًا على:

peach flavour, saccharin sodium, brilliant blue FCF, acetic acid glacial, propylene glycol.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة: يسوق دواء ريفوتريل على شكل قطرات رائقة، بلون أزرق معدة للابتلاع. تحتوي كل عبوة على قنينة زجاجية واحدة فيها 10 ملل من ريفوتريل.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه: س.م.ل بيو فارما م.ض.، شارع هماچشيميم 20، بيتح تكفا

اسم المنتج وعنوانه:

Cheplapharm Arzneimittel GMBH Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germany

تم تحريرها في آب 2024.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 061-31-21476-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.