

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקנירים) התשמ"ג – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

**פקפנט 100
פקפנט 400**

תרסיס לאף

חומר פעיל
פקפנט 100: כל לחיצה של פקפנט 100 (0.1 מיליליטר) מכילה 100 מק"ג של פנטניל (כzieptrاط) - *fentanyl (as citrate)*.
כל 1 מ"ל תמיסה של פקפנט 100 מכיל 1000 מק"ג של פנטניל (כzieptrاط) - *fentanyl (as citrate)*.

פקפנט 400: כל לחיצה של פקפנט 400 (0.1 מיליליטר) מכילה 400 מק"ג של פנטניל (כzieptrاط) - *fentanyl (as citrate)*.
כל 1 מ"ל תמיסה של פקפנט 400 מכיל 4000 מק"ג של פנטניל (כzieptrاط) - *fentanyl (as citrate)*.

חומרים בלתי פעילים: ראה פרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העיון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עיון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

בנוספּ לעיון, לתוכשיר פקפנט קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופּ.
כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעלייך לדעת לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בפקפנט ולפעול על פיו.
יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופּ ובעיון לצריכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר.
יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

שים לב:

- תרופה זו מותרת לשימוש רק אם אתה משתמש באופיאידים אחרים.
- בכל בקבוק יש אפשרות ל-8 לחיצות משחררות תרופה בלבד!
- עלייך לקרוא את הוראות השימוש על מנת להבטיח אופן שימוש נכון בתכשיר.
- אם הרופא הורה על מינון של שתי לחיצות, יש לבצע **לחיצה אחת בכל נחיר** ולא שתי לחיצות בנחיר אחד! אין לעבור על המינה המומלצת או לשנות את המינון על דעת עצמן.
- עלייך לשמור את התרופה במאגר אחסון המגן מפני ילדים **כל הזמן** אפילו סוף השימוש או סיום הת酰ולה.
- אין לצרוך אלכוהול במשך כל תקופה השימוש בפקפנט. צריכת אלכוהול עלולה לגרום לעלייה בסיכון לתופעות לוואי חמורות.

נטילת תרופה זו עם תרופות משפחת הבנזודיאזפינים, תרופות אחרות המדכאות מערכת עצבים מרכזית (כולל סמים) או אלכוהול עלולה לגרום לתחושות ישנות עמוקה, קשה נשימה (דיכוי נשימת), תרדמת ומומות.

תרופות משפחת האופיאטים עלולות לגרום להתמכרות, בעיקר בשימוש ממושך, והן עלולות פוטנציאלי לשימוש לרעה ולמין יתר. תגובה למינון יתר יכולה להתבטא בנשימה איטית ואף לארום מוות.

ודא כי אתה מכיר את שם התרופה, המינון שאתה לוקח, תדירות המtan, משך הטיפול, תופעות הללוואי והסיכונים הפוטנציאליים.

מידע נוסף אודות הסיכון לתלות והתמכרות ניתן למצוא בקישור:

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

1. למה מיעדת התרופה?

פקפנט מיועד לטיפול בחולי סרטן מבוגרים אשר סובלים מכאב מתפרץ.

כאב מתפרץ הוא כאב אשר מופיע באופן פתאומי, אפילו כאשר המטופל נמצא תחת טיפול רגיל בתרופות אופיוואידיות לשיכור כאבים קבועים (כמו מורפין, פנטניל, אוקסיקודון או הידромורפון). פקפנט ינתן רק לחולי סרטן מבוגרים שכבר נטלים תרופות אופיוואידיות אחרות על בסיס יומי לשיכור כאבים קבועים.

כיצד עובד פקפנט?

פקפנט הוא תרסיס לאף. כאשר אתה מתייז פקפנט לטור האף משחררות טיפות זעירות של גל, החומר הפעיל נספג במחירות דרך רירית האף למוחו הדם, וכך מקל במחירות על הכאב המתפרץ שאתה חש.

קובוצה רפואייתית: משכך כאבים חזק השיר לקבוצה משככי כאבים אופיוואידים (נרקוטיים).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לפנטניל או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).
- אתה לא משתמש בקביעות בתרופה מרשם מסווג אופיוואיד (למשל קודאין, פנטניל, הידромורפון, מורפין, אוקסיקודון, פטידין),mdi يوم ובזמנים קבועים, במשך שבוע לפחות, לשילטה על כאבר המתמשך. אם אתה לא משתמש בתרופות אלו, אסור לך להשתמש בפקפנט, מכיוון שפקפנט עלול להעלות את הסיכון לנשימה איטית באופן מסוכן ו/או שטchiaת או להפסיק נשימה.
- אתה סובל מכאב קצר טוויה השונה מכאב מתפרץ.
- אתה סובל מבעיות נשימה או ריאה חמורות.
- אתה מטופל בתרופות המכילות סודיום אוקיסיבאט.

אם אחד מהן'ל חל עלייך, אין להשתמש בפקפנט. אם אין בטוח, פנה אל הרופא או הרוקח לפני השימוש בפקפנט.

اذhorות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

יש לשמר את התרופה במקום בטוח ומأובטח, שבו אנשים אחרים אינם יכולים לגשת אליו.

- יש לשמר את התרופה במארך אחסון המגן מפני ילדים **כל הזמן**, אפילו אחרי שימוש את כל 8 החליצות. פקפנט יכול לגרום לסכנת חיים אם ילקח בטעות על ידי הילד.
- פקפנט לא מאושר לשימוש ילדים מתחת לגיל 18.
- פקפנט מכיל חומר משמר (E216) propyl parahydroxybenzoate. חומר זה עלול לגרום לתגובה אלרגית (ייתכן שיהיה תגובה תגבות מושחת) ולעתים נדירות מאוד לגרום לכיווץ בסמפוניות (bronchospasm) אם אתה משתמש בתכשיר באופן לא נכון.

לפני השימוש בפקפנט התיעץ עם הרופא או הרוקח במקרים הבאים:

- אם אתה ספורטאי, שימוש בפקפנט עלול לגרום לתזאה חיובית בבדיקה לגלי סמים.
- אם במשך זמן מסוים לא השתמשת באوتה המנה של משכך הכאבים האופיוואיד היומי עבר כאבר המתמשך.
- אם אתה סובל מבעיות נשימה כמו אסתמה, צפצופים או קוצר נשימה.
- אם סבלת ממכה חמורה בראש.
- אם יש לך בעיות לב במין מיוחד קצב לב איטי.
- אם יש לך לחץ דם נמוך או כמות נמוכה של נזלים במוחו הדם.

- אם יש לך בעיות כבד או כליה, לאחר שאלות עלולות להשפיע על האופן בו הגוף מפרק את התרפופה.
- אם אתה לוקח תרופות נגד דיכאון או תרופות אנטי פסיקטיביות (יש לעיין בפרק "אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות").

אם אחד מהן"ל חל עלייך (או איןך בטוח), פנה לרופא או לרוקח לפני השימוש בפקפנט.

- "תכן שהרופא יבצע בדיקה מעמיקה יותר אם:
- אתה או מי מבני משפחתך השתמש לרעה או היה תלוי באלכוהול, בתרופות מרשם או בסמים ("התמכרות").
 - אתה מעשן.
 - הוא לך בעיות הקשורות למצב רוח (דיכאון, חרדה, או הפרעת אישיות) או טיפול על ידי פסיקיאטר בשל מחלות נפש אחרות.

היוודעך ברופא במהלך השימוש בפקפנט אם:

- אתה סובל מדימומיים חוזרים מהאף. הרופא עשוי להציג לך טיפול חולפי.
- אתה מרגיש שפקפנט הופך להיות פחותiesel בעל טיפול באירועי כאב המתפרץ.
- אתה חווית כאב או רגשות מוגברת לכאב (היפראלגזיה) אשר אינם מגיבים למינון גובה יותר של התרפופה כפי שנרשמה לך על ידי הרופא.
- אתה חושב שאתה מפתח תלוות בפקפנט.
- אתה חווית שילוב של התסמינים הבאים: בחילה, הקאה, אובדן תיאנון, עייפות, חולשה, סחרחות ולחץ דם נמוך. תסמינים אלו ייחד עלולים להיות סימן למצב העולם לסיכון חיים שנקרוא כשל יותרת הכליה, מצב בו בלוטות יותרת הכליה אין מייצרות מספיק הורמוניים.
- סבלת בעבר מכשל יותרת הכליה או חוסר בהורמוניים מין (חסר אנדרוגנין) עם שימוש באופיאידים.

הפרעות נשימה הקשורות בשינה
פקפנט עלול לגרום להפרעות נשימה הקשורות בשינה כגון דום נשימה בזמן שינה (אפניאה בשינה) ורמות נמוכות של חמצן בدم בזמן שינה (היפוקסמייה בשינה). התסמינים כוללים הפסיקות נשימה בזמן שינה, התעוררות בלילה בשל קוצר נשימה, קושי בשינה רצופה או ישנות יתר במהלך היום. אם אתה או אדם אחר מבחין בתסמינים אלה, צור קשר עם הרופא. יתכן שהוא ישוקו הורדת מין.

שימוש לטוווח ארוך וסבירות
תרופה זו מכילה פנטיל שחייבת תרופה אופיאידית. שימוש חזק במשככי כאבים אופיאידיים עלול לגרום לכך שהתרופה תהיה פחות יעילה (אתה מתרגל אליה, המכונה סבירותות לתרופות). אתה עלול גם להיות רגיש יותר לכאב בזמן השימוש בפקפנט. זה ידוע בשם היפראלגיה. הגדלה המינון של פקפנט עשויה לעוזר להפחית עוד יותר את הכאב לדין מה, אך היא גם עלולה להזדקק. אם אתה שם לב שהתרופה שלר הופכת פחות יעילה, שוחח עם הרופא שלר. הרופא שלר יחליט אם עדיף לך להעלות את המינון או להפחית בהדרגה את השימוש בפקפנט.

תלוות והתכרכרות
שימוש חזק בפקפנט יכול גם להוביל לתלוות, שימוש לרעה והתכרכרות שלולים לגרום למין
יתר מסכן חיים. הסיכון לתופעות לוואי יכול לעלות עם מינון גובה יותר ומשך שימוש ארוך יותר. תלות או התכרחות יכולות לגרום לך להרגיש שאתת כבר לא שולט בנסיבות התרפופה שאתה צריך להשתמש או באיזו תדירות אתה צריך להשתמש בה. אתה עשוי להרגיש שאתת צריך להמשיך להשתמש בתרפופה שלר, גם כאשר זה לא עוזר להקל על הכאב שלר.

הסיכון להתלוות או להתכרכר משתנה מאדם לאדם. יתכן שיש לך סיכון גדול יותר להיות תלוי או מכור לפקפנט אם:

- אתה או מישחו משפחתך אי פעם השתמש לרעה או תלוי באלכוהול, תרופות מרשם או סמים לא חוקיים ("התמכרות").
- אתה מעשן.
- הוא לך אי פעם בעיות במצב הרוח שלך (דיכאון, חרדה או הפרעת אישיות) או טיפול על ידי פסיקיאטר בגין מחלות נפש אחרות.

אם אתה מבחין באחד מהסימנים הבאים בזמן השימוש בפקפנט, זה יכול להיות סימן שהפעת לתלוי או מכור.

- עליך להשתמש בתרופה למשך זמן רב יותר ממה שהומלץ על ידי הרופא שלך
- עליך להשתמש ביוטר מהמיןון המומלץ
- אתה משתמש בתרופה מסיבות שאין אלה שגורשו לך, למשל, 'להישאר רגוע' או 'לעדור לך לשון'
- עשית ניסיונות חוזרים ונשנים שלא צלחו, להפסיק או לשלוט בשימוש בתרופה
- כאשר אתה מפסיק ליטול את התרופה אתה מרגיש לא טוב (למשל בחילות, הקאות, שלשולים, חרדות, צמרורות, רעד והזעה), ואתה מרגיש טוב יותר ברגע שאתה משתמש שוב בתרופה ("תופעות גמילה")

אם אתה מבחין באחד מהסימנים הללו, דבר עם הרופא שלך כדי לדון במסלול הטיפול הטוב ביותר עבורך, כולל מתי להפסיק וכיום בשימוש בתרופה.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או הרוקח. במידעך יש לידע את הרופא או הרוקח לפני השימוש בפקפנט אם אתה לוקח או לוקח לאחרונה אחת מהתרופות הבאות:

- תרופות העולות לגרום לשינויים, כמו למשל כדורי שינה, תרופות להרגעה, תרופות להרפיה שרירים, תרופות לטיפול בחרדה, כגון בנזודיאזיפינים (דיאזepam) או תרופות נגד אלרגיה (אנטיהיסטמינים). השימוש בפקפנט בו זמנית עם תרופות שגורמות לשינויים מעלה את הסיכון לנמנום, קשיי נשימה (דיכי נשימתה), תרדמת ועלול להיות מס肯 חיים.
- פנה אל הרופא אם אתה חווה מהתקסמים האלה. מסיבה זו יש לשקל את השימוש בפקפנט בשילוב עם תרופות רק במקרים בהם אין אפשרות אחרת לטיפול. אולם, אם הרופא רושם לך פקפנט ביחד עם תכשיר הרגעה, המנון ומשר הטיפול ייקבע על ידי הרופא. **דוחה לרופא על תרופות ההרגעה שאתת נוטל והיצמד להנחיותיו.** היה מועל אם תידע את קרוביך או חבריך לשים לב לתסמינים שצינו לעיל.

תרופות לטיפול בדיכאון מקובצת מעכבי האנדומים מונואמין אוקסידאז. יש לידע את הרופא המטפל או הרוקח אם לוקח תרופה מקובצת זו בשבועיים (14 ימים) האחרוןים לפני השימוש בפקפנט. הסיכון לתופעות לוואי עולה אם אתה לוקח תרופות כמו תרופה לטיפול בדיכאון מסוימות או תרופות אנטי פסיקטיות. פקפנט עלול להגביל עם תרופות אלו ואתה עלול לחותות שינויים במצב המנטלי (כגון חוסר שקט, הדיזות, תרדמת), ותופעות אחרות כמו חום גבוה מעל 38°C , עלייה בקצב הלב, לחץ דם לא יציב ורפלקסים מגברים, נזקשות שרירים, חוסר קואורדינציה ו/או תופעות במערכת העיכול (כגון בחילה, הקאה, שלשול). הרופא יודיע לך האם פקפנט מתאים עבורך.

- תרסיסים לאף לטיפול בגודש באף (המכילים מפחית גודש כגון אוקסימטוזילן).
- תרופות העולות להשפיע על האופן בו הגוף מפרק את הפקפנט. אלו כוללות:
 - תרופות לטיפול ב-VAH (כגון ריטונאביר, נלפנאביר, אמפראנאביר או פוסאמפרנאנאביר).
 - תרופות לטיפול בziehomim פטריטיים (כגון קוטוקונאזהול, איטראקונאזהול או פלקונאזהול).
 - תרופות לטיפול בziehomim חידקיים (כגון טרולאנדומיצין, קליריתומיצין או אריתромיצין).
 - אפרפיטנט – משמש להפסקת תחושת החילה.
 - דילטיאזם ווראפאAMIL – משמשים לטיפול בחץ דם גבוה או בעיות לב.
 - משככי כאב אחרים הנקרים בשם אגוניסט חלקקי/אנטוגונייט, כגון בופרנורפין, נלבופין, פנטאזהצין. אתה עלול לחותם תס敏ים של תסמנות גמילה (בחילה, הקאה, שלשול, חרדה, צמרורת, רעד והזעה) במהלך השימוש בתרופות האלה.
 - משככי כאב לצאבים עצביים (גבאפטניין ופרגבלין).

אם אחד מהן"ל חל עליך (או אין בטוח), פנה לרופא או לרוקח לפני השימוש בפקפנט.

אין להשתמש בתרסיס לאף מכל סוג אחר במשך לפחות 15 דקות לאחר שימוש בפקפנט.

שימוש בתרופה ומדוזן

אין לשנותות מיצ' אשכליות במשר כל תקופת השימוש בפקפנט. מיצ' אשכליות עלול להשפיע על האופן בו הגוף מפרק את התרופה.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לצרוך אלכוהול במשר כל תקופת השימוש בפקפנט. צריכת אלכוהול עלולה לגרום לעלייה בסיכון לתופעות לוואי חמורות.

הירין, הנקה ופוריות

אם את בהירין או מניקה, עשוי להיכנס להירין או מתכנתת הירין, היועצי ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

הירין:

אין להשתמש בתרופה אם את בהירין או עשויה להיות בהירין, אלא אם הרופא הורה אחרת. לאחר שימוש ממושך פקפנט עלול לגרום לתרסמי גמילה אצל הילד. אין להשתמש בפקפנט בזמן לידה (כולל ניתוח קיסרי) מאחר שהוא עבר דרך השלה ועלול לגרום לדיכי נשימתי אצל הילד.

הנקה:

אין להשתמש בתרופה אם את מניקה. התרופה עוברת לחלב אם ועלולה לגרום לשינויים ודיכי נשימתי אצל התינוק הינווק. אין להיניק תינוק במשר לפחות לפחות 5 ימים מעת המנה האחרון של פקפנט.

פוריות:

לא קיים מידע על השפעות התרופה על הפוריות.

נהייה ושימוש במכונות

התרופה עלולה לגרום לביצול המנטלית ו/או הגופנית לנרגס או להפעיל מכונות. יש להתייעץ עם הרופא המתפלט אם יהיה בטוח בשבייל לנרגס או להפעיל מכשור או מכונות לאחר שימוש בתרופה. אין לנרגס או להפעיל מכונות אם אתה חש ישינויים, סחרור או הפרעות ראייה או תופעות לוואי אחרות אשר עלולות לגרום לביצול לנרגס או להפעיל מכונות. אסור לנרגס או להפעיל מכונות ומכשור מסווגים כל עוד אתה לא יודע איך התרופה תשפיע עליו.

3. כיצד השתמש בתרופה?

לפני תחילת הטיפול ובאופן קבוע במהלך הטיפול, הרופא ידוע איתך למה אתה עשי לצפות משימוש בפקפנט, متى וכמה זמן עליך לקחת אותו, متى לפנות לרופא ומתى עליך להפסיק את השימוש בפקפנט.

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או ברוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

פקפנט קיימ בשני חזקים שונים: פקפנט 100 מק"ג ופקפנט 400 מק"ג. עליך לוודא שאתה משתמש במינון שנרשם לך על ידי הרופא.

בכמה הצעות יש להשתמש:

- המנה לטיפול באירוע כאב מתפרק יכולה להיות לחיצה אחת או שתי לחיצות (אחד בכל נחיר).
- הרופא ינחה אותך בכמה לחיצות (1 או 2) עליך להשתמש לטיפול באירוע כאב מתפרק.
- **אל תשתמש מעבר למנה שהרופא רשם לכל אירוע בודד של כאב מתפרק.**
- אין להשתמש בפקפנט יותר מ-4 פעמים ביום.
- המtanן לפחות 4 שעות עד לשימוש במנת הבאה של פקפנט.

מגה התחלתיות:

- המנה ההתחלתית היא 100 מק"ג.
- זהוי לחיצה אחת לטור נחיר אחד מטור בקבוק פקפנט 100 מק"ג.
- ראה "שימוש בבקבוק הפקפנט" להוראות בנוגע לאופן השימוש במנת.

מציאת המיןון המתאים:

- הרופא ייעזר לך למצוא את המיןון המתאים לשיכוך הכאב המתפרק. חשוב מאוד שתעקוב אחר הוראות הרופא.
- ספר לרופא על הכאב שלך ויכיזד התרופה משפיעה עליו. הרופא יחליט אם יש צורך לשנות את המיןון.
- אין לשנות את המיןון על דעתך עצמן!


לאחר מציאת המיןון המתאים:

- ספר לרופא אם מיןון הפקפנט אינו מקל על הכאב המתפרק. הרופא יחליט אם יש צורך לשנות את המיןון. אין לשנות את המיןון של פקפנט או של **משככי הכאב האחרים על דעת עצמן**.
 - ספר מייד לרופא אם אתה חווית מעל 4 אירועים של כאב מתפרק ביום. יתכן שהרופא ישנה לך את התרופה עבור הכאב המתמשך. ברגע שתושג שליטה על הכאב המתמשך, יתכן שהרופא ישנה לך את מיןון הפקפנט.
- אם אין בטוח בנוגע למיןון המתאים או בכמה לחיצות פקפנט להשתמש, פנה לרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת. אין לבלווע.

שימוש בבקבוק הפקפנט:

הוראות כיצד לפתח ולסגור את המרגן מפני ילדים:





- א. יש להכניס את האצבעות לתוך השקעים האחוריים וללחוץ תוך כדי לחיצה דחיפה מטה של הקפטור העליון.
- ב. יש לפתח.
- ג. יש לסגור (שים לב לשמיית 'קליק' לוודוא סגירה).

הכנת בקבוק הפקפנט לשימוש

- לפני שימוש בבקבוק חדש של פקפנט יש להכין אותו לשימוש כדלקמן:
- על בקבוק הפקפנט החדש יופיעו שני פסים אדומים בחולון למעקב מנוגת, הנמצא בסוגר הפלסטיκ הלבן של הבקבוק (איור 1 ואיר 3א).
 - הסר את המכסה המגן העשוי מפלסטיק שקווף מהפייה (איור 1).
 - כוון את התרטיס בכיוון אחר ממך (ומאנשים אחרים).
 - החזק את בקבוק הפקפנט קווף בעזרת האגדול בתחתית הבקבוק ובאצבע המורה והאמצעית משני צידי הפיה במקום המזועד לאצבעות (איור 2).
 - לחץ בחזקה עם האצבעות עד להישמע "קליק" ואז שחרר את האצבעות (איור 2). ישמע "קליק" שני ויפורע פס אחד רחב באצבע אדום בחולון למעקב מנוגת (איור 3ב).
 - חזר על שלב 5 שלוש פעמים. בכל חזרה על שלב 5, הפס האדום יփוך לצר יותר עד להופעת פס יירוק בחולון למעקב מנוגת (איור 3ב-ה). הופעת הפס הירוק בחולון למעקב מנוגת מסמנת שהפקפנט מוכן לשימוש.
 - נגב את הפיה של התרטיס עם טישו ושתוף את הטישו באסלה.
 - אם אתה לא מתקין לשימוש בתטרופה מיד, החזר צהרה את המכסה המגן. לאחר מכן, הכנו את בקבוק הפקפנט למארץ האחסון המגן מפני ילדים. אם לא נעשה שימוש בפקפנט במשך 5 ימים, יש להזכיר את התרטיס לשימוש על ידי לחיצה אחת.

אם לא נעשה שימוש בפקפנט במשך 60 ימים מרגע ההכנה של התרסיס לשימוש יש לזרוק את הבקבוק ולהתחל ל להשתמש בבקבוק חדש.




השימוש בפקפנט:

השימוש בפקפנט הוא על ידי התזה לתוך הנחיר בלבד.

1. בדוק שטופייע פס יירוק או מספר בחולון למעקב מנות (איור 4): זה מעיד על כך שהכנה בקבוק הפקפנט לשימוש בוצעה בהצלחה (ראה לעיל "הכנה בקבוק הפקפנט לשימוש").
 2. קנה את האף אם אתה מרגיש צורך בכך.
 3. שב והחזק את הראש זקוף.
 4. הסר את המכסה המגן מהפייה.
 5. החזק את בקבוק הפקפנט בעזרת האgodל בתחום הבקבוק ובאצבע המורה והאמצעית משני צידי הפיה במקום המיעוד לאצבעות (איור 4).
 6. הכנס את הפיה לתוך הנחיר לעומק של כ-1 ס"מ. כוון את הפיה פנימה לעבר הדופן הפנימית של הנחיר. פועלה זאת תגרום לשינוי קל בזווית הטעיה של הבקבוק (איור 5).
 7. סגור את הנחיר השני עם האצבע של היד השנייה (איור 5).
 8. לחץ בחזקה כלפי מטה על המקום המיעוד לאצבעות משני צידי הפיה על מנת לגרום להתחזה של התרסיס לתוך הנחיר. ברגע שתשתמעו "קליק" שחרר את האצבעות.
- שים לב: "יתכן שלא תרגיש כלל שם שינוי בתונן האף - אין המשמעות בכך שהתרסיס לא פועל. סמור על המשמעת ה-'קליק' ועל המספר בחולון למעקב מנות.**
9. הכנס אויר בעדינות דרך האף והוציא דרך הפיה.
 10. המספר בחולון למעקב מנות יעלה לאחר כל שימוש ויראה את מספר הלחיצות שכבר בוצעו.
 11. אם הרופא רשם לך שתי לחיצות של התרסיס חזור על הפעולות בסעיפים 5 עד 9 תוך שימוש בנחיר השני.

אל תשתמש מעבר למנה שהרופא רשם לטיפול בכל אירוע בודד של כאב מתפרק.

12. הכנס את הבקבוק חזרה לארצץ המגן מפני ילדים לאחר כל שימוש. שומר את התרופה הרחק מהישג ידם וטווח ראייתם של ילדים (איור 6).
13. הישאר במצב ישיבה לפחות למשך דקה אחת לאחר שימוש בתרסיס.



מספר הלחיצות בבקבוק פקפנט:

- כל בקבוק של פקפנט מכיל 8 ללחיצות מלאות.
- לאחר הלחיצה הראשונה המספר "1" יופיע בחלון למעקב מנות. המספר יעלם כל ללחיצה נוספת.
 - כאשר אתה רואה בחלון למעקב מנות את המספר "8" בצבע אדום פירוש הדבר הוא שהתקسير נגמר ולא תוכל עוד לקבל מנות ללחיצה מלאה.

כיצד יש להיפטר מתרסיס של פקפנט שלא נעשה בו שימוש:

אם ניתן לראות מספר השונה מ-"8" בחלון למעקב מנות, סימן שלא השתמש בכל 8 הלחיצות שבקבוק.

עליך לרוקן את המנות הנוגרות של הפקפנט מהבקבוק על ידי כיוון התרסיס בכיוון אחר ממר' (ומאנשים אחרים) וביצעו לחיצות חוזרות עד להופעת מספר "8" בצבע אדום בחלון למעקב מנות.

כאשר אתה רואה את המספר "8" בחלון למעקב מנות, עдиין קיימת תרופה בתוך הבקבוק ויש להוציא אותה.

- עליך ללחוץ ולשחרר לחץ עוד 4 פעמים נוספות כאשר התרסיס מכוען בכיוון אחר מר' (ומאנשים אחרים).
- אתה תרגיש התנוגדות מעט מוגברת בעט הלחיצה והמקום המיועד לאצבעות ינווע מטה רק מעט.
- אתה לא תשמע "קליק" בעט הלחיצה מטה.
- בחלון למעקב מנות ישאר מספר "8" ללא שינוי.
- סגור את התרסיס עם המכסה המגן.
- הכנס את התרסיס למאוץ המגן מפני ילדים.
- הייעץ בבית המركחת כיצד להיפטר מבקבוקים ריקים.

אם התרסיס של פקפנט נחסם או לא פועל באופן תקין:

אם התרסיס של פקפנט נחסם כוון את התרסיס בכיוון אחר מר' (ומאנשים אחרים) ולחץ בחזקה למיטה על המשאה. פעלזה זאת תחריר את החסימה.

אם התרסיס עדיין לא פועל באופן תקין, היפטר ממנה והתחל להשתמש בתרסיס חדש. ספר לרופא על המקרה. אף פעם אל תנסה לתקן את התרסיס בעצמך או לפרק אותו משום שאז התקسير עלול לחתך לך מנה לא נכונה של התרופה.

יש להיפטר מבקבוק הפקפנט ולהשתמש בבקבוק חדש אם: חלפו 60 ימים או יותר מאז שהכנת את בקבוק הפקפנט לשימוש או השתמשת בבקבוק לראשונה.

אם השתמש בטעות במינון גבוהה יותר או אם בטעות בעליל מינון בית-חולים, והבא את אריזת התרופה איתך.

במקרה של מינון יתר אתה עלול לחוות ישנוויות, בחילות, סחרחות, נשימה איטית או שתווחה או תופעות לוואי נוספות על אלו המפורטות בסעיף 4 או לחוות את תופעות הלואאי המפורחות באופן חמור יותר. במקרים חמורים, נתילת מינון יתר של פקפנט עלולה לגרום לתרדמה.

מנת יתר עלולה לגרום גם להפרעה מוחית המכונה לקאונצפלופתיה רעילה. אם אתה מרגיש סחרחות חזקה, ישנוויות חזקה או אם יש לך נשימה איטית או שטחית עליך להתקשר למגן דוד אדום או להזעיק סייע חירום אחר. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אם שכחת להשתמש בתרופה זו בזמן הדרוש, אין להשתמש במנה כפולה. יש להיוועץ ברופא.

אם אתה מפסיק את השימוש בתרופה:

אם אתה לא חוווה יותר אוירוני כאב מתפרק התיעץ עם הרופא לפני הפסקת התרופה ומלא אחר ההוראות של הרופא. בכל אופן עליך להפסיק להשתמש בתרופה האופיאידית האחרת לטיפול בכאב המתמשך. יתכן שהרופא יצטרך לבדוק את המינון.

אתה עלול לחוות תסמיini גמילה הדומים לתופעות הלואאי האפשריות בזמן הפסקת השימוש בתרופה.

אם אתה חוווה תסמיini גמילה עליך לפנות לרופא.

הרופא יחליט האם עליך ליטול תרופה לטיפול בתסמיני ה�性.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שאתה גוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפקפנט עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהם.

התקשר מייד למגן דוד אדום או בקש מאדם אחר להזעיק סיעור חירום אם:

- אתה מרגיש מאד מסchorר או חלש
 - אתה מרגיש מאד ישנוני
 - יש לך נשימה איטית או שטחית (תנווה מועטה בחזה בזמן הנשימה)
 - יש לך עור קר ולח, אתה נראה חיוור, יש לך דופק חלש או סימנים אחרים של הלם.
- אם אתה או המטפל שלך מבחינים באחת מתופעות הלואוי שלעיל, יש להזעיק מייד למגן דוד אדום.

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 אנשים):

- איןך יודע היכן אתה נמצא (חוור הרתמות)
- שינוי בטעם
- הרגשות סחרחות
- הרגשות בחילה או הקאה
- הרגשות ישנניות, כאב ראש
- דימום מהאף, אי נוחות בתוך האף (כגון צריבה באף), נזלת עצירות
- עור מגרד

תופעות לוואי שאין שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 100 אנשים):

- זיהום בחזה
- כאב, רגשות או דלקת בגרון או באף
- שיעול, התעטשות, נזלת או צינון, שינויים בנוזל המופרש מהאף
- תגובה אלרגית, פריחה
- ירידת או עלייה בתיאבון, עלייה במשקל
- התיבשות, הרגשות צמא
- שימוש שגוי בתרופה
- ראייה או שמיעה של דברים שאיןם קיימים (החיות/دلיריום), תחשות בלבול
- תחשות דיכאון, דאגה, איטיות או עצבנות
- חוור ריכוז או פעילות מוגברת
- אובדן זיכרון
- תחשות אופוריה
- פחות מודעות או תגובתיות, אובדן הכרה
- פרכויסטים
- התכווצויות שרירים או רעד
- אובדן תחשות הטעם, אובדן או שינוי בחוש הריח
- קושי בדיבור
- צבע עור כחול
- סחרחות סיבובית (ורטיגו), נפילה, תחשות חולית כללית
- חום וזרימת דם שאינה פולנית באופן תקין, עור חם או סומק, צמרמורות, הצעת יתר
- נפיחות של הרקמה הרכה
- לחץ דם נמוך
- חסימה בקנה הנשימה

- קוצר נשימה
- דימום נרתיקי
- קרע בעור או דלקת של רירית הקיבה
- חסור תחושה או עקצוץ בפה, בלשון או באף, או בעיות אחרות בלשון, כיבים בפה, פה יבש
- שלשול
- מאמצז להקאה, כאבי בטן, קלקל קיבה
- כאבים או רגשות במפרקים
- קושי או חסור יכולת במתן שתן
- כאב חזה
- הרגשת עייפות או חולשה, בעיות תנועה
- שינוי בתאי הדם (מזהה על ידי בדיקות מעבדה)
- עלייה ברמת הסוכר בدم
- חלבון בשתן

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (לא ניתן להעריך את השכיחות המנתוניים הקיימים):

- בעיות נשימה חמורות
- הסמקה
- נזודי שינה
- תסמנות גמילה (עלולה להתבטא על ידי הופעת תופעות לוואי הבאות: בחילה, הקאה, שלשול, חרדה, צמרמות, רעד והזעה)
- סבירות לתרופה
- תלות בתרופה (התמכרות)
- שימוש לרעה בתרופה

טיפול ממושך עם פקפנט במהלך ההריון עלול לגרום לתסמיני גמילה ביילוד אשר עלולים להיות מסכני חיים (ראה פרק 2).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעlion, עlijך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

אחסן את התרופה במקום בטוח ומאובטח, שבו אנשים אחרים לא יכולים לגשת אליה. זה יכול לגרום לנזק חמור ולהיות קטלני לאנשים שעולמים לקחת תרופה זו בטעות, או בכונה כאשר היא לא נרשמה עבורה.

מנع הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התגובה (date. exp) המופיע על גבי האריזה. תאריך התגובה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אין להשתמש בתרסיס לאחר 60 ימים מהשימוש הראשון. יש לרשום את התאריך של השימוש הראשון או הכנת בקבוק הפקפנט לשימוש הרាមון. על התווית של המארץ המגן מפני ילדים. אם לא נעשה שימוש בתרסיס יותר מ-5 ימים יש להזכיר את בקבוק הפקפנט לשימוש מחדש על ידי לחיצה אחת.

תנאי אחסון:

אחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C . אין להקפיו!
יש להחזיק את התרסיס במאוץ המגן מפני ילדים על מנת להגן מפני האור. יש לשמר את התרסיס של פקפנט במאוץ המגן מפני ילדים במשך כל תקופת השימוש ואfilו לאחר שהתקשר נגמר.

פקפנט שפג תוקפו או שאין בו צורך יותר, עדין עשוי להכיל כמות מספקת של תרופה העולה להזיך לאנשים אחרים ובמיוחד לילדים. אין להשאיר את התרופה לביב או לאשפָה הביתית. יש להיפטר מתרופה שאין בה עוד צורך בהקדם האפשרי לפִי ההוראות תחת סעיף "כיצד יש להיפטר מתרסיס של פקפנט שלא נעשה בו שימוש". את כל הבקבוקים הריקים יש להחזיר למאוץ המגן מפני ילדים.

6. מידע נוספת
נוסך על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

mannitol, pectin, sucrose, propyl parahydroxybenzoate, phenylethyl alcohol,
purified water, hydrochloric acid or sodium hydroxide.

תכשיר זה מכיל סוכרוז בריכוז של 5 mg/ml ואת החומרים המשמרים
.Phenylethyl alcohol ו-Propyl parahydroxybenzoate

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

התרופה היא תמיisha צולולה וחסרת צבע. היא מגיעה בבקבוק זכוכית שקוף
המציד במשאבה מדודזה. המשאבה מכילה מונה לספירת מנות המשמע "קליק" על מנת שניתן
יהיה לשימוש גם לראות בחולון למעקב מנות השמנה ניתנה. התרסיס סגור במכסה מגן שקוף.
לאחר הכנת בקבוק הפקפנט לשימוש, התרסיס מכיל 8 לחיצות מלאות. כל בקבוק של פקפנט
משווק במאוץ המגן מפני ילדים ואerox בקופסת קרטון.
קופסת קרטון מכילה 1 או 4 בקבוקים של פקפנט.
פקפנט תרסיס לאף קיימים בשני מידות: 100 מ"ג ו-400 מ"ג.

בעל הרישום וכתובתו: מדיסון פארמה בע"מ, רח' השילוח 10, ת.ד. 7090, פתח תקווה.

שם הייצן וכתובתו: Kyowa Kirin Holdings B.V.,
Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp, The Netherlands

נערך במאי 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

פקפנט 100: 152 59 33975

פקפנט 400: 152 60 33978

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני
המינים.