



עלון לצרכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ו – 1986 התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

אנלדקס 5, 10, 20 מ"ג, טבליות

כל טבלייה מכילה אנלפריל מאלאט (Enalapril maleate) 5, 10 או 20 מ"ג בהתאם.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 " מידע נוסף " ובסעיף 2 " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה ".

קרא בעין את העلون עד סופו בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתו. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

תרופה זו גורמת להרחבת כלי הדם ובכך מסייעת בהורדת לחץ הדם. בנוסף, התרופה מיועדת לטיפול באיסוף קיט לב (ירידה בתפקוד הלב).

באנשים מסוימים ידרשו מספר שבועות של טיפול עד להשגת ההשפעה המיטבית על לחץ הדם.

קבוצה רפואיית: מרחיב כלי דם מסווג מעכבי אנזימים המהפר אנגiotנסין (ACE Inhibitor).

2. לפני השימוש בתרופה: אין לשמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אנלפריל מאלאט), לתרופות אחרות הדומות לאנלפריל מקבוצת ACE inhibitor או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- יש לך מחלת אשר חזה תגובה אלרגית לאנלפריל או לתרופות אחרות מקבוצת ACE inhibitor או אם סבלת בעבר מנפיחות הפנים, העפעפיים, השפטיים, הפה, הלשון או האגרון שגרמה لكשיי בילעה או נשימה (אנגיאידמה) מסיבה לא ידועה או על רקע תורשתך.
- אתה חולה סוכרת או סובל מבעיות בכליות ואתה נוטל תרופה המכילה אליסקירן להורדת לחץ הדם.
- את בהריון לאחר חדש שלישי (עדיף להימנע מנטיילת אנלפריל גם בתחלת ההריון, ראי בסעיף 2 "הריון והנקה").
- אתה נוטל סקוביטריל / ולסרטן (Sacubitril / Valsartan), תרופה לטיפול באיסוף לב כרוני במבוגרים, שכן עליה הסיכון לאנגיידמה (התנפחותות מהירה מתחת לעור למשל באזורי הגרון). אין ליטול אנלפריל אם אחד מהמצבים המתוארים לעיל נכון. אם אין בטוח, היועץ ברופא לפני נטיית תרופה זו.

ازירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- **לפני הטיפולenganDEX, ספר לרופא אם:**
 - יש לך לחץ דם נמוך (עלול להתבטא בעילפון או סחרחותה במיוחד במעבר למצב עמידה).
 - יש לך בעיות בכלי הדם במוח.
 - אתה סובל מבעיה לב.
- יש לך בעיות בכלייה (כולל השתלת כליה), אתה נמצא תחת האבלת מלח בתזונה, נוטל תוספי אשלגן, תרופות אוצרות אשלגן, תחלפי מלח המכילים אשלגן או תרופות אחרות שעולות עליהן את רמות האשלגן בדם (למשל הפרין [תרופה למניעת היוצרות קריישי דם], תרופות המכילות טרימטופרים כגון קו-טרימוקסוזול [תרופה לטיפול בזיהומיים]). תרופות אלו יכולות לגרום לרמה גבוהה של אשלגן בדם העוללה להיות חמורה. ייתכן שהרופא יצטרך לעקוב אחר רמת האשלגן בدمך או לשנות את המינון של אנלפריל בהתאם. ראה מידע נוסף בסעיף "תגובהות בין תרופיות".
- יש לך בעיה בכבד.

- יש לך בעיה במערכת הדם כגון: רמה נמוכה או חוסר של תא דם לבנים (נויטרופניה/אגרנולוציטוזיס), רמה נמוכה של טסיות (תромבוציטופניה), רמה נמוכה של תא דם אדומים (אנמיה).
- אי פעם סבלת מתגוברת אלרגית (אנגיאודמה), התסמינים כוללים: גירוד, סימנים אדומים על גבי הידיים, כפות הרגליים והגרון, נפיחות בפנים, סביב העיניים, בשפטים, בלשון או בגרון עם קשיי בליעה או נשימה. שם לב כי מטופלים שחורי עור הם בסיכון מוגבר לתגובה אלו בטיפול עם ACE inhibitors.
- אתה עובר טיפול דיאליזה.
- סבלת לאחרונה מהקאות או שלשלולים מרובים.
- אתה סובל מסוכרת. עליך לעקוב אחריו רמות נמוכות של סוכר בدم, במיוחד בחודש הראשון של הטיפול.
- יתכן גם כי רמת האשלגן בדם עלולה להיות גבוהה יותר. יתכן גם כי רמת האשלגן של כל הדם כגון: לופוס (זabetes אדמנטיות), דלקת מפרקים שגרונית, טרשת עור (סקלרוזדרמה), אתה נוטל תרופות לדיכוי מערכת החיסון, אתה נוטל את התרופות אלופרינול או פרוקainaamide או שמתקים שילוב של הגורמים הללו.
- אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות, יתכן שיולה הסיכון לאנגיאודמה:
 - רצקડוטריל, תרופה לטיפול בשלשלול.
 - תרופות למניעת דחיתת שתל ולטיפול בסרטן (כגון טמסירולמוס, סיורלמוס, אברולמוס).
 - וילדג'יפטין, תרופה לטיפול בסוכרת.
- אתה נוטל כל אחת מהתרופות הבאות לטיפול ביתר לחץ דם:
- תרופות משפחת חסמי הרצפטור אנגיאוטנסין II ARBs (ARBs) כגון ולסרטן, טימייסרטן, אירבסרטן), ביחד עם אנתסמייד או שמתקים שילוב בклויות הקשורות לסוכרת.
- אליסקירן.

יתכן שהרופא ייעקב באופן תקופתי אחרי תפקודי הכליות, לחץ דם ורמת האלקטרוליטים (כגון אשלגן) בדם. ראה גם בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם". ספרי לרופא אם את חושבת שאת עשויה להיות בהירון או מתכוונת להיכנס להירון. תרופה זו אינה מומלצת בתחילת ההירון. אין ליטול את התרופה לאחר החודש השלישי להירון, מפני שימוש בתרופה בשלב זה, עלול לגרום לנזק חמור לתינוק (ראי בסעיף 2 "הירון והנקה"- אין להשתמש בתרופה אם").

שים לב שהתרופה מוריידה את לחץ הדם במטופלים שחורי עור בעילות פחותה בהשוואה למטופלים אחרים. אם אין בטוח שהמצבים מעלה נכונים לגבר, היועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת התרופה.

אם אתה עומד לעבר ניתוח
יש לדוח לרופא המטפל על נטילת תרופה זו לפני הפרזצורות הבאות: ניתוח כלשהו או קבלת חומר הרדמה (גם אצל רופא השיניים), טיפול לסילוק כולסטרול מהדם LDL אפרזיס) או טיפול להפחחת תגובה אלרגית לעקיצות דברים או צראות. אם אחד או יותר מהמצבים מעלה נIRON לגבר, היועץ ברופא או ברוקח השיניים לפני הפרזצורה.

- תגובה בין תרופתיות**
- אם אתה לוקח, אם لكחת לאחרונה, או אם אתה מתכוון לקחת תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, מפני שאנפሪיל עלול להשפיע על הפעילות של תרופות מסוימות ותרופות מסוימות עלולות להשפיע על פעילות אנפሪיל. יתכן שהרופא ישנה את מינון אנפሪיל /או ינקוט בצעדי זהירות נוספים. ספר לרופא או לרוקח במקרה של תרופה מושך לך:
- תוספי אשלגן (כולל תחליפי מלח), משתנים אוציארי אשלגן כגון ספironolakton, טריאמטרן או אミילוריד ותרופות אחרות שעלוות להעלאת את רמות האשלגן בדם (למשל טרימטופרים וקו-טרימוקסוזול לטיפול בziehomים חידיקים; ציקלוסופרין, תרופה לדיכוי מניעת דחיתת שתל והפרין, תרופה המשמשת לדילול דם למניעת היוצרות קריש דם). ראה מידע נוסף בסעיף "ازהרנות מיוחדת הנוגעת לשימוש בתרופה".
 - תרופות אחרות המשמשות להורדת לחץ דם כגון: חסמי בטא, משתנים (כגון תיאזידים, פורוסמיד, בומטניד), או תרופות לטיפול בכאב חזה (תעוקת חזה) כגון ניטראטים. נטילת תרופות אלה בו זמן קצר עם אנפሪיל עלולה לגרום לחץ דם נמוך.
 - חסמי הרצפטור אנגיאוטנסין II (ARB) או אליסקירן. ראה גם בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם" ו"ازהרנות מיוחדת הנוגעת לשימוש בתרופה".

- **ליתומים** (טיפול בסוגים מסוימים של מחלות נפש).
 - **תרופות טריציקליות** לטיפול בדיכאון, תרופות אנטי פסיקוטיות (טיפול במקרים מסוימות של מחלת נפש חמורות), תרופות לאלחות (להרדמה), חומרה נרקטואידים כגון מרופין (לשיכור כאבים חזקים). נטילת תרופות אלה בו זמן קצר עלולה לגרום לחץ דם נמוך.
 - **תרופות לטיפול בNODES ודלקת הקשורות למצבי כאב,** בעיקר אלו המשפיעים על השירים, העצמות והמנפרקים:
 - נוגדי דלקת שאים סטרואידים - NSAIDs, כולל מעכבי-2-COX (המשמשים להפחחת דלקת, לסייע בשיכור הכאב).
 - טיפול במחלות זabb, העולן לגרום להסתמה של הפנים, בחילה, הקאות ולחץ דם נמוך, אם ניתן בו זמן עם אלנפריל.
 - **מעכבי TOR** (כגון טמסירולימוס, סירולימוס, אברולימוס): תרופות לטיפול בסוגי סרטן מסוימים או כדי למנוע מהמערכת החיסונית של הגוף לדוחות איבר מושתל). ראה גם בסעיף 2 "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".
 - **תרופה המכילה מעכבי נפריליסין** כגון סקוביטריל (קיים בתכשיר משולב עם ולסרטן), רצקdotril או וילגאליפטן. הסיכון לאנגיאודמה (נפיחות הפנים, השפטים, הלשון או האגרן עם קשיי בליה או נשימה) עלול לעלות. ראה גם בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם" ו"ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".
 - **אספירין** (חומצה אצטילסיליצית).
 - **תרופות להמתת קרישי דם** (תромבוליטים).
 - **תרופות נגד שיעול והצטנות ותרופות להורדנה במשקל המכילות חומר סימפטומימי.**
 - **תרופות לטיפול בסוכרת** (כולל תרופות הנינזנות דרך הפה או אינסולין). אלנפריל עלול לגרום לירידה חרדה ברמות הסוכר בدم אם נלקח בו זמן קצר לאחר תרופה אחרת, במיוחד בשבועות הראשונים לטיפול ובמטופלים עם בעיות בחילה. עליך לעקוב באדיוקות אחר רמות הסוכר בדרך כלל החודש הראשון של הטיפול ואלנפריל. אלכוהול.
- אם אין בטוח שהמיעד מעלה נכון לגבר, היועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת התרופה.
אם אתה עומד לקבל חומר הרדמה (עבור ניתוח), ספר לרופא השני שאתה נוטל אלנפריל.

שימוש בתרופה ומזון

אתה יכול ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אם אתה צורך אלכוהול בעת הטיפול ואלנפריל, יתכן שזה יגרום לירידה משמעותית בלחץ הדם ותוחשת סחרחות או עילפון. יש להיזהר עם כמות האלכוהול שאתה צורך.

הירין והנקה

אם אתהittezhion או מניקה, חשוב שתאושוויה להיות בהירין או מתכוננת להיכנס להירין, היועצי ברופא לפני נטילת תרופה זו. הרופא בדרך כלל ייעץ לך להפסיק את נטילת התרופה לפני שאתה נכנס להירין או מיד לאחר שנודע לך שאתה בהירין וליטול תרופה אחרת במקום אלנפריל. התרופה אינה מומלצת בשלבים מוקדמים של ההירין ואסורה לשימוש לאחר החודש השלישי להירין מחשש שהוא גורם לנזק חמור לתינוק אם נלקחת לאחר החודש השלישי להירין. הנקת יולדים (במהלך השבועות הראשונים לאחר הלידה) היועצי ברופא אם אתה מניקה או מתכוננת להניק. הנקת יולדים (במהלך השבועות הראשונים לאחר הלידה) ובמיוחד פגים אינה מומלצת בתקופת נטילת התרופה.
במקרים בהם התינוק בגור יותר, הרופא ייעץ לך לגבי היתרונות והסיכון שבנטילת אלנפריל בזמן הנקה וזאת בהשוואה לאופציות טיפולות חלופיות.

נהיגה ושימוש במכונות

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לעייפות או לScheduler. במקרים אלה, אין לנויג או להשתמש במכונות. באשר לילדים יש להזהיר מרכיבת על אופניים או מושחקים בקרבת הכביש וצדעה.

מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה

אלנדקס מכיל לקטוז, אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבירות לסטורם מסוימים, יש להיוועץ

ברופא לפני נטילת תרופה זו.

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבלייה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד בהתאם למצבך הרפואי ולתרופות הנוספות אשר אתה נוטל. יש לבלוע את התרופה עם מים. ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

יש ליטול את התרופה בערך באותו זמן כל יום. ניתן לחצות את הטבלייה, אין מידע לגבי כתישה/עליסה.

בתחילת הטיפול בתרופה, תיתכן ירידה משמעותית יותר בלחץ הדם מאשר בנטילת המנות הבאות. בהתאם הטיפול בתרופה אתה עלול להרגיש סחרורת. תיתכן כי יעזור לך לשכב עד שתתריגש טוב יותר. תופעות אלו הן פחות סבירות במנות הבאות. אם אתה מודאג, הייעוץ ברופא או רוקח.

הרופא יבדוק כיצד אתה מגיב לאנפפריל על ידי מדידת לחץ הדם וביצוע בדיקות דם מסוימות.

מטופלים עם בעיות כליה

אם אתה סובל מבעיות כליה, הרופא ישנה את מינון אנפפריל בהתאם לתפקיד הכליליתי.

אם אתה עובר טיפול דיאליזה, תיתכן כי מינון התרופה ישנה יומיום. הרופא ינוח אותך לגבי המינון הנוכחי.

מטופלים קשיישים

המינון יקבע על ידי הרופא ווותאם לתפקיד הכליליתי שלך.

שימוש ילדים

הניסיון של שימוש בתרופה זו ילדים עם לחץ דם גבוה הוא מוגבל. להתחוותות אחרת אין ניסיון ילדים כלל. המינון יקבע על ידי הרופא בהתאם למשקל הילד ושינויו בלחץ הדם של הילד לאחר נטילת אנפפריל. לא מומלץ

להשתמש בתרופה בתינוקות וילדים עם בעיות בכליה.

לא מומלץ להשתמש בתרופה בתינוקות מאוד צעירים (שבועות הראשונות לאחר הלידה).

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוהה יותר

אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעלך מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

התסמינים והסימנים השכיחים ביותר של מינון יתר הם: נפילה חדה בלחץ דם, הכרה מעורפלת. תסמינים נוספים יכולים לכלול: סחרורת בעקבות ירידה בלחץ הדם, דופק חזק ומהיר, חרדה, שיעול, אי ספיקת כלויות ונשימה מהירה.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיעוד, אל תדאג. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה, לחץ דםך עלול לעלות. אם לחץ דםך יעלה מדי, הוא עלול להשפיע על תפקודי הלב והכלויות שלך.

אל תפסיק ליטול תרופה זו אלא אם הרופא הנחה אותך לעשות זאת.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שאתה גוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש **באנדרקס** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רישימת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא או לחדר מיון בהופעת:

- גרד, פריחה אדומה מורמת בעור (חרפת), קוצר נשימה או צפיפות בנשימה, נפיחות הידים, כפות הרגליים או הקרסולים, הפנים, העיניים, הפה, השפתיים, הלשון או האגרון שעלולה לגרום لكשי נשימה או בליעה. שים לב שמטופלים שחורי עורם בעלי סיכון מוגבר ללקות בתופעות אלו.
- פריחה עם נגעים דמוויים מתרחות, שלפוחיות, קילוף של העור, העולאים להופיע גם בשפתיים, בעיניים, בפה, באף, ואו באיברי המין. בנוסף, יתכן כי תסבול מחום גבוה או כאב מפרקים (אריתמה מולטיפורמה).
- תגובה עור חמורה המתבטאת בתסמינים כגון: אדמומיות בעור, קילוף העור, שלפוחיות ופצעים חמומים, היפרדות של שכבת העור העליונה (תסמנת סטיבנס-ג'ונסון, טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס).
- תחושת נפיחות, כאבים והתקוצזויות בבטן (עלולים להיגרם מחסימת המעי).
- התקף לב או שבח יתכן בשל לחץ דם נמוך מאוד במטופלים מסוימים בסיכון גבוה (מטופלים הסובלים מבעיות בזרימת דם ללבי או למוח).
- כאב בטן חמוץ (עלול להיגרם מדלקת בלבלב).
- הפרעות בדם העולות להשפעה על התאים ומרכיבים אחרים בדם המאובחנות בדרך כלל בבדיקות דם (התסמינים יכולים לכלול: עייפות, חולשה, קוצר נשימה, אי יכולת לבצע פעילות גופנית, תשישות, הצטננות מתמשכת או חוזרת, חום, צמרמות, דימום ממושך, שטפי דם מסיביה לא ידועה, כתמים אדומים או סגולים על פני העור).
- נזול בריאה אשר עלול לגרום לתסמינים כגון: שיעול, קשי נשימה.
- חום גבוה, עייפות, איבוד תיאבון, כאב בטן, בחילה, צחבת (הצחבת העור או העיניים) ואי ספיקת כבד. אלו תסמינים של **הפטיטיס** (דלקת הגוף) או חסימה של צינור מריה (עצירה של זרימת המרה מצינור המרה בכבד).

בתחילת הטיפול באנתרופיל אתה עלול להרגיש עילפון או סחרחות. אם זה קורה, יעזר לך לשכב. תופעות אלו נגרמות מירידה בלחץ הדם ומוראות להשתפר בהמשך Nutzung התרופה. אם אתה מודאג, היועץ ברופא.

יש לפנות מיד לרופא אם מופיעות התופעות החמורות הבאות:

- שילוב של חלק או כל הסימנים הבאים:
- חום גבוה, דלקת כל דם, כאב ודלקת של שרירים או מפרקים
 - הפרעות במערכת הדם המשפיעות על מרכיבי הדם (לרוב מתגלו בבדיקות דם)
 - פריחה, רגישות לאור השימוש ותופעות עוריות נוספות

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מודרנית (תופעות שמופיעות ביוטר משתמש אחד מעשרה):

- טשטוש ראייה, סחרחות
- שיעול
- בחילה, חולשה

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 מעתה משתמש מתוך 100):

- כאב ראש
- דיכאון
- לחץ דם נמוך שעלול לגרום לסחרחות קלה, עילפון (syncope)
- שינויים בקצב הלב, דופק מהיר, כאב חזה או תעוקת חזה
- קשי נשימה

- שלשול, כאבי בטן, שינויים בחוש הטעם
- עייפות
- פריחה, תגובה אלרגית עם נפיחות בפנים, בשפתים, בלשון או בגרון עם קשיי בליעה או נשימה
- רמה גבוהה של אשלגן בדם, רמות גבוהות של קרייטין בדם (בדרכן כלל מאובחות על ידי בדיקה)

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שטוףיעות ב-10-1 מעתמשים מטופר 1,000):

- עייפות ורמת גבוקות נמוכות של המוגלבין או של תא דם אדום (אנמיה)
- רמות נמוכות של סוכר בדם העולות לגורם לחדרה, מודעות גבוהה או הרגשה לא יציבה
- רמה נמוכה של נתן בדם, רמה גבוהה של אוראה בדם (نمדים בבדיקה דם)
- ירידת פטאומית בלחץ הדם, לחץ דם נמוך (עלול לגרום לשחרחות מעבר לעמידה)
- בלבול, ישנות או נדודי שינה, עצבנות, ורטיגו (תחושת שחורה בעור)
- עקצוץ, תחושת "סיכות ומחטים", דלקת או חוסר תחושה בעור
- דופק מהיר וחזק או לא סדיר (פלפיטציות)
- נזהת, כאב גרון וצרידות
- שיעול / או צפוצים / או קשיי נשימה (אסטמה)
- מעבר איטי של המזון במעיים, דלקת לבלב העולוה לגרום להופעת תסמינים כגון כאב חמור בבטן וגבג
- הקאות, קשיי עיכול, עצירות, איבוד תיאבון
- גירוש בקיבה, יובש בפה, כיב קיבה (התסמינים יכולים להיות: תחושת צריבה, כאב המלווה בתחושת ריקנות ורעב, במיוחד כאשר הקיבה ריקה)
- הצעה מוגברת
- גרד, פריחה מגרדת או חרלה
- נשירת שיער
- ירידת בתפקוד כליות או אי ספיקת כליות (התסמינים יכולים להיות: כאבגב תחתון וירידה בנפח מתן השתן)
- רמה גבוהה של חלבון בשתן, מאובחנת בדרך כלל באמצעות בדיקת דם
- אין אונות (בעיות בתפקוד המעי בגברים)
- התכווצויות שרירים
- הסמקה
- צלצולים באוזניים (טיניטוס)
- חום גבוה, תחושה כללית לא טובה
- התקף לב ("יתכן בעקבות לחץ דם נמוך מאוד במטופלים מסוימים בסיכון גבוה, כולל מטופלים עם בעיות בזרימת הדם של הלב או המוח")
- שbez ("יתכן בעקבות לחץ דם נמוך מאוד במטופלים בסיכון גבוה")

תופעות לוואי נדירות (תופעות שטוףיעות ב-1-10 מעתמשים מטופר 10,000):

- חלומות משונים, בעיות שינה
- תופעת רינו (התכווצות כלי דם בדרך כלל באכבות הידיים והרגליים הגורמת לחווורן או לטלאים בצלב אדום-כחול והרגשת קור בעור)
- שינויים בבדיקות דם כגון: מספר נמוך של תאנים ואדומים, המוגלבין נמוך, רמה נמוכה של טסיות
- תסנין ריאתי (הצטברות של נזלים או חומרים אחרים בריאות הנראים בצלום רנטגן), דלקת ריאות (מתבטאת בסימנים של שיעול, חום גבוה וקשיי נשימה)
- דלקת באף
- כאב, דלקת או כיבים בחניים, בלחים, בלשון, בשפתים, בגרון
- בעיות בכבד או בכיס המרה כגון: ירידת בתפקוד כבד, דלקת בכבד העולוה לגרום לצהבת (צהבת העור או העיניים), עליה ברמות אנדמי כבד או בילירובין (نمדים בבדיקות דם)
- ירידת בסך כמהות השנת המזיצר ליום
- הגדרת שדים בגברים
- דיכוי מח עצם
- מחלות אוטואימוניות
- דלקת עור אקספוליאטיבית/אריתרודרומה (פריחה חמורה בעור הכוללת קילוף של העור), פמפיגוס (בליטות קטנות בעור המלאות בנזול)
- נפיחות של בלוטות למפה בצוואר, בית שחן או המפשעה

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמייפות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000): נפיחות בעורקים (אנגיואדמיה בעורקים). הסימנים יכולים לכלול כאב בטן, בחילה, הקאות

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- "ឯ"וצר יתר של הורמן נגד השתנה הגורם לאצירת נזלים ובעקבות כך לחולשה, עייפות או בלבול.
- דוח על מכלול תסמינים אשר יכולים לכלול חלק או כל התסמינים הבאים: חום גבוה, דלקת של כל הדם (סרויסיטיס/וסקוליטיס), כאב שרירים (מיאלגיה/מיוסיטיס), כאב מפרקים (ארטראגליה/ארטראיטיס), פריחה, רגישות יתר לאור או תופעות עוריות אחרות

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואה מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, عليك להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי", שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור <https://sideeffects.health.gov.il>

בדיקות דם

אנפלריל עשוי להשפיע על חלק מתוצאות בדיקות הדם, כולל: תא דם או מרכיבים אחרים בדם, רמות האשלגן, קריינטינין או אוריאה, נתרן, אנזימי CBD או ביילרוביין.
לפני בדיקת דם, חשוב מאוד שתידע את הרופא שאתה גוטל אנפלריל.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת התרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלתם. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרית תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אחסון במקום יבש, מתחת ל-25°C.
- אין להשליך תרופה לביב או לפח אשפה ביתית. שאל את הרופך איך להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוספת

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, starch pregelatinized, maize starch, sodium hydrogen carbonate, magnesium stearate.

אנלדקס 10 מ"ג ואנדקס 20 מ"ג מכילים גם Iron oxide red (E172).

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

- **אנלדקס 5 מ"ג:** טבליות לבנות, עגולות, קמורות משני הצדדים, עם קו חלוקה בצד אחד.
- **אנלדקס 10 מ"ג:** טבליות ורודות, עגולות, קמורות משני הצדדים, עם קו חלוקה לרבעים בצד אחד.
- **אנלדקס 20 מ"ג:** טבליות ורודות, עגולות, קמורות משני הצדדים, עם קו חלוקה לרבעים בצד אחד. גודלי אריזה מאושרים: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30 טבליות. יתכן שלא כל גודלי האריזות משוקים.

נערך בינואר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אנלדקס 5 מ"ג: 115 84 29809 00

אנלדקס 10 מ"ג: 115 85 29810 00

אנלדקס 20 מ"ג: 115 86 29811 00

לשם הפטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נסוח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

צרכן ובעל רישום: דיקסל בע"מ, רח' דיקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל