

## עלון לצרcn לפi תקנות הרוקחים (תקשיים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

### **קורסודיל שטיפת פה v/w 0.2%**

חומר פעיל: כלורhexידין דיגלוקונאט v/w 0.2% chlorhexidine digluconate 0.2%

חומרם בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר- אנה ראה סעיף 2 תחת הכותרת מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה וסעיף 6.

קרה בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספתן, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך לשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף כיצד לשתמש בתרופה.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

- לעיכוב היוצרות פלאק
- עצר לטיפול ומניעת דלקת חניכיים (ג'ינג'יביטיס)
- עצר בשמירה על הגינות הפה
- לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי החניכיים
- לשימוש בכיבים, דלקות בעקבות שניים תותבות ובפרט בפה

קובוצה רפואיית: אנטיספטן.

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

אין לשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, אנה ראה סעיף 6 למרכיבים נוספים.

##### اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין לשתמש ילדים מתחת לגיל 12 שנים אלא בהמלצת רופא.
- יש לשתמש בחול הפה בלבד. אין לבלווע. שטופ ביסודות במים התכשיר בא מגע עם העיניים או עם האוזניים בלבד.
- במקרה של תגובה אלרגית קשה, עליך להפסיק השימוש ולגשת מיד לקלת עזרה. ראה 'תופעות לוואי'.
- משחות שניים עלולות לגרום לפגום בעקבות של שטיפת הפה. לאחר צחצוח השיניים, שטופ את פיך ביסודות עם מים והמתן 5 דקות לפני השימוש בקורסודיל לשטיפת הפה. לחילופין, אתה יכול לשתמש בשטיפת הפה בזמן אחר של היום.
- אין להלבין בדים שהו ב מגע עם שטיפת הפה.
- עלולה להופיע הכתמה זמנית של השיניים והלשן. ראה 'תופעות לוואי'.
- יתכן ויחול שינוי בתחום הטעם, או שתורגם תחושת צריבה, עקצוץ או נימול בחול הפה. ראה 'תופעות לוואי'.

אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

##### **ילדים וمتבגרים**

התרופה מיועדת לשימוש במטופלים מעל לגיל 12 שנה. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא לפני השימוש.

##### **אינטראקטיות/ תגובות בין תרופתיות:**

אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

##### **הריון והנקה**

ניתן לשתמש בתרופה אם את בהריון או מניקה.

**מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה**  
מרקוגוליגליצרול הידרוקסיסטארט עלול לגרום לתגובה בעור.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.  
**השתמש רק אם הסוגר על הפקק נמצא ובשלמותו לפני הפתיחה.**

**המינון המקורי בדרך כלל הוא:**  
השתמש פעמיים ביום. מלא את הפקק עד לoko 10 מ"ל. שטוף את הפה ביסודות למשך דקה אחת ולאחר מכן תירק.  
**דלקת חניים:** מומלץ להשתמש במשך חודש.  
**כיבים בפה ופרטת פה:** המשך להשתמש במשך 2 ימים לאחר החלמה.  
**דלקות פה בעקבות שניינים תותבות:** נקה והשרה את התותבות שלך בשטיפת הפה במשך 15 דקות פעמיים ביום.  
**לאחר ניתוחים דנטליים:** לשטוף לפיה הוראות רופא השיניים שלך.

אם התסמננים שלך נמשכים, פנה לרופא.  
**אין לעבור על המנה המומלצת.**  
**אין לבלווע.**

אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעל יلد מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אין לחתת תרופה בחושך!** בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שאתה לוקח תרופה. הרכיב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בקורסודיל שטיפת הפה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רישימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחד מהן.  
**הפסיק להשתמש בשטיפת הפה ופונה מיד לעזרה רפואי אם מופיעות אלה עלולות להיות תסמנים של תגובה אלרגית חמורה שהוא נדירה מאוד.**  
**בפניהם או אם יש לך קשיי נשימה.** תופעות אלה מופיעות אצל תסמנים של גבר או נשים-הלחחים. תופעות  
**הפסיק להשתמש בשטיפת הפה ופונה לרופא אם מופיע אצל גורי בפה, כאב או נפיחות של פנים-הלחחים.** אלן אמרות לחולף עם הפסקת הטיפול.  
**תופעות לוואי אחרות שכילות להתרחש:**

**הכתמה זמנית של הלשון,** התופעה נעלמת עם הפסקת הטיפול.  
**הכתמה זמנית של השיניים.** זו דרך כלל ניתנת להסרה על ידי צחצוח. אתה יכול למנוע הכתמה באמצעות המנעוט משתיית תה, קפה או יין אדום - במיעוד שעja לאחר השימוש, ועל ידי צחצוח יומיומי במשחת שניינים (ראה 'יכיז' תשתמש בתרופה'). אם הכתמה נותרת היא ניתן להסרה באמצעות ניקוי וליטוש אצל רופא השיניים או השינינית.  
אתה יכול לנוקות את התותבות שלך באמצעות ניקוי וטבוח ניקוי תותבות.  
יתכן שתבחן בשינוי בחוש הטעם, בתשושת צריבה, נימול, או עקצוץ בלשון כאשר אתה משתמש בשטיפת הפה לראשונה. זה בדרך כלל חולף עם המשך הטיפול.  
אם מתרחש **kılוף של העור** בתוך הפה, דלע את שטיפת הפה עם כמות שווה של מים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צוינה בעולון,  
עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי"  
שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או  
על ידי כניסה לקישור <https://sideeffects.health.gov.il>

### **5. איך לאחסן את התרופה?**

מנع הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות  
על ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן מתחת ל- 25°C. לשימוש עד 6 חודשים מהפתיחה.

## **6. מידע נוסף**

### **נוסך על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם –**

Purified water, Sorbitol liquid, Glycerol, macrogolglycerol hydroxystearate and Optamint 291616 flavour.

**כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץיה –** תמייסה שקופה, צוללה עד מעט עכורה, בריח מנטה. בקבוק של 300 מ"ל עם פקק מתברג.

**בעל הרישום ויבואן:**  
הלאון ס. איז' ישראל בע"מ, ת.ד. 3256, פתח תקווה

נערך באוגוסט 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-21599-96-029.

לשם הפשטות ולהקלת הקיריה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.