

עלון לצרכנית לפי תקנות הרווקחים (תקשיירם) התשמ"ו - 1986
התרופה מושווקת על פי מרשם רופא בלבד

אייברנסTM כמוסות 75 מ"ג
אייברנסTM כמוסות 100 מ"ג
אייברנסTM כמוסות 125 מ"ג
כמוסות

כל כמוסה מכילה:
palbociclib 75 מ"ג, 100 מ"ג או 125 מ"ג

רשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראי סעיף 2 תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספת".

קראי ביעין את **העלון עד סופו** **טרם** **תשימוש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פני אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעבורי אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

תרופה זו מיועדת לנשים ולגברים מעל גיל 18.

1. למה מיועדת התרופה?

אייברנס מיועדת לטיפול בסרטן שד מתקדם או גורומי, המבטא קולטנים לאסטログן ושלילי-HER2, בשילוב עם:

- מעכב ארוםטאצט טיפול משולב ראשוני (המבוסס על טיפול הורמוני).
- או
- פולואסטראנט (fulvestrant) במטופלים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול הורמוני קודם.

קבוצה רפואיית: אנטי נאופלסטי, מעכב קינאז.

**2. לפני השימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה אם:**

- את רגישה (אלרגיה) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול באיברנס, ספרי לרופא אם:

- את חשה בחום, צמרמותות או בכל תסמין אחר של זיהום.
- את סובלות מליקוי בתפקוד הכבד או הכלליות.
- את סובלות מכל בעיה רפואית אחרת.
- את בהירון או מתכנתת להיכנס להhirion. למידע נוסף יש לעיין בסעיף 2 תחת "הירון, הנקה ופוריות".
- את מניקה או מתעתקת להnik. למידע נוסף יש לעיין בסעיף 2 תחת "הירון, הנקה ופוריות".
- את חוווה סימנים או תסמינים של קרייש דם בוורידים כגון כאב או נזקשות, נפיחות ואדמדימות ברגל הפוגעה (או בזרוע), כאב בחזה, קוצר נשימה או סחרחות. אייברנס יכולה לגרום לקרייש דם בוורידים.

ספר לרופא אם אתה נוטל אייברנס ויש לך בת זוג שיכולה להיכנס להhirion. למידע נוסף יש לעיין בסעיף 2 תחת "הירון, הנקה ופוריות".

ילדים ומתבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. בטיחות ויעילות התרופה לא נבדקו ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

בדיקות ומעקב
הרופא יdag לביצוע בדיקות דם לפni השימוש בתרופה ובמהלך השימוש בתרופה.

אינטראקטיות בין תרופתיות
אם את לוקחת, או אם לך תחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם את לוקחת:

- תרופות העולות להעלות באופן משמעותי את רמת אייברנס בדם: קלריטרומיצין, טליתרומיצין (אנטיביוטיקה); איטראקונאזול, קטוקונאזול, פוסאקונאזול, ווריקונאזול (טיפול בזיהום פטרייתי); ריטונאבר, לופינאבר/ריטונאבר,

- אינדינאביר, נלפינאביר, סאקוינוואביר (טיפול בגיןיף האידס); טלפרביר (טיפול בדלקת הגוף); נפאזודון (טיפול בדלקת הגוף). יש להימנע משימוש בתכשירים אלו במהלך הטיפול באיברנו.
- תרופות העולות להוריד באופן משמעותי את רמת איברנו בدم: ריאפאFINEIN (טיפול בשחפת); פנטואין, קארבאאמצפין (טיפול באפילפסיה), היפריקום Wort St. John's (טיפול בדיכאון), אנדולוטמיד (לטרטן הערמוני), מודפניל (טיפול בהפרעות שינה); יש להימנע משימוש בתכשירים אלו במהלך הטיפול באיברנו.
- הימנע מacciית אשכליות, ממצריים המכילים אשכליות ומשתנית מיצ' אשכליות במהלך תקופת הטיפול עם איברנו. השימוש עלול להעלות את ריכוז התוּרָהָה בדם.
- תרופות אשר איברנו עלול להעלות את ריכוזם בדם: מידזולם (משמש לסתציה בהלכים רפואיים ולטיפול באפילפסיה), ציקלוספורין, סירולימוס, טקרולימוס (לديכי מערכת החיסון), נגזרות של ארגוטן (างון ארגומטן), דהידרארגומטן, אוורולימוס (טיפול בסרטן ולדיכי מערכת החיסון), פנטניל, אלפנטניל (לשיכוך כאבים חזקים/לאלהוחש), פימוזיד (נוירופטי), כינידין (להסדרת הפרעות בקצב הלב).

שימוש בתוּרָהָה ומזרן יש ליטול את התוּרָהָה עם הארכואה.

יש להימנע משתנית מיצ' אשכליות אוacciית אשכליות במהלך הטיפול באיברנו.

הירין, הנקה ופוריות

- לפני תחילת הטיפול באיברנו יש לידע את הרופא אם את בהירין או מתכנתה להיכנס להירין. תוּרָהָה זו עלולה להזיק לעובר שלך.
 - נשים אשר יכולות להיכנס להירין ונוטלות תוּרָהָה זו לצריכת השתמש באמצעות מנעה ייעילם במהלך הטיפול בירין ובמשך שלושה שבועות לפחות לאחר סיום הטיפול באיברנו. יתכן שהרופא שלך יבקש שתתעש בבדיקה הירין לפני התחלת הטיפול עם איברנו.
 - גברים אשר גוטלים איברנו ולהם בנות זוג אשר יכולות להיכנס להירין לצריכים לשימוש באמצעות מנעה יעילים במהלך הטיפול עם איברנו ובמשך שלושה חודשים לפחות לאחר סיום הטיפול באיברנו.
 - התיעצי עם הרופא לגבי אמצעי מנעה היכולים להתאים עבורך במהלך תקופת זו.
 - אם כניסה להירין או שקיים חשד להירין, יש לידע את הרופא באופן מיידי.
- לפני תחילת הטיפול באיברנו יש לידע את הרופא אם את מניקה או מתעטת להניק. לא ידוע האם תוּרָהָה זו מופרשת בחלבם. עלייך לדzon עם הרופא האם ליטול את התוּרָהָה או להניק. אין להניך גם במשך 3 שבועות לאחר הפסקת הטיפול באיברנו.

איברנו יכולה לגרום לביעות פוריות לגברים. זה יכול להשפיע על יכולתך להביא ילדים. פנה לרופא לקבלת ייעוץ לפני תחילת הטיפול עם איברנו אם יש לך חששות בנושא פוריות.

נהיגה ושימוש במכונות

עיפויו היא תופעת לוואי שכיחה מאוד. אם את מרגישה עיפה באופן חריג, יש להיזהר במיוחד במקרה או שימוש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התוּרָהָה איברנו מכילה לקטוז ונתרן.

תקשר זה מכיל לקטוז (נמצא בחלב או במוציא חלב). אם נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לך סבירות לסתוכרים מסוימים, פני לרופא שלך לפני נטילת התוּרָהָה.

תקשר זה מכיל פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתן לכל כמוסה, כולל נחشب נתול נתן.

3. כיצד תשתמש בתוּרָהָה?

יש לשמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בעוֹת בוגע למינון ואופן נטילת התכשיר.

- המין ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. מינון איברנו המקביל בדרך כלל הוא:
 - כמוסה של 125 מ"ג פעם ביום, עם הארכואה, במשך 21 ימים רצופים ולאחר מכן הפסקה בת 7 ימים בנטילת התוּרָהָה, להשלמת מחזור של 28 ימים.
 - כאשר איברנו ניתנת בשילוב עם מעכב אرومטАЗ, יש לקחת את המין המקביל של מעכב הארוםטАЗ. יש לעיין בעלון לצריך של מעכב הארוםטАЗ.
- כאשר איברנו ניתנת בשילוב עם פולווסטראנט, המין המקביל של פולווסטראנט הוא 500 מ"ג ביום, 15-29 ופעם בחודש לאחר מכן. יש לעיין בעלון לצריך של פולווסטראנט.

אין לעבר על המנה המומלצת.

- חשוב ליטול את התוּרָהָה בערך באותו הזמן בכל יום.
- צורת הנטילה: יש לבלוּע את הכמוסה בשלמותה. אין למלעט, לחצוץ/לפתח או לכטוש את הכמוסות.
- אין לשנות את המין או להפסיק את הטיפול בתוּרָהָה ללא הוראה מהרופא.

אם נטלה בטיעות מינון גבוה יותר

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד מלבד מן התרופה, פני מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והביאו את אריזת התרופה אליו.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרש, או אם הקאתה לאחר נטילת המנה, אין ליטולמנה נוספת באותו יום. קחתי את המנה הבאה בזמן הריגל והוועצי ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדקתי התוויות והמנה **בכל פעם** שהינך נוטלת תרופה. הרכיבי משקפיים אם הינך זוקה להם.

אם יש לך שאלות נוספות הקשורות בnageuse לשימוש בתרופה, היועצֵי ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באיברנס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשמשות. אל תיבחלי למקרא רשימת תופעות הלואאי. יתכן שלא תסבלי מכך אחד מהן.

יש לפנות מיד לרופא במקרה של:

- **ירידה בספירת תאי הדם הלבנים במחזר הדם (נויטרופניה):** ירידה בספירת תאי הדם הלבנים בדם היא מצב מאד שכיח בשימוש בתרופה זו. מצב זה יכול להוביל לדיזומות חמורות, העולמים להוביל למותות. הרופא שלך יבצע ניתוח של ספירות תאי הדם הלבנים שלך לפני ובמהלך הטיפול בתרופה זו.
- אם את מפתחתה במהלך הטיפול עם איברנס ירידה בספירת תאי הדם הלבנים, יתכן שהרופא שלך יורה לך להפסיק את הטיפול, להפחית את המינון או להמתין טרם התחלת מחזר הטיפול הבא. פניו לרופא מיד אם את חשת בתסמינים של>Zihom כגון חום או צמרמות.

ירידה בספירת כדורי הדם האדומים וירידה בספירת הטסיות במחזר הדם: ירידה בספירת כדורי הדם האדומים ובמספרת הטסיות במחזר הדם היא מצב שכיח בשימוש בתרופה זו. פניו לרופא מיד אם את מפתחתה את אחד מהתסמינים הבאים במהלך הטיפול: סחרחות, קוצר נשימה, חולשה, נתיחה מוגברת לדימום או שף דם, דימום מהאף.

בעיות בריאה (פנאומוניטיס): איברנס עלולה לגרום לדלקת חמורה או מסכנת חיים של הריאות במהלך הטיפול שעוללה להוביל למותות. פניו לרופא שלך מיד אם יש לך תסמינים חדשים או החמרה כולן קשי נשימה או קוצר נשימה, שישול עם או ללא ליהה, כאב בחזה. יתכן שהרופא יפסיק באופן זמני או לחולטן את הטיפול עם איברנס אם התסמינים חמורים.

• כאב ונפיחות ברגל, כאב בחזה, קוצר נשימה, נשימה מהירה או קצב לב מהיר כיוון שאלה יכולם להיות סימנים של קריishi דם בוורידים.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (10%) של איברנס במתן יחד עם לטרוזול או פולווסטראנט: מיטרופניה, תרומבווציטופניה (ירידה ברמת הטסיות), אנמיה, יובש בעור, הפרעה בחוש הטעם, עייפות, דיזומות, בחילה, פריחה, דלקת וכאבים בפה, שיר דק יותר או נשירת שירע, שלשול, ירידה/חוסר בתיאבון, הקאות, חולשה, לויוקופניה (ירידה ברמת תאי דם לבנים), חום.

תופעות לוואי נסכנות של איברנס במתן יחד עם לטרוזול או פולווסטראנט: טשטוש ראייה, יובש בעין, דמיעה מוגברת, דימום מהאף, חום נויטרופני, חריגות בבדיקות דם של אণמי הכבד.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואאי חמירה, או כאשר את סובלת מהתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי".
שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מוחז להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרמי להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריך תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון שלו אותו חדש.
- אחסני בטמפרטורה מתחת ל-30°C.
- אין להשתמש בתרופה אם את מבכינה בנסיבות שהין שבורות/סודות/נראות פגומות.
- ח' מדף לאחר פתיחה ראשונה: 6 חודשים.

6. מידע נוסף

נוסח על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, sodium starch glycolate, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, hard gelatin capsule shell and printing ink. The hard gelatin capsule shell contains gelatin, red iron oxide, yellow iron oxide and titanium dioxide.

כמוסות איברנס 75 מ"ג מכילה 55.77 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

כמוסות איברנס 100 מ"ג מכילה 74.37 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

כמוסות איברנס 125 מ"ג מכילה 92.96 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץיה:

איברנס כמוסות 125 מ"ג: כמוסה אוטומה, בצבע קרמל, עם המילה "Pfizer" מוטבעת לבן בחלק העליון, ו- "PBC 125" בחלק התחתון.

איברנס כמוסות 100 מ"ג: כמוסה אוטומה, שחלקה העליון בצבע קרמל ועליו מוטבע "Pfizer" לבן והחלק התחתון בצבע כתום ועליו מוטבע "PBC 100".

איברנס כמוסות 75 מ"ג: כמוסה אוטומה, בצבע כתום, עם המילה "Pfizer" מוטבעת לבן בחלק העליון, ו- "PBC 75" בחלק התחתון.

כל בקבוק מכיל 21 כמוסות.

בעל הרישום וכותבתו: פיזר פרמצטטייקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח 46725.

מספר רישום התרופות בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות הם:

איברנס כמוסות 75 מ"ג: 156-88-34525

איברנס כמוסות 100 מ"ג: 156-89-34528

איברנס כמוסות 125 מ"ג: 156-90-34529

עודכן ב-08/2024.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון נקבה. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.