

محلول للحقن ضمن قلم جاهز للإستعمال للحقن تحت الجلد

المادة الفعالة:

أوفاتوموماب 50 ملغ/ملل ofatumumab 50 mg/ml

يحتوي كل 1 ملل محلول للحقن على 50 ملغ أوفاتوموماب.

يحتوي كل قلم جاهز للإستعمال على 20 ملغ أوفاتوموماب في 0.4 ملل محلول.

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية: أنظر الفقرة 2 بند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفر لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه لآخرين. هو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

كسيمپتا مخصص لعلاج الكبار الذين يعانون من أشكال إننكاسية من التصلب المتعدد (relapsing forms of multiple sclerosis) (RMS) مع مرض نشط الذي يُعرف بواسطة مميرات سريرية أو تصويرية.

الفصيلة العلاجية: من الأدوية المثبطة للمناعة من نوع الأضداد وحيدة النسيلة (immunosuppressants, monoclonal antibodies)

كيف يعمل كسيمپتا

يعمل كسيمپتا بواسطة الإرتباط بالمستقبل المسمى CD20 على سطح خلايا B. خلايا B هي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تشكل جزء من جهاز المناعة (دفاعات الجسم). في مرض التصلب المتعدد، يهاجم جهاز المناعة الطبقة الواقية المحيطة بالخلايا العصبية. تشتراك خلايا B في هذه العملية. يستهدف كسيمپتا ويخلص من خلايا B وبذلك يقلل من إحتمال الإننكاس، يخفف من الأعراض ويطلق من تقدم المرض.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الألرجي) لـ أوفاتوموماب أو لكل واحد من المركبات الإضافية في هذا الدواء (مفصلة في الفقرة 6).
- قيل لك بأنه لديك مشاكل خطيرة في الجهاز المناعي.
- كنت تعاني من تلوث خطير.
- وجود لديك سرطان.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال كسيمپتا

- قد يؤدي كسيمپتا إلى إعادة تشيهيز فيروس التهاب الكبد B. سوف يجري الطبيب فحص دم من أجل التأكد فيما إذا كنت معرضاً لخطورة حدوث تلوث إلتهاب الكبد B. إذا أظهر هذا الشخص بأنك أصبحت بإلتهاب الكبد B في الماضي أو كنت تحمل فيروس إلتهاب الكبد B، فسوف يطلب منه الطبيب التوجه إلى مختصل.

إعطاء لقاح للأطفال حديثي الولادة

إنتشاري الطبيب بخصوص الخيارات المتوفرة.

إذا أصبحت حاملاً أو تعتقدين بأنه من شأنك أن تصبحي حاملاً خلال العلاج أو بمدى قدره 6 أشهر بعد المقدار الدوائي الأخير، بلغ الطبيب بشكل فوري. سوف يتحدث معك الطبيب حول المخاطر الممكنة له كسيمپتا على العمل. سبب ذلك هو أن كسيمپتا يمكنه يقلل عدد خلايا المناعة (خلايا B) سواء لدى الأم ولدى الجنين. يمكنك التبليغ عن حملك بواسطة التوجه للممثل المحلي لشركة نوفاريس (أنظر الفقرة 6)، بالإضافة للتوجه إلى الطبيب.

الإرتفاع

يمكن أن ينتقل كسيمپتا إلى حليب الأم. تحذير مع الطبيب بخصوص الفوائد والمخاطر قبل أن ترضعي طفلك خلال إستعمال كسيمپتا.

السيادة وإستعمال الماكولات

لا يوجد له كسيمپتا تأثير أو له تأثير ضئيل على القدرة على السيادة وإستعمال الماكولات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغ) للمقدار الدوائي، وبالتالي هو فعلياً "خالي من الصوديوم".

3) كيفية إستعمال كسيمپتا؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكون واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

يُعطى كسيمپتا بالحقن تحت الجلد (من تحت الجلد).

إن عملية الحقن الأولى يجب أن تتم تحت تعليمات فرد من الطاقم الطبي.

إن أقلام كسيمپتا الجاهزة للاستعمال مخصصة للاستعمال لمرة واحدة فقط.

لتليميدات مفصلة بخصوص كيفية حقن كسيمپتا، أنظر "تعليمات إستعمال قلم كسيمپتا من نوع Sensoready" في نهاية هذه النشرة.

يمكنك إستعمال كسيمپتا في أي ساعة خلال اليوم (صباحاً، بعد الظهر أو مساءً).

ما هي كمية كسيمپتا التي يجب إستعمالها وبأي وتيرة يجب إستعمالها المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

- مقدار دوائي إبتدائي ذو 20 ملغ من كسيمپتا الذي يتم إعطائه في اليوم الأول للعلاج (الأسبوع 0)، بعد مضي أسبوع وبعد أسبوعين (الأسبوع 1 والأسبوع 2). بعد عمليات الحقن الـ 3 الأولى هذه، لا توجد عملية حقن

في الأسبوع الذي يلي ذلك (الأسبوع 3).

- إبتداء من الأسبوع 4 وبعد ذلك مرة في الشهر، المقدار الدوائي الموصى به هو 20 ملغ من كسيمپتا.

بلغ الطبيب:

- إذا ظهر لديك رد فعل عام متعلق بالحقن أو رد فعل موضعي متعلق بمكان الحقن. هذه الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً له كسيمپتا وهي موصوفة في الفقرة 4. تحدث هذه الأعراض الجانبية عادة خلال 24 ساعة بعد حقن كسيمپتا، خاصة بعد عملية الحقن الأولى. إن عملية الحقن الأولى يجب أن تجري وفق تعليمات فرد من الطاقم الطبي.

- إذا كنت تعاني من تلوث. قد تتطور لديك تلوثات بسهولة أكبر أو قد يتافق تلوث موجود لديك حالياً. سبب ذلك هو أن خلايا المناعة التي يستهدفها كسيمپتا تساعد أيضاً في محاربة التلوث. قد تكون التلوثات خطيرة لا بل أحياناً تشكل خطراً على الحياة.

- إذا كنت تخطط لتلقي أية لقاحات. سوف يخبرك الطبيب فيما إذا كان اللقاح الذي أنت بحاجته هو لقاح حي، لقاح حي-مضعنف أو لقاح من نوع آخر. لا يجوز تلقي لقاحات حية أو حية-مضعنفة خلال العلاج بـ كسيمپتا، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلوث. أنواع أخرى من اللقاحات من شأنها أن تكون أقل نجاعة إذا أعطيت خلال العلاج بـ كسيمپتا.

المقدار الدوائية	الموعده
20 ملغ	الأسبوع 0 (اليوم الأول للعلاج)
20 ملغ	الأسبوع 1
20 ملغ	الأسبوع 2
بدون حقن	الأسبوع 3
20 ملغ	الأسبوع 4
20 ملغ	بعد ذلك مرة في الشهر

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

فترقة العلاج

وواصل إستعمال كسيمپتا مرة في الشهر للمرة الزمنية التي وصفها لك الطبيب. سوف يفحص الطبيب حالتك بشكل منتظم ليحدد فيما إذا كان العلاج يحقق التأثير المرجو.

إذا توفرت لديك أسئلة بخصوص مدة إستعمال كسيمپتا، توجه للطبيب.

إذا إستعملت بالخطأً مقداراً دوائياً أكبر

إذا حققت أكثر مما ينبغي من كسيمپتا، إتصل بالطبيب بشكل فوري.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفل بالخطأً من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت إستعمال كسيمپتا من أجل تحقيق الفائدة الكاملة من كسيمپتا، فمن المهم أن تتلقى كل حقنة في موعدها.

إذا نسيت حقنة من كسيمپتا، فعليك أن تحقن لنفسك بأسرع وقت ممكن. لا يجوز الانتظار حتى المقدار الدوائي التالي المخطط له. يجب حساب مواعيد عمليات الحقن المستقبلية من اليوم الذي حققت فيه هذا المقدار الدوائي وليس وفق جدول المواعيد الأصلية (أنظر أيضاً ما هي كمية كسيمپتا التي يجب إستعمالها وبأي وتيرة يجب إستعمالها) (أعلاه).

يجب المواطبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن إستعمال كسيمپتا

لا يجوز التوقف عن إستعمال كسيمپتا، أو تغيير المقدار الدوائي دون التحدث مع الطبيب.

أعراض جانبية معينة يمكن أن تكون متعلقة بإنخفاض مستوى خلايا B في دمك. بعد التوقف عن العلاج بـ كسيمپتا، فإن مستوى خلايا B في دمك ستترتفع تدريجياً إلى المستوى السليم. هذه المسيرة يمكن أن تستمر عدة أشهر. خلال هذه الفترة الزمنية، فإن بعض الأعراض الجانبية الموصوفة في هذه النشرة لا يزال بإمكانها أن تحدث.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كسيمپتا قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن لا تعاني أي منها.

الأعراض الجانبية له كسيمپتا مفصلة فيما يلي. إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، بلغ الطبيب.

شائعة جداً (very common) - من شأنها أن تؤثر على أكثر من مستعمل 1 من بين 10

- تلوثات في الطرق التنفسية العلوية، مع أعراض مثل ألم في الحنجرة ورash - ردود فعل تتعلق بالحقن، مثل سخونة، صداع، آلام عضلية، قشعريرة وإرهاق - هذه الأعراض تحدث عادة خلال الـ 24 ساعة بعد حقن كسيمپتا، خاصة بعد عملية الحقن الأولى

- تلوثات في المسالك البولية

- ردود فعل في مكان الحقن، مثل إحمرار، ألم، حكة وإنفاس في مكان الحقن شائعة (common) - من شأنها أن تؤثر على 1-10 مستعملين من بين 100

- إنخفاض نسبة البروتين المسمى الغلوبولين المناعي M في الدم، الذي يساعد في الحماية من التلوثات

- هرpes في منطقة الفم

- غثيان، تقيؤ (بلغ عنها فيما يخص ردود الفعل المتعلقة بالحقن) أعراض جانبية شيوعاً غير معروفة (أعراض شيوعاً لم يُحدد بعد)

- ردود فعل تحسسية مع أعراض مثل طفح، شرى، صعوبات في التنفس، إنفاس الوجه، الجفنين، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة، ضغط في الصدر، أو الشعور بإغماء

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بـ Novartis على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الموقع الإلكتروني للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان التبليغ لشركة Novartis بواسطة عنوان البريد الإلكتروني التالي: safetydesk.israel@novartis.com

بلغ الطبيب بشكل فوري إذا قاسيت من إحدى الأعراض التالية خلال العلاج بـ كسيمپتا، لأنها قد تكون علامات لحالة خطيرة:

- إذا وجد لديك طفح، شرى، صعوبات في التنفس، إنفاس الوجه، الجفنين، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة، ضغط في الصدر، أو كنت تشعر بإغماء. قد تكون هذه علامات أو أعراض لرد فعل حساسية.
- إذا كنت تعتقد بأن التصلب المتعدد يتفاقم (مثل ضعف أو تغير في الرؤية) أو إذا لاحظت أية أعراض جديدة أو شاذة. قد تدل هذه الأعراض على إضطراب دماغي نادر يسمى إعتلال بيضاء الدماغ متعدد البؤر المتفرق (PML)، الذي ينجم عن تلوث فيروسي.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة. لا توفر معلومات بخصوص سلامة ونجاعة إستعمال هذا الدواء لدى أطفال وموهقين دون عمر 18 سنة.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل أو إذا استعملت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص:

إذا كنت تستعمل، إستعملت مؤخراً أو من شأنك أن تستعمل أدوية التي تؤثر على جهاز المناعة. ذلك لأنه قد يكون لهذه الأدوية تأثير إضافي على جهاز المناعة.

إذا كنت تخطط لتلقي أية لقاحات (أنظر "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء" أعلاه).

الحمل والإرتفاع

إذا كنت حاملاً أو مريضة، تعتقدين بأنه من شأنك أن تكوني حاملاً أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب قبل إستعمال كسيمپتا وخلال 6 أشهر بعد التوقف عن إستعماله.

الحمل

عليك الامتناع عن الحمل خلال إستعمال كسيمپتا وخلال 6 أشهر بعد التوقف عن إستعماله.

إذا كان هناك إحتمال بأن تصبحي حاملاً، فعليك إستعمال وسيلة من حمل ناجحة خلال العلاج ولمدة 6 أشهر بعد التوقف عن العلاج بـ كسيمپتا.

إنتشاري الطبيب بخصوص الخيارات المتوفرة.

إذا أصبحت حاملاً أو تعتقدين بأنه من شأنك أن تصبحي حاملاً خلال العلاج أو بمدى قدره 6 أشهر بعد المقدار الدوائي الأخير، بلغ الطبيب بشكل فوري. سوف يتحدث معك الطبيب حول المخاطر الممكنة له كسيمپتا على العمل.

على العمل. سبب ذلك هو أن كسيمپتا يمكنه يقلل عدد خلايا المناعة (خلايا B) سواء لدى الأم ولدى الجنين. يمكنك التبليغ عن حملك بواسطة التوجه للممثل المحلي لشركة Novartis (أنظر الفقرة 6)، بالإضافة للتوجه إلى الطبيب.

الإرتفاع

يمكن أن ينتقل كسيمپتا إلى حليب الأم. تحذير مع الطبيب بخصوص الفوائد والمخاطر قبل أن ترضعي طفلك خلال إستعمال كسيمپتا.

إعطاء لقاح للأطفال حديثي الولادة

إنتشاري الطبيب قبل إعطاء لقاح طفلك حديث الولادة وذلك لإستعمال كسيمپتا خلال فترة حمله (أنظر "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء" أعلاه).

الإرتفاع

يمكن أن ينتقل كسيمپتا إلى حليب الأم. تحذير مع الطبيب بخصوص الفوائد والمخاطر قبل أن ترضعي طفلك.

السيادة وإستعمال الماكولات

لا يوجد له كسيمپتا تأثير أو له تأثير ضئيل على القدرة على السيادة وإستعمال الماكولات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغ) للمقدار الدوائي، وبالتالي هو فعلياً "خالي من الصوديوم".

3) كيفية إستعمال كسيمپتا؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكون واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

يُعطى كسيمپتا بالحقن تحت الجلد (من تحت الجلد).

إن عملية الحقن الأولى يجب أن تتم تحت تعليمات فرد من الطاقم الطبي.

إن أقلام كسيمپتا الجاهزة للاستعمال مخصصة للاستعمال لمرة واحدة فقط.

للتليميدات مفصلة بخصوص كيفية حقن كسيمپتا، أنظر "تعليمات إستعمال قلم كسيمپتا من نوع Sensoready" في نهاية هذه النشرة.

يمكنك إستعمال كسيمپتا في أي ساعة خلال اليوم (صباحاً، بعد الظهر أو مساءً).

ما هي كمية كسيمپتا التي يجب إستعمالها وبأي وتيرة يجب إستعمالها المقدار الدوائي و

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التسوس بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

يجب حفظ القلم في علبة الكرتون الخارجية من أجل حمايته من الضوء. يجب التخزين في البراد (2-8 درجات مئوية). لا يجوز التجميد.

عند الحاجة، بالإمكان ترك كسيميپتا خارج البراد حتى 7 أيام لمرة واحدة بدرجة حرارة الغرفة (بدرجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية).

طالما لم يتم الإستعمال خلال هذه الفترة، بالإمكان إعادة كسيميپتا إلى البراد لمدة أقصاها 7 أيام.

لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا لاحظت بأن المحلول يحتوي على جسيمات تبدو للعين أو إذا كان عكرأ.

لا يجوز رقمي أدوية في المجرى أو في القمامنة المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الخطوات في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على: arginine, sodium acetate trihydrate, sodium chloride, polysorbate 80, disodium edetate, hydrochloric acid (for pH adjustment) and water for injections.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

- كسيميپتا عبارة عن محلول رائق حتى ساطع قليلاً، عديم اللون حتى أصفر -بني شاحب.

- تحتوي كل علبة على قلم واحد جاهز للإستعمال، للإستعمال لمرة واحدة.

صاحب الإمكانيات والمستورد وعنوانه: نوفارتيتس إسرائيل م.ض، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم إعدادها في تموز 2024.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 167-85-36656 من أجل سهولة وتوسيع القراءة تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تعليمات إستعمال قلم كسيميپتا من نوع Sensoready

من المهم أن تفهم تعليمات الإستعمال قبل حقن كسيميپتا ومن المهم أن تتصرف وفقها. تحدث مع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا توفرت لديك أية أسئلة قبل إستعمال كسيميپتا في المرة الأولى.

تذكر:

• لا يجوز إستعمال القلم إذا كان الختم الموجود على علبة الكرتون الخارجية أو الختم الموجود على القلم معطوباً. حفظ القلم في علبة الكرتون الخارجية المغلقة حتى تكون جاهزاً لاستعماله.

• لا يجوز خصم القلم.

• إذا أسقطت القلم، فلا يجوز إستعماله إذا بدا معطوباً أو إذا أسقطته بعد نزع الغطاء عنه.

• يجب التخلص من القلم المستعمل فوراً بعد الإستعمال. لا يجوز إعادة إستعمال القلم. انظر "كيف يتوجب على التخلص من قلم كسيميپتا المستعمل من نوع Sensoready؟" في نهاية تعليمات الإستعمال هذه.

كيف يتوجب على تخزين كسيميپتا؟

• يجب تخزين علبة الكرتون الخاصة بالقلم في البراد، ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية.


• يجب حفظ القلم في علبة الكرتون الأصلية إلى أن يكون جاهزاً لاستعمال وذلك لحمايةه من الضوء.

• لا يجوز تجميد القلم.

يجب حفظ كسيميپتا بعيداً عن مجال رؤية و متناول أيدي الأطفال.

أجزاء قلم كسيميپتا من نوع Sensoready (انظر الرسم A):

الرسم A'




قلم كسيميپتا من نوع Sensoready معروض بعد نزع الغطاء. لا يجوز نزع الغطاء إلى أن تكون مستعداً للحقن.

ماذا تحتاج من أجل الحقن:

مشمول في علبة الكرتون:

• قلم كسيميپتا جديد من نوع Sensoready (انظر الرسم B).


الرسم ط'



- المرحلة 5 أمسك القلم:
- أمسك القلم بزاوية 90 درجة باتجاه مكان الحقن الذي تم تنظيفه (انظر الرسم ط').
 - ✓ صحيح
 - ✗ غير صحيح


هام: خلال عملية الحقن ستسمع طقتين إثنين بصوت عالي:
• الطقة الأولى تشير إلى أن عملية الحقن قد بدأت.
• الطقة الثانية ستشير إلى أن عملية الحقن كانت أن تنتهي.
عليك مواصلة مسك القلم بقوة مقابل الجلد حتى يملئ المؤشر الأخضر النافذة ويتوقف عن الحركة.

الرسم ي'



- المرحلة 6. بدء عملية الحقن:
- إضغط القلم بقوة مقابل الجلد من أجل بدء عملية الحقن (انظر الرسم ي').
 - الطقة الأولى تشير إلى أن عملية الحقن بدأت.
 - واصل مسك القلم بقوة مقابل الجلد.
 - المؤشر الأخضر يظهر تقدم عملية الحقن.

الرسم ي أ'



- المرحلة 7. إنتهاء عملية الحقن:
- إصلاح للطقة الثانية. يدل هذا الأمر على أن عملية الحقن كانت أن تنتهي.
 - تأكد من أن المؤشر الأخضر قد ملا النافذة وتوقف عن الحركة (انظر الرسم ي أ').
 - الآن بالإمكان إخراج القلم (انظر الرسم ي ب').


الرسم ي ب'



- بعد عملية الحقن:
- إذا لم يملئ المؤشر الأخضر النافذة، ذلك يعني بأنك لم تلتقط المقدار الدوائي الكامل. توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي، إذا لم يكن المؤشر الأخضر ظاهراً للعين.
 - من الجائز وجود كمية قليلة من الدم في مكان الحقن. يمكنك الضغط بواسطة كرة قطن أو شاش، على مكان الحقن وبالبقاء على هذا النحو 10 ثوانٍ. لا يجوز فرك مكان الحقن. يمكنك تغطية مكان الحقن بواسطة پلاستر صغير، إذا استمر النزف.

كيف على التخلص من قلم كسيميپتا المستعمل من نوع Sensoready؟


الرسم ي ج'



- المرحلة 8. التخلص من قلم كسيميپتا من نوع Sensoready:
- يجب التخلص من القلم المستعمل في وعاء للنفايات الحادة (أي، وعاء مقاوم للثقب حيث يمكن إغلاقه أو وعاء مشابه) (انظر الرسم ي ج').
 - لا تحاول إطلاقاً إعادة إستعمال القلم.

يجب حفظ وعاء النفايات الحادة بعيداً عن مجال رؤية و متناول أيدي الأطفال.

الرسم ج'




أنظر "كيف يتوجب على التخلص من قلم كسيميپتا المستعمل من نوع Sensoready؟" في نهاية تعليمات الإستعمال هذه.

غير مشمول في علبة الكرتون

- (أنظر الرسم ج):
- 1 منديل كحولي
- 1 كرة قطن أو شاش
- وعاء للنفايات الحادة

قبل الحقن: أخرج القلم من البراد 15 حتى 30 دقيقة قبل عملية الحقن من أجل تمكينه من بلوغ درجة حرارة الغرفة.

الرسم د'




المرحلة 1. فحوص أمان مهمة قبل الحقن (انظر الرسم د'):

- أنظر عبر نافذة المشاهدة.
- يجب أن يكون السائل رائقاً حتى ساطع قليلاً.
- لا يجوز إستعماله إذا إحتوى السائل على جسيمات ظاهرة للعين أو إذا كان عكرأ.

من الجائز أن ترى فقاوة هواء صغيرة، هذه ظاهرة سلية.
• أنظر إلى تاريخ إنتهاء الصلاحية (EXP) الموجود على القلم الذي يحوزتك. لا يجوز إستعمال القلم إذا انقضى تاريخ الصلاحية. توجه إلى الصيدلي أو إلى فرد من الطاقم الطبي إذا أخفق القلم الذي يحوزتك في إحدى هذه الفحوص.


الرسم ه'



المرحلة 2. إختر مكان الحقن:

- المكان الموصى به هو المنطقة الأمامية من الفخذين. يمكنك أيضاً إستعمال المنطقة السفلية من البطن، لكن ليس في منطقة قدرها 5 سم من حول السرة (انظر الرسم ه').
- إختر مكان مختلف في كل مرة تحقن كسيميپتا.

- لا يجوز الحقن في مناطق يكون فيها الجلد حساساً، فيه كدمات، أحمراء، مغطى بقشرة أو قاسيأ. يجب الامتناع عن المناطق التي فيها ندب أو علامات شد أو أماكن فيها تلوث.
- إذا كان معالج أو فرد من الطاقم الطبي هو من يعطيك الحقنة، فإيمانهم الحقن أيضاً في المنطقة الخارجية من أعلى الذراع (انظر الرسم و').




الرسم ز'



المرحلة 3. نُظّف مكان الحقن:

- إغسل يديك بالماء والصابون.
- نُظّف مكان الحقن بواسطة منديل كحولي بحركة دائيرية. دعه يجف قبل الحقن (انظر الرسم ز').
- لا يجوز أن تلمس ثانية المنطقة التي تم تنظيفها قبل الحقن.

الرسم ح'



عملية الحقن: إزّاع الغطاء:

- يجب نزع الغطاء فقط عندما تكون مستعداً لاستعمال القلم.
- إزّاع الغطاء بواسطة تدويره مع إتجاه السهم (انظر الرسم ح').
- تخلص من الغطاء. لا يجوز محاولة إعادة الغطاء إلى مكانه.
- إستعمل القلم خلال 5 دقائق من لحظة نزع الغطاء.

الرسم أ'

قلم كسيميپتا من نوع Sensoready معروض بعد نزع الغطاء. لا يجوز

نزع الغطاء إلى أن تكون مستعداً للحقن.

الرسم ب'

ماذا تحتاج من أجل الحقن:

مشمول في علبة الكرتون:

• قلم كسيميپتا جديد من نوع Sensoready (انظر الرسم ب').