



עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תקשיירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

אימיטרקס טבליות 50 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבליה מכילה:

סומאטריפטאן (C-סוקצינט) 50 מ"ג

Sumatriptan (as succinate) 50 mg

אימיטרקס טבליות 100 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבליה מכילה:

סומאטריפטאן (C-סוקצינט) 100 מ"ג

Sumatriptan (as succinate) 100 mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 – " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – " מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אימיטרקס טבליות משמשת להקלת אקוטית בהתקף מיגרנה, עם או בלי כאורה.

יש להשתמש באימיטרקס טבליות רק כאשר ישנה אבחנה ברורה של מיגרנה.

תסמיני מיגרנה עלולים להגרם על ידי התרחבות זמנית של כלי דם בראש. אימיטרקס טבליות נחשבת כmphjtihah את ההתרחבות של כלי דם אלה. זה ככלעמו מסייע לשכך את כאב הראש ולהקל על תסמינים אחרים של התקף מיגרנה, כגון בחילה או הקאה ורגישות לאור ולקול.

קבוצה תרפואיית

משככי כאבים: טריפטנים - אגוניסטים סלקטיביים לקולטן₁HT-5.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לסומאטריפטאן או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).
- אם יש לך בעיה לב כגון היצרות של העורקים (מחלת לב איסכמית) או כאבים בחזה (תעוקת חזה), או אם היה לך התקף לב.
- אם יש לך בעיות בזרימת הדם ברגליך אשר גורמות לכאבים דמווי התכווצות בזמן

היליכה (מחלת כל' דם היקפ"ים).

- אם היה לך אירוע מוחי או אירוע מוחי חולף (מכונה גם התקף איסכמי חולף או A/I).
- אם יש לך לחץ דם גבוה. יתכן שתוכל להשתמש באימיטרקס טבליות אם לחץ הדם הגבוה שלך הוא מתון ומטופל.
- אם יש לך מחלת כבד חריפה.
- עם תרופות אחרות למיגרנה, כולל אלו המכילות ארגוטאמין, או תרופות דומות כגון מתייסרגיד מלאט (methysergide maleate) או כל טריפטן או אגוניסט ל-HT-5 (כגון נארטריפטאן או זולמייטריפטאן).
- עם כל אחת מהתרופות נוגדות דיכאון הבאות:
 - מעכבי מונואmine אוקסידאז (MAOIs) או אם לקחת DOI בשבועיים האחרונים.

אם אחד מ אלה מתייחס אליו:

← **ספר לרופא שלך, ואל תשתמש באימיטרקס טבליות.**

اذהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרפיה
לפני הטיפול באימיטרקס טבליות ספר לרופא:

אם יש לך גורמי סיכון נוספים כלשהם

- אם הנך מעשן כבד, או משתמש בטיפול בתחום ניקוטין, ובמיוחד
- אם הנך גבר מעל גיל 40, או
- אם הינך אישة לאחר גיל המעבר

במקרים נדירים מאוד, אנשים פיתחו בעיות לב חריפות לאחר שימוש באימיטרקס טבליות, אף על פי שלא היו להם סימנים של מחלת לב לפני כן. אם אחת מהנקודות מעלה מתייחסת אליו יתכן שיש לך סיכון גדול יותר לפתח מחלת לב - לכן:

← **ספר לרופא שלך כדי שתפקיד הלב שלך יוכל להיבדק לפני שאימיטרקס טבליות נרשמת עבורה.**

אם יש לך היסטוריה של התקפים (פרכוסים)
או אם יש לך מצבים אחרים אשר עלולים להגביר את הסיכון שהייה לך התקף - לדוגמה, פגיעה ראש או אלכוהוליזם:

← **ספר לרופא שלך כדי שתוכל להיות תחת מעקב הדוק יותר.**

אם היה לך לחץ דם גבוה יתכן שאימיטרקס טבליות לא מתאימה לך

← **ספר על נר לרופא שלך או לרוקח לפני השימוש באימיטרקס טבליות.**

אם יש לך מחלת כבד או כליה

אם אחד מ אלה מתייחס אליו:

← **ספר לרופא שלך או לרוקח לפני השימוש באימיטרקס טבליות.**

אם יש לך אי-סובילות לSOCרים מסוימים

← **ספר לרופא שלך כדי שתוכל להיות תחת מעקב הדוק יותר.**

אם אתה אלרגי לאנטיביוטיקות הנקרואוט סולפונאמידים

אם נר, יתכן שתיה אלרגי גם לאימיטרקס טבליות. אם אתה יודע שאתה אלרגי לאנטיביוטיקה אך איןך בטוח אם היא סולפונאמיד:

← **ספר לרופא שלך או לרוקח לפני השימוש באימיטרקס טבליות.**

אם אתה לוקח תרופות נוגדות דיכאון הנקרואוט SSRIs

(מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטוני) או SNRIs (מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטוני ונווראדרנלי) או TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים)

← **ספר על נר לרופא שלך או לרוקח לפני השימוש באימיטרקס טבליות.** ראה גם

"אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות" להלן.

אם אתה משתמש באימיטרקס טబליות לעתים קרובות

שימוש תכוף מיידי באימיטרקס טබליות עלול להחמיר את כאבי הראש שלך.

- ← **ספר לרופא שלך אם זה מתיחת אליר.** הרופא שלך עשוי להמליץ לך להפסיק להשתמש באימיטרקס טබליות.

אם אתה חש כאב או לחץ בחזה שלך אחרי שאתה משתמש באימיטרקס טබליות

תופעות אלה עלולות להיות עדות לכך הנה בדרך כלל חולפות במהירות. אם אין חולפות ב מהירות, או שהן ממחריות:

- ← **פנה מיד לקבלת עזרה רפואית.** סעיף 4 (המוריע בהמשך) כולל מידע נוסף על תופעות לוואי אפשריות אלה.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות:

ישנן תרופות שאסור ללקחת עם אימיטרקס טබליות, ואחרות עלולות לגרום לתופעות לוואי אם הן נלקחות עם אימיטרקס טබליות.

אם אתה לוקח, או אם לckerת לאחרונה, תרופות אחרות **כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה**, ספר עליך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- **ארוגוטאמין** שגム משמשת לטיפול במיגרנה, או תרופות דומות כגון מטיסרגיד (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה"). אל תשתחם באימיטרקס טබליות באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסיק לckerת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני השימוש באימיטרקס טබליות. אל תיקח שוב כל תרופה המכילה ארוגוטאמין או מרכיבים הדומים לארגוטאמין לפחות 6 שעות לאחר השימוש באימיטרקס טබליות.
- **טריפטנים/אגוניסטים לקולטן 1-HT-5** אחרים (כגון נאראטיריפטאן, ריזאטיריפטאן, צולמייטריפטאן), המשמשים גם לטיפול במיגרנה (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה"). אל תשתחם באימיטרקס טබליות באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסיק לckerת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני השימוש באימיטרקס טබליות. אל תיקח שוב טריפטן/אגוניסט לcoleutן 1-HT-5 נוסף לפחות 24 שעות לאחר השימוש באימיטרקס טබליות.
- **תרופות Is MAOIs** המשמשות לטיפול בדיכאון. אם לckerת אותן בשבועיים האחרונים אל תשתחם באימיטרקס טබליות.
- **תרופות Is SSRIs, SNRIs** ו- **TCAAs** (נוגדי דיכאון טריציקליים) המשמשות לטיפול בדיכאון. שימוש באימיטרקס טබליות עם תרופות אלה יכול לגרום לתסמנות סרוטוניים (אוסף של תסמים שיכולים לכלול חסור מנוחה, בלבול, הצעה, היזות, רפלקסים מגברים, התכווצויות שרירים, צמרמות, עלייה בדופק ורעד). ספר לרופא שלך מידית אם אתה מושפע באופן זה.
- **היפריקום פורטומ (St. John's Wort).** נטילת תרופות צמחיות המכילות היפריקום יחד עם אימיטרקס טබליות עלולה להעלות את הסבירות לתופעות לוואי.

הירין, הנקה ופוריות

- **אם הינך בהירין, חשבת שיתכן שהינך בהירין או מתכנתת להרות, היועצי לרופא לפני השימוש בתרופה.** יש מידע מוגבל בלבד על הבטיחות של אימיטרקס טබליות בנשים בהירין, אם כי עד כה אין ראייה לעלייה כלשהי בסיכון למומים מולדים. הרופא שלך ידוע איתך האם את צריכה או לא צריכה להשתמש באימיטרקס טබליות כשתאת בהירין.
- **אל תנייקי את תינוקך במשך 12 שעות לאחר השימוש באימיטרקס טබליות.** אם את שואבת חלב במהלך זמן זה, השילכי את החלב ואל תנייקי אותו לתינוקך.

נהיגה ושימוש במכונות

התרופה שלך או תסמיini המיגרנה עלולים לגרום לך לנממו. **אם אתה מושפע, אל תנהג או תפעיל מכונות.**

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
לקטוז: אם נאמר לך על ידי הרופא שהר שיש לך אי-סבירות למטופרים מסוימים, פנה לרופא
שלך לפני נטילת תרופה זו.
נטרן: תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבילה, אך ניתן לומר כי היא
למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד משתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

מתי לוקח אימיטרקס טబליות

- עדיף לנקחת אימיטרקס טబליות ברגע שאתה מרגיש **شمיגרנה מתחילה**, אם כי אתה יכול לנקחת אותה בכל זמן במהלך התקף.
- אין להשתמש באימיטרקס טబליות כדי** לנסוטו למנוע התקף - השימוש בה רק לאחר שתסמנני המיגרנה שלך מתחילה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקורי בדרך כלל הוא:

מבוגרים בגיל 18 עד 65

- המינון המקורי למבוגרים בגיל 18 עד 65** הוא טבילה אחת של אימיטרקס טబליות 50 מ"ג, הנבלעת בשלהותה עם מים. יתכן שמטופלים מסוימים יזדקקו למינון של 100 מ"ג - עליך לפעול בהתאם להמלצת הרופא שלך.

ילדים מתחת לגיל 18

- אימיטרקס טబליות** אינה מיועדת לשימוש בילדים מתחת לגיל 18 שנים.

מבוגרים (מעל גיל 65)

- אימיטרקס טబליות** אינה מיועדת לשימוש במבוגרים מעל גיל 65.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אם התסמניות שלך מתחילה לחזור

- אתה יכול לנקחת טבילה שנייה של אימיטרקס טబליות אם חלפו לפחות שעתיים מהטבילה
הראשונה. **אל תיקח יותר מ- 300 מ"ג בסך הכל ב- 24 שעות.**

אם לטבילה הראשונה לא הייתה השפעה

- אל תיקח טבילה שנייה או כל תכשיר אימיטרקס אחר לאחר מכן** להשתמש
באימיטרקס טబליות להתקף הבא שלך.

אם אימיטרקס טబליות לא הקלה עליך כל:
← פנה לרופא שלך או לרוקח לקבלת ייעוץ.

כתישה/חציה/לעיסה

הטבליות מצופות ולכן אין לכטוש/לחצוץ/לחקלק. יש לבלווע את הטבילה בשלהותה עם מים.

אם נטילת בטעות מינון גבוהה יותר של אימיטרקס טబליות

- אל תיקח יותר מש טבליות של 50 מ"ג או שלוש טבליות של 100 מ"ג (300 מ"ג** בסך הכל) **ב-24 שעות.**

נטילה של יותר מדי אימיטרקס טబליות יכולה לגרום לך לחЛОות. אם לנקחת יותר מ-300 מ"ג
ב-24 שעות:

← **פנה לרופא שלך לקבלת ייעוץ.**

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד ליד מן התווך, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התווך איתך.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווך והמנה **בכל פעע שנגנש נוטל תרופה**. הרכיב משקפיים אם הנר זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתווך, היועץ לרופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באימיטרקס טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשות תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן. חלק מהתסמים עלולים לגרום על ידי המיגרנה עצמה.

תגובה אלרגית: פנה מיד לרופא **לקבלת עזרה רפואי**.

תופעות הלואן הבאות התרחשו אך שכיחותן המדוייקת אינה ידועה.

- **סימני האלרגיה כוללים פריחה, חרלה (פריחה מגרדת); צפצופים; עפעפיים, פנים או שפטים נפוחים; קרייסת מערכות מוחלטת.**

אם אתה חווה אחד מתחומיים אלה זמן קצר לאחר השימוש באימיטרקס טבליות:

← **אל תשתמש יותר. פנה מיד לרופא.**

تופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-עד 1 מתוך 10 משתמשים)

- כאב, כבדות, לחץ או מתח בחזה, בגרון או בחלקים אחרים בגוף, או תחושות לא רגילות, הכוללות חוסר תחושה, עקצוץ וחום או קור. תופעות אלה עלולות להיות עזות אך בדרך כלל חולפות במהירות.

אם תופעות אלה ממשיכות או מחריפות (במיוחד הכאב בחזה):

← **פנה לקבלת עזרה רפואי בדחיפות.** במספר קטן מאוד של אנשים מסוימים אלה יכולים להגרם בשל התקף לב.

تופעות לוואי שכיחות אחרות כוללות:

- בחילה או הקאה, אם כי זה עלול להיות עקב המיגרנה עצמה
- עייפות או נמנום
- סחרחותר, תחושת חולשה או גלי חום
- עלייה זמנית בלחץ הדם
- קוצר נשימה
- שרירים כאבים.

تופעות לוואי נדירות מאוד (מופיעות ב-עד 1 מתוך 10,000 משתמשים)

- שינויים בתפקוד הגוף. אם עלייך לעורק בדיקת דם לתקודי כבד, ספר לרופא שאתה לוקח אימיטרקס טבליות.

חלק מהמטופלים עלולים לחוות את תופעות הלואן הבאות, אך לא ידוע מה היא תדירות הופעתן:

- פרכויסים/התקפים, רעדות, התכווצות שרירים קצרה-מועד/זמןית (שעלולה להשפיע על תנענות הלסת), קשין עורף
- הפרעות ראייה כגון הבחוב, רידעה בראיה, ראייה כפולה, אובדן ראייה ובמקרים מסוימים אפילו ליקויים בלתי הפיכים בראיה (אם כי אלה עלולים להיות בגל התקף המיגרנה עצמו)
- בעיות לב, בהן הדופק שלך עלול להיות מהיר יותר, איטי יותר או לשנות קצב, כאבים בחזה (תעוקת חזה) או התקף לב

- עור חיוור, בגין כחלחל ו/או כאב באצבעות, בבהונות, באוזניים, באף או בלסת שלך בתגובה לקור או למתח (תופעת ר'ינ')
- תחושת עילפון (לחץ הדם עלול לרדת)
- כאב בצד השמאלי התיכון של הבطن ושלשול דמי (דלקת איסכמית של המעי הגס)
- שלשול
- אם הייתה לך לאחרונה פציעה או אם יש לך דלקת (כמו שיגרון או דלקת במעי הגס) יתכן שתהוו כאב או החמרה בכאוב במקום הפגיעה או הדלקת
- כאב במפרקים
- תחושת חרדה
- קושי בבליעה
- הצעת יתר.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, عليك לה提יעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לkishor: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים וטוויהראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 30°C .
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולות הביתיים. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. עצדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם - אימיטרקס טבליות 50 מ"ג:

Lactose, lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide (E171), triacetin, iron oxide red (E172).

אימיטרקס טבליות 100 מ"ג:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide (E171).

- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:
טבליות אימיטרקס 50 מ"ג הן ורודות בצורה כמוסה. הן זמיןות באריזת בליסטר המכילה 2 או 6 טבליות.
טבליות אימיטרקס 100 מ"ג הן לבנות בצורה כמוסה. הן זמיןות באריזת בליסטר המכילה 2 או 6 טבליות.
יתכן שלא כל גודלי האריזות משוקים.
בעל הרישום ויבואן: גלקסומיטקלין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.
יצרן: גלקסומיטקלין טריידינג סרביסס לימייט, דבלין, אירלנד.

- מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
אימיטרקס טבליות 50 מ"ג: 102-91-28531
אימיטרקס טבליות 100 מ"ג: 055-93-26919
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
בערך ביוני 2024.
- סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינותו של קבוצת החברות של GSK.
© 2024 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

Imi Tab PT v7A