

ريبون 150 أقراص

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات - 1986)
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

التركيب:

يحتوي كل قرص من ريبون 150 على:
ريسدرونات صوديوم 150 ملг

Risedronate sodium 150 mg
لائحة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر،
أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركيبات الدواء"
والفقرة 6 "معلومات إضافية".
إقرئي النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت
تحتوى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، فإنها قد
ليدى أسلمة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطيه للآخرين، فهو قد
يضرهم حتى ولو بدا أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال أو للمرأهقين دون
عمر 18 سنة.

(1) لأي غرض مخصوص الدواء؟
هذا الدواء مخصوص لعلاج ولمنع مرض هشاشة العظام لدى
النساء بعد إقطاع الدورة الشهرية.
الفصيلة العلاجية: ينتهي هذا الدواء إلى الفصيلة العلاجية
بيسفوفونات.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
• كدت حساسة (ليدي أثيريجيا) للمادة الفعالة أو لكل واحد
من المركيبات الإضافية التي يحتويها الدواء - أنظر إلى
أيضاً الفقرة 6 "معلومات إضافية".
• وُجدت مشاكل معينة في المريء.
• كدت غير قادر على البقاء بوعضة منتصبة (جلوساً أو
وقوفاً) لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الدواء.
• كانت لديك حالة نقص في كالسيوم الدم (نسبة منخفضة
للكالسيوم في الدم).
• كانت تعانين من الجلاكتوزيمية، من مشاكل في إمتصاص
الجلوكوز والجالاكتوز أو من نقص في اللاكتاز، لأن
المستحضر يحتوي على الالكتوز.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء
قبل العلاج بـ ريبون 150، إحكام للطبيب إذا:

- كنت تعانين من مشاكل في البلع.
- كنت تعانين من مشاكل في الهضم.
- وُجدت نسب منخفضة للكالسيوم في الدم. بهذه الحال
من الجائز أن يصف لك الطبيب إضافات الكالسيوم
وفيتامين D خلال العلاج بـ ريبون 150.
- كنت تخاططين إجتياز عملية جراحية للأستان أو إقلاء
أستان. يجب المحافظة على نظافة الفم وإجتياز فحص
لدى طبيب الأسنان قبل بدء العلاج.
- كنت تعانين من مشكلة في الكلى.
- قيل لك بأن لديك صعوبة بإمتصاص المعادن في المعدة
أو في الأمعاء (malabsorption syndrome).
- كنت حاماً، تخاططين للحمل أو تشکین بذلك حامل. إذا
حملت خلال فترة العلاج بـ ريبون 150، توقيع في العلاج
بالمستحضر وتوجه إلى طبيب.
- كنت مرضعة أو تخاططين للأستان.

الأطفال والمرأهقون
هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال أو للمرأهقين دون
عمر 18 سنة.

التداللات/ التفاعلات بين الأدوية
إذا كنت تتناولين، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما
في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام
للطبيب أو للصيدلي عن ذلك، بالأسف إذا كنت تتناولين:
• مضادات الحموضة (antacids).

• أسيپيرين.

• أدوية مضادة للالتهاب الستيروئيدية (NSAIDs).
استعمال الدواء والطعام

هذا الدواء ناجع فقط إذا تم تناوله على معدة خاوية!

يجب الإنتظار 30 دقيقة على الأقل بين تناول ريبون 150
وبين تناول أية مستحضرات، إضافات غذائية وأية منتجات
طعام أو شراب (ما عدا ماء الحنفية).

الحمل والإرضا

ليست هناك معلومات كافية بخصوص إستعمال المستحضر
خلال فترة الحمل.

إذا كنت حاماً، تخاططين للحمل، تشکین بذلك حامل أو إذا
حملت خلال فترة العلاج بـ ريبون 150، توقيع في العلاج
بالمستحضر وتوجه إلى الطبيب للإستشارة.

الإرضاع
ليست هناك معلومات كافية بخصوص إستعمال المستحضر
خلال فترة الإرضاع. إذا كنت مرضعة أو تخاططين للإرضاع،
فلا يوصى بإستعمال المستحضر، توجه إلى الطبيب للإستشارة.

معلومات هامة عن بعض مركيبات الدواء
يحتوي هذا الدواء على الالكتوز، الذي قد يسبب الحساسية
للأشخاص الحساسين للالكتوز.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك
الإستسياح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكوني واثقة
بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.
المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال وللمرأهقين دون
عمر 18 سنة.
المقدار الدوائي الإعتيادي في حالة عدم توفر تعليمات أخرى
من الطبيب:
قرص واحد من ريبون 150 مرة واحدة في الشهر بتاريخ
محدد.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به!


يجب تناول القرص مع كأس ممتلئة من ماء الحنفية كأول
شيء بعد الإستيقاظ صباحاً، وذلك 30 دقيقة على الأقل قبل
وجبة الفطور، قبل شرب أي مشروب (عدا عن ماء الحنفية)
أو قبل تناول أي دواء. ماء الحنفية هو المشروب الوحيد الذي
يمكن تناوله مع المستحضر. لا يجوز تناول الدواء مع المياه
المعدنية وذلك لأن المياه المعدنية قد تحتوى على كميات
كبيرة من الكالسيوم.

يجب تناول القرص بوعضة الوقوف أو الجلوس، لا يجوز
الإستلقاء لمدة 30 دقيقة بعد تناول الدواء.

لا يجوز المضغ أو المص! لا يجوز إبقاء الدواء في الفم أكثر
من الوقت المطلوب بلعنه. عدم الالتزام بتعليمات تناول الدواء
من الممكن أن يزيد من خطر إصابة المريء.
يجب إستعمال هذا الدواء في الأوقات المحددة بحسب تعليمات
الطبيب المعالج.

إذا تناولت بالخطأً مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأً
من الدواء، يجب شرب كأس مليء بالحليب، والتوجه فوراً إلى
غرفة الطوارئ في المستشفى، وإحضار عليه الدواء معلقاً.

إذا نسيت تناول الدواء في اليوم المحدد الذي تم اختياره،
والوقت المتبقى حتى موعد تناول العلاج الشهري القائم أكثر
من 7 أيام - فيجب تناول قرص في صباح اليوم التالي.





كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
ريبيون 150 معباً داخل لويحات (بليستر) والتي يتم إدخالها
 في علبة كرتون.
 يوجد في كل علبة 1, 2, 5, 4, 7, 10 أو 15 قرصاً.
 من الجائز ألا تنسق كافة أحجام العلبة.
 أقراص **ريبيون 150** هي مطلية، بيهضوية الشكل، محدبة من
 كلا الجانبين، بلون أصفر فاتح.
إسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض.، بارك الصناعة
 "مافو كرمل".
إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يونيفارم م.ض.، ص.ب.
 6116401، تل أبيب، 16545
 تم إعدادها في أيار 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
 رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
 147 68 33575 01

- كسر غير نمطي في عظام الفخذ - الأعراض التي قد تظهر في هذه الحالة هي: ظهور ألم أو ألم غير نمطي في منطقة الحوض، منفرج الرجلين أو الفخذ.

أعراض جانبية إضافية:

- ظهور في أوقات متقاربة جداً:
 - ألم، يشمل ألم في الظهر والمقابل.
 - الآلام في منطقة البطن.
 - حرقان.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاين من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التباين عن أعراض جانبية
 بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط [\[تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي\]](http://tiny.cc/meyarw) الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتباين عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>
 بالإضافة إلى ذلك، بالإمكان تبلغ شركة "يونيفارم م.ض.".

- #### (5) كيفية تخزين الدواء؟
- تجنب التسوس! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسببي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
 - لا يجوز إستعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
 - يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية وفي مكان جاف ومحمي من الضوء.

6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:
Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, Crospovidone, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, Opadry white Y-1-7000, Opadry yellow OY-6478.
- يحتوي كل قرص من **ريبيون 150** على 77.14 ملغم لكتوز.

إذا نسيت تناول القرص في اليوم المحدد والوقت المتبقى حتى موعد تناول العلاج الشهري القادم أقل من 7 أيام - فلا يجوز تناول المقدار الدوائي هنا بل يجب الإنتظار وتناول القرص في اليوم الذي حدده من بداية كموعد العلاج الشهري القادم.

يجب المواطبة على العلاج حسب توصية الطبيب.
 لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالة الصحية.

إذا توقفت عن تناول الدواء، فقد يتسبب ذلك بتفاقم مرضك.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناولين فيها دواء. ضعي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشيري الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال **ريبيون 150** قد يتسبب بأعراض جانبية لدى بعض المستعملين. لا تنهشني من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعايني أي منها.

أعراض جانبية خطيرة:

- يجب التوقف عن إستعمال المستحضر والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تقاسين من إحدى هذه الأعراض:
 • مشاكل في المريء - هذه المشاكل من الممكن أن تشمل تهيج، إلتهاب أو قرحة (أحياناً قد ينفرج) في المريء. لأجل تجنب هذه الأعراض أنظر إلى الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء".
 • ألم في الصدر، ظهور أو تفاقم حرقان قائم، صعوبة أو ألم عند البلع.
 • رد فعل تحسسي للمستحضر. الأعراض من الممكن أن تشمل: شرى (رد فعل تحسسي في الجلد)، إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو الحجرة.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تقاسين من إحدى هذه الأعراض:

- نقص كالسيوم الدم (نسب منخفضة للكالسيوم في الدم)
 - **ريبيون 150** قد يتسبب بنقص في نسب الكالسيوم في الدم. إن كانت لديك نسب منخفضة للكالسيوم في الدم من قبل، فقد يتسبب في تفاقم الوضع. في مثل هذه الحالة يجب موازنة نسب الكالسيوم في الدم قبل بدء العلاج.
 الأعراض التي قد تظهر في هذه الحالة هي:
 - تشنجات، إختلالات أو تقلصات عضلية.
 - تنميل في أصابع اليدين، الرجلين أو حول منطقة الفم.
 - ظهور مشاكل في عظام الفك (osteonecrosis).
 - آلام في العظام، المقابض أو في العضلات.