

## ماء أكسجيني 3% فلوريس محلول

التركيبة:

ماء أكسجيني 3% w/w (Hydrogen Peroxide 3% w/w)

الماء غير العالمة وسببيات الحساسية في الدواء - انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى تنهيًّا قبل استعمال الدواء، تحذيري هذه النشرة على معلومات

�性صة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استعمال الدواء وفق التلبيبات الواردة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟" في

هذه النشرة. استشير الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك من اجعنة

الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

### 1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟ الدواء مخصوص للتطهير.

الفصيلة العلاجية: مستحضرات تطهيرية (مطهرة).  
2. قبل استعمال الدواء:  
لا يجوز تناول الدواء.

- إذا وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة الماء الأكسجيني، أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").
- على جلد معavic وفي العينين.
- في حفنة شريرة.
- لتطهير الأدوات الجراحية.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:  
هذا الدواء قد يبيض الأفتشة.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت موخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وأصناف غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملاً، أو قد تكونين حاملاً، أو مرضعة، فجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال.  
لا يجوز استعمال محلول الماء الأكسجيني خلال فترة الحمل أو خلال فترة الإرضاع إلا إذا أمر الطبيب بذلك.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكدة.

يمكن تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية التناول:

لا يجوز بلع الدواء مخصوص لاستعمال الخارجي فقط.

### كيفية الاستعمال:

يجب مسح المنطقة المخصصة للتقطير بقطعة من القطن المغمر بالمادة.  
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد بلع الدواء خطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى عرق الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عينة الدواء.  
لا يجوز تناول الأدوية في الغمرة! راجع المتصفح وتذكر من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواع.  
ضع النشرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.  
إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال ماء أكسجيني 3% فلوريس إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتفاقم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعلمي من أي واحد منها.

#### أعراض جانبية محتملة:

تكون حروق متفرقة للتقطير على الجلد وعلى الأنسجة الرخوة والتي تتحول إلى مناطق بيضاء من التسخين الميت. الألام المرافق لهذا الشيء سيزول بعد ما يقارب ساعتين.  
إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فلديك استشارة الطبيب.

#### التنبيه عن الأعراض الجانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليل عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)، والذي يوجه إلى الاستمرة المتصلة التبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الخروج إلى الرابط:  
<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امْنِ التسخيم: هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد، وأو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك سترعى التسمم. لا تسبب التقطير بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) المدون على العبوة، يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين:

يجب التخزين في مكان بارد، في درجة حرارة دون 25°C.  
بعد الفتح لأول مرة، يمكن استعمال الدواء حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Purified Water, Dibasic Sodium Phosphate, Phosphoric Acid

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

الدواء عبارة عن محلول صاف وعديم اللون في قنطر بلاستيكية بنية/بيضاء.

أحجام العبوة المصادق عليها: 50 مل، 100 مل، 1000 مل (1 لتر).

قد لا تنسق جميع أحجام العبوة.