



دليل للمتعالج

معلومات سلامة هامة

يوفر هذا الدليل معلومات حول:

- ما هو إنجايماو (سوتيمليماب)
- خطر الإصابة بحالات عدوى خطيرة وحالات عدوى المُكّورات السحائية
- توصيات للقاحات
- أعراض حالات العدوى التي يجب أن تكون على دراية بها أثناء العلاج بـ إنجايماو (سوتيمليماب)

ما تحتاج لمعرفته حول إنجايماو (سوتيميليماب)

ما هو CAD¹؟

CAD هو اضطراب نادر في الدم ترتبط فيه بعض الأجسام المضادة للجهاز المناعي (الدفاع) بخلايا الدم الحمراء. هذا يسبب انحلال خلايا الدم الحمراء (hemolysis).



ما هو إنجايماو (سوتيميليماب)^{2,1}؟

إنجايماو (سوتيميليماب) هو دواء بموجب وصفة طبية يستعمل لعلاج انحلال خلايا الدم الحمراء (hemolysis) لدى المتعالجين البالغين الذين يعانون من مرض الراسنة البردية (CAD). فهو يقلل من فقر الدم والتعب.



خطر الإصابة بالعدوى عند العلاج بـ إنجايماو (سوتيميليماب)^{2,1}:

يساعد إنجايماو (سوتيميليماب) على منع تدمير خلايا الدم الحمراء عن طريق استهداف جزء من جهازك المناعي يسمى المسار التكميلي (جزء من نظام الدفاع المناعي). يساعد هذا المسار عادة في التخلص من حالات العدوى من جسمك. لذلك، تعد حالات العدوى الخطيرة (الالتهاب الرئوي، الإنفلونزا) وحالات عدوى المكورات السحائية من بين المخاطر المرتبطة بالعلاج بـ إنجايماو (سوتيميليماب).



تلقي اللقاح^{2,1}

قبل تلقي العلاج بـ إنجايماو (سوتيميليماب)، سيتحدث طبيبك معك عن أهمية اللقاحات.

- تحقق مع طبيبك من أن تم تطعيمك بشكل صحيح وفقاً لأحدث التوصيات في إسرائيل وأنك أيضاً تلقيت لقاحات ضد المكورات السحائية والمكورات الرئوية
- إذا لم يتم تطعيمك في الماضي، فمن المستحسن أن يتم تطعيمك ضد المكورات السحائية والمكورات الرئوية قبل أسبوعين على الأقل من تلقي الجرعة الأولى من إنجايماو (سوتيميليماب)

ما تحتاج لمعرفته حول إنجاييمو (سوتيميليماب)



تلقي اللقاح^{2,1}

- حتى لو كنت قد تلقيت اللقاح في الماضي، يجب أن تتلقى جرعتين معززتين من اللقاحات. سينصحك طبيبك إذا كنت بحاجة إلى لقاحات إضافية ضد المكورات السحاچية والمكورات الرئوية
- إذا قرر طبيبك أن هناك حاجة إلى علاج عاجل بـ إنجاييمو (سوتيميليماب)، فيجب عليك تلقي لقاحاً في أقرب وقت ممكن بعد تلقي العلاج
- يمكن أن يساعد تلقي اللقاح ضد بعض أنواع العدوی البكتيرية في تقليل الخطر لديك للإصابة بها، ولكن قد لا تمنعها



أعراض وعلامات حالات العدوی التي يجب أن تكون على دراية بها^{2,1}

يجب إبلاغ طبيبك إذا كان لديك أي عدوی كانت، بما في ذلك العدوی المستمرة مثل HIV، التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C. أثناء العلاج بـ إنجاييمو (سوتيميليماب)، أخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كنت تشک في أنك قد تكون مصاباً بعدوی أو أنك تطور أي من الأعراض التالية التي قد تكون أعراض عدوی:

- حمى مع أو بدون طفح جلدي
- حالات قشعريرة
- أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا
- سعال/صعوبة في التنفس
- صداع مصحوب بالغثيان، حالات تقيؤ، تبیس الرقبة، تصلب الظهر
- ارتباك
- حساسية العین للضوء
- ألم عند التبول أو التبول بتواتر أعلى



معلومات إضافية

لمعلومات إضافية بخصوص إنجايماو (سوتيميليماب)، يرجى الاتصال بسانوفي عبر الهاتف: 09-8633081

مراجع

- النشرة للطبيب إنجايماو (سوتيميليماب)
- النشرة للمستهلك إنجايماو (سوتيميليماب)

MAT-IL-2400495

تم تحديث صيغة هذا الدليل ومحتواه والمصادقة عليه من قبل وزارة الصحة بتاريخ 19/06/2024.

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة من خلال الرابط التالي: <https://sideeffects.health.gov.il>
يمكن أيضاً تبليغ سانوفي مباشرة على رقم 09-8633081

sanofi