

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

سبيرونولاكتون 25 ملغ

أقرص

التركيبية:

يحتوي كل قرص على:

سبيرونولاكتون 25 ملغ

Spironolactone 25 mg

سبيرونولاكتون 100 ملغ

أقرص

التركيبية:

يحتوي كل قرص على:

سبيرونولاكتون 100 ملغ

Spironolactone 100 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة انظر البند 6 - "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
لقد وُصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تعطه للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبيّة مشابهة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

- لعلاج قصور القلب
 - لعلاج تشمّع الكبد المصحوب بالوذمة والاستسقاء البطني
 - الفصيلة العلاجية:
 - ينتمي سبيرونولاكتون إلى فصيلة الأدوية المسماة مدرّات البول المستيقية للبوّاسيوم.
- #### 2. قبل استعمال الدواء
- لا يجوز استعمال الدواء إذا:
- كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأيّ من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 - "معلومات إضافية").
 - كنت تعاني من احتباس البول.
 - كنت تعاني من مرض خطير في الكليتين.
 - كنت تعاني من مرض أدنوس (مرض يميّز بالشعور بالإرهاق، انخفاض الوزن وضغط الدم المنخفض).
 - كنت تعاني من فرط بوتاسيوم الدم (فرط البوتاسيوم في الدم).
 - كنت مرضعاً.
 - كنت تستعمل مدرّات البول المستيقية للبوّاسيوم أو إضافات البوتاسيوم.
 - كنت تستعمل دواءً يحتوي على المادة الفعالة إيبيليرنون (الذي يُعطى لعلاج قصور القلب).
 - لا يجوز استعمال الدواء لدى الأولاد الذين يعانون من مرض كلوي متوسّط إلى خطير.

تحذيرات خاصة تتعلّق باستعمال الدواء

قبل العلاج بسبيرونولاكتون 100 ملغ، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من مرض في الكلى، خاصةً الأولاد الذين يعانون من فرط ضغط الدم، أو من مرض في الكبد. سيراقبك الطبيب بشكل روتيني، خاصةً إذا كنت مسناً.
- كنت تعاني من صعوبة في التبول.
- كنت تعاني من مرض قد يسبّب الاضطرابات في توازن الكهارل في الدم، مثل البوتاسيوم أو الصوديوم.
- كنت تعاني من قصور قلبي خطير.
- كنت حاملاً.

إذا نشأ لديك انخفاض في الوظيفة الكلوية أو فشل كلوي، فمن المحتمل أنك تعاني من ارتفاع خطير في مستويات البوتاسيوم في الدم. قد يؤثر هذا الوضع على وظيفة القلب بل قد يكون فتاكاً في حالات متطرّفة.

قد يؤدي الاستعمال الممنهج لسبيرونولاكتون 100 ملغ مع أدوية معينة، مع إضافات البوتاسيوم أو مع الغذاء الغنيّ بالبوتاسيوم إلى فرط بوتاسيوم الدم الخطير (ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم). قد تشمل أعراض فرط بوتاسيوم الدم الخطير على تقلّصات في العضلات، نظم قلبي غير منتظم، إسهال، غثيان، دوام أو صداع.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. قد يرغب الطبيب بمعالجة جرعة سبيرونولاكتون 100 ملغ، خاصةً إذا كنت تستعمل:

- ديجوكسين أو كارينيوكسولون
 - أدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع بما في ذلك المستحضرات من فصيلة مثبّطات الإنزيم المحلّل للأجوبيوتيسين (مثبّطات ACE)
 - أدوية من نوع مدرّات البول
 - مستحضرات مضادّة للالتهاب لاسيترويدية (NSAIDs) (مثل الأسبيرين، إندوميثاسين، حمض الميفينايميك أو إيبوبروفين)
 - إضافات البوتاسيوم
 - هيبارين أو الهيبارين ذا الوزن الجزيئي المنخفض (أدوية مضادّة لتخثر الدم)
 - أنتيبيرين
 - أدوية قد تسبّب فرط بوتاسيوم الدم (مستويات مرتفعة للبوتاسيوم في الدم)
 - تريموثيريم وتريموثيريم-سولفاميثوكسازول
- يقلّل سبيرونولاكتون من ردّ فعلك على نورأدرينالين. إذا كنت على وشك الخضوع لعملية جراحية ومن المرتقب أن تتلقّى خلالها أدوية للتخدير، فأخبر الطبيب بأنك تستعمل سبيرونولاكتون 100 ملغ.

أخبر الطبيب إذا كنت تتلقى العلاج بأبيراتيون لعلاج سرطان البروستاتا.

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء مع الطعام.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تطين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين لإحداث حمل، فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

تتوفر معلومات محدودة حول استعمال سبيرونولاكتون 100 ملغ لدى النساء الحوامل. سيسف الطبيب سبيرونولاكتون 100 ملغ فقط إذا كانت الفائدة تطغى على الخطورة.

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت مرضعاً.

استشرى الطبيب بالنسبة لاستعمال الدواء. سيسمحك الطبيب بالتفكير في طريقة بديلة لإطعام طفلك الرضيع خلال فترة استعمال هذا الدواء.

السيارة واستعمال الماكينات

عليك توخي الحذر عند سيطرة السيارة أو تشغيل الماكينات الخطرة. استعمال هذا الدواء قد يسبّب النعاس والدوار ممّا قد يؤثّر على قدرتك على سيطرة السيارة أو تشغيل الماكينات الخطرة.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دوماً وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

يجب تناول الدواء مرّة واحدة في اليوم مع الطعام.

يمكن شطر القرص في خطّ الشطر.

لا تتوفر معلومات بخصوص الهرس أو المضغ.

المستون

قد يصف لك الطبيب جرعة دوائية منخفضة ويرفع الجرعة الدوائية تدريجياً بحسب الحاجة، من أجل الحصول على التأثير المرغوب به من الدواء.

الأولاد والمرهقون

يتمّ حساب الجرعات الدوائية للأولاد بحسب وزنهم. سيقيم الطبيب المعالج بحسب الجرعة الدوائية التي يجب إعطاؤها للولد.

يجب أن يخضع علاج الأولاد لمراقبة اختصاصي في علاج الأولاد.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها!

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء. قد تشمل أعراض الجرعة المفرطة على الشعور بالدوار، الغثاس، القيء، الدوار، الشعور بالتجفاف وقد تشعر بأنك مرتبك. قد تعاني من غثيان أو تقيؤات، إسهال وطفح جلدي يظهر كمناطق مسطحة حمراء مع تنوات حمراء صغيرة متداخلة.

تغيّرات في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم قد تسبب شعوراً بالضعف، بالخو أو انعدام الإحساس في الجذ وأو تقلّصات في العضلات، لكنّ هذه الأعراض ليست شائعة عند استعمال جرعة مفرطة.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، فيجب تناول جرعة حل تذكرك، إلا إذا كان موعد تناول الجرعة القادمة قريباً، ولكن لا يجوز بتاتاً تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة منسية!

إذا توقفت عن استعمال الدواء

من المهم المواظبة على استعمال سبيرونولاكتون 100 ملغ إلى أن يقول لك الطبيب أن تتوقف عن ذلك، حتى لو بدأت تشعر بتحسن. إذا توقفت عن استعمال الدواء أبكر من اللازم، فقد يتفاقم وضعك.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرّة تتناول فيها دواءً. ضع النظرات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال سبيرونولاكتون 100 ملغ إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلقّ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوجّه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أحد الأعراض الجانبية التالية بعد تناول الدواء. مع أنّ هذه الأعراض نادرة، فقد تكون العلامات خطيرة:

- حكة وظهور حويصلات على الجلد حول الشفتين وفي باقي أنحاء الجسم، طفح جلدي أحمر أو بنفسجي أخذ في الانتشار، وتكوّن حويصلات (مماثلة لسيفينس-جونسون)
- انفصال الطبقة العلوية من الجلد عن الطبقات السفلية، في جميع أنحاء الجسم (تقشّر الأنسجة المتوتّرة البشرية التسمي، toxic epidermal necrolysis)
- طفح جلدي، حمى وانتفاخ (قد تكون أعراضاً لوضع أكثر خطورة - ردّ الفعل الدوائي المصحوب بكثرة اليوزينيات والأعراض الجهازية - Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)
- لون أصفر في الجلد والعينين (اليرقان)
- قد يحدّل الدواء بوظائف الكبد
- نظم قلبي غير منتظم، قد يكون فتاكاً، شعور بالخو، شلل (عدم القدرة على تشغيل العضلات) أو صعوبات في التنفّس قد تكون أعراضاً لمستويات مرتفعة للبوتاسيوم في الدم. سيجرى الطبيب فحصاً دوريةً للدم من أجل مراقبة مستويات البوتاسيوم والكهارل الأخرى في الدم. قد يوقف الطبيب العلاج.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من شخص 1 من بين 10 أشخاص):

- مستويات مرتفعة للبوتاسيوم في الدم
- أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على شخص 1 كحد أقصى من بين 10 أشخاص):
- ارتباك
- دوام
- تقيؤ أو غثيان
- حكة جلدية
- طفح جلدي
- تقلّصات في العضلات أو في الرجلين
- فشل كلوي أو اضطراب في وظيفة الكلية
- تضخم تسبب الذي لدى الرجال
- ألم في الشينين (لدى الرجال)
- شعور عام بالمرض

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على شخص 1 كحد أقصى من بين 10 شخص):

- تغيّرات في الثدي، مثل كتل في الثدي
- تغيّرات في مستويات الكهارل في الجسم، مثل مستوى مرتفع للكالسيوم في الدم
- وظيفة غير سوية للكبد
- ردّ فعل تحسّسي في الجلد يشمل الحكة والشرى، طفح جلدي متشابك (شرى)
- تغيّرات في الدورة الشهرية لدى النساء
- ألم في الشينين (لدى النساء)

أعراض جانبية مدى شيوها غير معروف (أعراض لا يمكن تحديد مدى شيوها من المعلومات القامّة):

- عدّ منخفض لخلايا الدم البيضاء في الدم
- انخفاض في عدد خلايا الدم التي تحارب التلوثات، خلايا الدم البيضاء، ممّا يزيد من احتمال نشوء التلوثات
- انخفاض في عدد الخلايا التي تساهم في تخثر الدم، ممّا يزيد من احتمال نشوء نزيف دموي أو كدمات
- تغيّرات في الشهوة الجنسية (لدى الرجال والنساء)
- مشاكل في الهضم، انزعاج في البطن
- مشكلة في الجلد تجلّي كحويصلات متنتة بالوسائل (pemphigoid)
- تساقط الشعر
- فرط الشعر

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فليخبر طبيبك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، والذي يوجّه إلى الاستمارة المتّصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمّم! هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين في مكان جاف، في درجة حرارة أقل من 25°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

Calcium sulfate, starch, povidone, felcofix peppermint, magnesium stearate.

تحتوي أقرص سبيرونولاكتون 100 ملغ أيضاً على: Color red FD&C No.3 Lake 15% (E127).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:

سبيرونولاكتون 100 ملغ: قرص مستدير، وردي، مسطح وذو أطراف مائلة، على أحد جانبي القرص يوجد خطّ الشطر وعلى الجانب الآخر مطبوع "TEVA".

القرص برائحة النعناع. يُسوق في عبوة لويحات (شرائط حويصلات) تحتوي على 20 أو 30 قرصاً.

سبيرونولاكتون 100 ملغ: قرص مستدير، أبيض، مسطح وذو أطراف مائلة، على أحد جانبي القرص يوجد خطّ الشطر وعلى الجانب الآخر مطبوع "TEVA".

القرص برائحة النعناع. يُسوق في عبوة لويحات (شرائط حويصلات) تحتوي على 20، 30 أو 100 قرص.

قد لا تُسوّق جميع أحجام العبوات.

اسم المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه:

تبيغ إسرائيل رض، شارع دفور هانيغيه 124، تل أبيب 6944020.

تمّ تحرير النشرة في حزيران/يونيو 2024 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقماً تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

سبيرونولاكتون 100 ملغ: 026.51.21060

سبيرونولاكتون 25 ملغ: 030.32.21061

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المتذكر. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.