

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקשיירים) התשמ"ז- 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אטנט 10 מ"ג טבליות
אטנט 20 מ"ג טבליות
אטנט 30 מ"ג טבליות

הרכב

כל טבלייה של אטנט 10 מ"ג מכילה
2.5 מ"ג מכל אחד מהמרכיבים הבאים:

Dextroamphetamine saccharate	דקסטרו אמפטמין סקרט
Amphetamine aspartate monohydrate	אמפטמין אספרטט מונוהידרט
Dextroamphetamine sulfate	דקסטרו אמפטמין סולפט
Amphetamine sulfate	אמפטמין סולפט

כמות האמפטמין שווה הערך הכלולתי היא 6.3 מ"ג.

כל טבלייה של אטנט 20 מ"ג מכילה
5 מ"ג מכל אחד מהמרכיבים הבאים:

Dextroamphetamine saccharate	דקסטרו אמפטמין סקרט
Amphetamine aspartate monohydrate	אמפטמין אספרטט מונוהידרט
Dextroamphetamine sulfate	דקסטרו אמפטמין סולפט
Amphetamine sulfate	אמפטמין סולפט

כמות האמפטמין שווה הערך הכלולתי היא 12.6 מ"ג.

כל טבלייה של אטנט 30 מ"ג מכילה
7.5 מ"ג מכל אחד מהמרכיבים הבאים:

Dextroamphetamine saccharate	דקסטרו אמפטמין סקרט
Amphetamine aspartate monohydrate	אמפטמין אספרטט מונוהידרט
Dextroamphetamine sulfate	דקסטרו אמפטמין סולפט
Amphetamine sulfate	אמפטמין סולפט

כמות האמפטמין שווה הערך הכלולתי היא 18.8 מ"ג.

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים, ראה בפרק 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 - "מידע נוספים".

קרה בעיון את העalon עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרווחח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם גם אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
התרופה יכולה להיליך על ידי מבוגרים וגם על ידי ילדים ועל כן המידע בעalon זה מיועד גם עבור ילדים הנוטלים תרופה זו.

התרופה מכילה אמפטמינים שיכולים לגרום לתופעות לוואי רציניות כולל:

שימוש לרעה והתמכרות:
לאטנט סיכי גבוה לשימוש לרעה או שימוש לא נכון שעלול להוביל להתמכרות. שימוש לרעה ושימוש לא נכון באטנט, בתרופות אחרות הכוללות אמפטמינים ותרופות המכילות מתילפנידאט עלולים להוביל למינון יתר ולמוות. הסיכון לכך גדול עם מינונים גבוהים יותר של אטנט או כאשר השימוש נעשה בצורה מתן לא מאושרו כדוגמת הסנפה או הזרקה.
על הרופא לבדוק את הסיכון לשימוש לרעה, לשימוש לא נכון או להתמכרות שלך או של ילך לפני התחלת הטיפול באטנט, ולהמשיך ב迈向ק לבארך הטיפול.
אטנט עלול להוביל לתלות פיסית לאחר שימוש ממושך, גם אם ניטל בהתאם להוראות הרופא.
אל תעביר אטנט לאף אדם אחר.
שמור את התרופה במקום בטוח והיפטר מכל שאירית תרופה כנדרש.
ספר לרופא אם אתה או ילך השתמשתם אי פעם או אם הייתם תלויים באלכוהול, תרופות מרשם או סמים.
סיכון לאנשים עם מחלות לב חמורות:
מגוון פתאומי עשוי לאנשים עם מומים בלבד או עם מחלות לב חמורות אחרות.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מכילה תערובת מלחי אמפטמינים שהם חומרים הממריצים את מערכת העצבים המרכזי, ומיעdet לשימוש כدلקמן:

- טיפול בהפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (=הפרעת קשב),
ובאנגלית: Attention Deficit Hyperactivity Disorder = ADHD. התרופה עוזרת להגבר את העירנות ולהויר את סוף האימפולסיביות וההיפראקטיביות במטופלים הסובלים מהפרעת קשב. יש להשתמש בתרופה זו במסגרת תוכנית שיקומית של ה-ADHD הכוללת ייעוץ או טיפולים אחרים.
- טיפול בנרקולפסיה (מחלה המאפיינת בהתקפי שינוי בלתי נשלטים במשך היום).

קבוצה טרפייטית
תערובת מלחי אמפטמינים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- ידועה רגשות לאמפטמינים או לאחד מהמרכיבים האחרים של התרופה, ראה "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בפרק 2, ואת רשימת כל המרכיבים שמכליה התרופה בפרק 6 – "מידע נוסף".
- אתה נוטל תרופה נגד דיכאון מסווג מעכבי מונואמי אוקסידז (MAOIs) כולל האנטיביוטיקה לניזolid (linezolid) או מתילן בלוי (blue methylene) בהזרקה, או אם נטלת תרופה צזו במשך 14 הימים האחרונים.

ازהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה

על הרופא לעורק בדיקה מדוקדקת של תפקודי הלב שלך או של ילך טרם תחילת הטיפול בתרופה.
על הרופא לעורק לך או לילדך בדיקות סדריות של לחץ הדם ודופק הלב בתקופת הטיפול בתרופה.

לפני תחילת הטיפול יש לספר לרופא אם אתה או ילך סובל או אם סבלת בעבר מבעיה רפואית כלשהי או אם קיימת היסטוריה משפחתית, כולל:

- בעיות לב, מחלת לב, מום לב, יתר לחץ דם
- בעיות נפשיות כולל פסיכוזה, מאניה, מחלת דו-קוטבית, דיכאון, עבר משפחתי של התאבדות
- בעיות בכלייה
- עוויתות או תוצאות לא תקין של בדיקת גלי המוח (בדיקה EEG)
- בעיות במחזור הדם באצלבות הידיים והרגליים
- תננות או ציללים חוזרים – טיקים או תסמנות טורט

אינטראקטציות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקחת, או אם לך歛ת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקחת:

- תרופות מקבוצת SSRIs – מעכב ברני של ספיגה מחדש של סרוטוניין

- תרופות מקבוצת SNRIs – מעכט ספיגה מחדש של סרוטונין ווראיפינפרין
- תרופות לטיפול באכבי ראש של מגורנה הנקרואות טריפטנים
- נוגדי ד'יכאון טריציקליים
- ליתיום
- פנטניל
- טרמડול
- טריפטופן
- בוספירון
- סנט ג'ון וורט St. John's Wort
- תרופות נגד ד'יכאון כולן תרופות מקבוצת מעכבי מונואמין אוקסידז (MAOIs), ראה בפרק 2 "אי להשתמש בתרופה אם"
- תרופות לטיפול בגין לחץ דם
- תרופות נגד התקפי עוויתות
- תרופות להקלת הבצטנות או תרופות נגד אלרגיה המכילות מפיגי גודש
- תרופות לטיפול בחומציות יתר של הקיבה

עליך להכיר את התרופות שאתה או ילך נוטלים. יש להזכיר ולשמור רשימת התרופות על מנת להציגה לרוקח או לרופא לפוי הצורך.

הירין

אם את בהירין או שוקלת להיכנס להירין, יש להתייעץ עם הרופא טרם נטילת התרופה. לא ידוע אם אטנטן מזיק לעובר. ידיע את הרופא אם נכנסת להירין בזמן נטילת התרופה.

הנקה

התרופה עוברת לחלב האם. יש להימנע מהנקה בעת השימוש בתרופה.

שימוש בילדים

תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בילדים מתחת לגיל 3 שנים.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן לקחת את התרופה עם או ללא מזון.

מיעד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה, ככלומר נחשבת נטולת נתרן. תרופה זו מכילה סוכרוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סובילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא שלך לפני נטילת התרופה זו. כמות הסוכרוז: אטנטן 10 מ"ג – כ- 98 מ"ג סוכרוז, אטנטן 20 מ"ג – כ-93 מ"ג סוכרוז, אטנטן 30 מ"ג – כ-140 מ"ג סוכרוז. טבליות אטנטן 20 מ"ג ו- 30 מ"ג מכילות FD&C Yellow No. 6 Aluminum Lake, שעלול לגרום לתופעות אלרגיות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנזע המינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

עליך ליטול את התרופה בבדיקה כפי שנרשמה. הרופא יתאים את המינון המתאים לך או יליך באופן אינדיבידואלי.

רצוי להימנע מלקיים התרופה מאוחר בערב בגלל שעלול להיגרם קושי להירדם.

ניתן לחזות את הטבליות בקן הח齊יה, לנטילת חצימנה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

בדיקות ומתק

- מיד פעם הרופא ישකול להפסיק את הטיפול על מנת לבצע הערכה של הפרעת הקשב.
 - על הרופא לשකול בדיקות סדריות של דם, לב ולחץ הדם בתקופת הטיפול בתרופה.
 - באשר לילדים יש למדוד את המשקל והגובה.
- הרופא ישקול הפסקת הטיפול אם התוצאות יצביעו על בעיה כלשהי.

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד מין התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדירוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות מקדימה עם הרופא או ברוקח.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינו נדרש להם. אם יש לך שאלות נוספות הקשורות בשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באנטן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן.

ראה "תופעות לוואי רציניות כולל: **שימוש לרעה והתמכרות**" בתחילת זה.

בעיות בלב

עליה בחוץ הדם ובקצב לב.

עליך לפנות לרופא או לבית חולים מיד אם אתה או ילך חש בתופעות המשקפות בעיות בלב תוך כדי השימוש בתרופה כגון כאבים בחזה, קוצר נשימה, או עילפון.

בעיות פסיכיאטריות

- התפתחות הפרעות התנהגות או הפרעות חשיבה או החמרה של תופעות אלו.
 - התפתחות או החמרה במחלת דו-קוטבית קיימת.
 - הופעת תופעות פסיכוטיות חדשות (כגון שמייעת קולות, הziות או אמונה בדברים שלא קיימים) או תופעות חדשות של מאניה.
- יש לפנות לרופא מיד אם אתה או ילך חש החמרה או תופעות חדשות תוך כדי שימוש בתרופה, במיוחד שמייעת קולות, הziות, אמונה בדברים לא אמיתיים או תסמים חדשים של מאניה.
- האטה בגדייה (גובה ומשקל) בקרב ילדים.

• עוינות

- בעיות בזרימת הדם באצבעות הידיים והרגליים (תחלואה של כלי דם היקפיים, כולל סינדרום ריננו) הסימנים יכולים להתבטא בתחושת נימול, קור או כאב באצבעות, או בשינוי צבע של האצבעות מצביע חיוור, לכחול, ולאדים.
- יש לדוח לרופא מיד אם מתפתחות תופעות אלו או אם מתפתחים סימנים של פצעים לא צפויים, המופיעים באצבעות הידיים או הרגליים בזמן נטילת התרופה.
- **תסמנות סרטוניין** - תסמנות שעולה לסיכון חיים, אשר יכולה להתרחש כאשר תרופות כגון אנטן נלקחות עם תרופות מסוימות אחרות. יש להפסיק ליטול את התרופה ולפנות לרופא מיד אם מתפתחים סימנים או תופעות של תסמנות סרטוניין:
 - סערת רגשות, הziות, תרדמת
 - בלבול
 - דופק מהיר

- סחרחות
- הסמקה
- שינויים בלחץ הדם
- הצעה או חום
- עזיותות
- איבוד קואורדינציה
- בחילה, הקאות, שלשול
- נקשות או מתח שרירים
- טמפרטורת גוף גבוהה (היפרתרמייה)

• החמרה בטיקים או טיקים חדשים או החמרה בתסמנות טורט – יש לידע את הרופא המטפל

תופעות הלואין השכיחות ביותר

- כאב בטן
- ירידת בתאיון
- עצבנות

תופעות לוואי נוספת

תופעות לבביות: דפיקות לב, קרדיוומיופתיה (מחלה של שריר הלב).

מערכת עצבים מרכזיים: תופעות פסיקוטיות, גירוי יתר, חוסר מנוחה, עצבנות, אופוריה, הפרעות תנעה, דיספוריה (מצב רוח של חוסר שביעות רצון), דיכאון, רעד, תוקפנות, טיקים, כעס, דברת (logorrhea), פגיעה עצמית בעור (dermatilomania).

ענינים: ראייה מטושטשת, התרכבות אשישן.

מערכת עיכול: יושב בפה, טעם לא נעים, שלשול, עצירות, איסכמיה (פגעה באספקת הדם) של המעי, אנורקסיה ואיבוד משקל.

תגובהות אלרגיות: פריחה אלרגית, רגישות יתר כולל אנגיואדמה ואנפילקטיים, פריחות רציניות בעור כולל סינדרום סטיבנס ג'ונסון וטוקסיק אפידרמל נקרוליזיס (نمך רעלבי בעור).

מערכת אנדוקרינית: שינויםobilization, אין אונות, זקפה תכופה או ממושכת.

עור: נשירת שיער.

שריר-שלד: תמס שריר (רבdomialysis).

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין חמירה, או כאשר אתה סובל מהתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקיים לדוח על תופעת לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה ?

מנع הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp / date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C ולהגן מפני.

ניתן להשתמש בתרופה עד 90 ימים מהפתיחה הראשונה של הבקבוק, ולא יותר מהתאריך התפוגה.

אין להשליך תרופות לביבות או לאשפפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוספַּף עַל המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

Compressible sugar (sucrose and maltodextrin), microcrystalline cellulose, corn starch, saccharin sodium, magnesium stearate and colloidal silicon dioxide.

טבליות 10 מ"ג מכילות גם
טבליות 20 מ"ג ו-30 מ"ג מכילות גם
FD&C Yellow No. 6 Aluminium Lake (sunset yellow FCF)

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץזה

אטנט 10 מ"ג:

טבליה אובלית בצבע כחול, עם הטבעה של "ב" מעל "972" בין 2 קויים אופקיים לצד אחד. לצד השני הטבעה של "0" ו- "1" משני צידי קו חציה [0 | 1] בין שני קויים אופקיים.

אטנט 20 מ"ג:

טבליה אובלית בצבע אפרסק, עם הטבעה של "ב" מעל "973" בין 2 קויים אופקיים לצד אחד. לצד השני הטבעה של "0" ו- "2" משני צידי קו חציה [0 | 2] בין שני קויים אופקיים.

אטנט 30 מ"ג:

טבליה אובלית בצבע אפרסק, עם הטבעה של "ב" מעל "974" בין 2 קויים אופקיים לצד אחד. לצד השני הטבעה של "0" ו- "3" משני צידי קו חציה [0 | 3] בין שני קויים אופקיים.

תוכן הארץזה:

כל בקבוק פלסטיק מכיל 30 טבליות ווסף לחות.
אין לבולו את סופח הלחות ויש להשאירו בבקבוק עד תום השימוש.

שם הייצור ובעל הרישום וכתובתו

טבע ישראלי בע"מ
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

עלון זה נערך באוגוסט 2024

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

10 מ"ג 154-13-34222

20 מ"ג 154-14-34224

30 מ"ג 154-15-34225