

**עלון לצרכן לפי תקנות הרווחחים (תקשיירים) התשמ"ז – 1986**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**דולוקס טبع 60 מ"ג**  
כמוסות עמידות בחומציות הקיבנה  
חוּמָר פְּעִילָה:  
כל כמוסה מכילה: דולוקסיטין (כהידרוクロיד) 60 מ"ג  
Duloxetine (as hydrochloride) 60 mg

**דולוקס טבע 30 מ"ג**  
כמוסות עמידות בחומציות הקיבנה  
חולוקס טבע 30 מ"ג  
כל כמוסה מכילה: דולוקסיטין (כהידרוクロיד) 30 מ"ג  
Duloxetine (as hydrochloride) 30 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר ראה פרק 2 "מיעד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 - "מיעד נוסף".  
קרא בעין את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

תרופות נוגדות דיכאון (Anti-Depressants), מעלות את הסיכון להתנחות ולמחשבות אובדן בילדים, במתבגרים ובמבוגרים צעירים.

עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילאים וקרובייהם, לעקוב אחר שינויים בתנהגותיהם כגון: החמרה הדיכואנית, מחשבות אובדן, תוקפנות וכדומה. במידה וחילם שינויים כגון אלה, יש לפנות מיד לרופא.

## 1. למה מיועדת התרופה?

דולוקס טבע משמשת לטיפול במובגרים הסובלים מ:

- מופעים של דיכאון מאגוריס
- כאב נוירופטי הקשור לנוירופתיה סוכרתית היוקרית
- הפרעת חרדה כללית (generalized anxiety disorder, GAD)
- פיבромיאליgia
- כאב שריר-שלד כרוני כאשר לא ניתן לתת טיפול אחר או טיפול קודם נכשל. התוויה זו מבוססת על מחקרים בחולים עם כאב כרוני של הגב התחתון (CLBP) וכאב כרוני כתוצאה מאוטוארטרייטיס.

קבוצה תרפואיית: דולוקס טבע שייכת למשפחת תרופות-HTNRI וגורמת לעלייה של רמות הסרotonin והנוורדרנליין.

## 2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מיעד נוסף").
- הינך סובל ממחלה כבד.
- הינך סובל ממחלה כליות קשה.
- הינך נוטל או נטלת-ב-14 הימים האחרונות תרופה אחרת שידועה כמעכבתmonoamine oxidase (MAOI-Oxidase Inhibitor), כולל מתילן בלוי תור ורידי ואנטיביוטיקה לינזolid; אין להתחילה טיפול בתרופות מסווג מעכבי monoamine oxidase אם לא עברו לפחות 5 ימים מאזן הפסקת הטיפול בדולוקס טבע; ראה "תגובה בין תרופות".
- הינך נוטל תיורידازין.

## اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

### לפני הטיפול בדולוקס טבע ספר לרופא אם הינך:

- סובל ממחלה כליות • סובל או סבלת בעבר מפרוכוסים (התקפים) • סובל או סבלת בעבר מהפרעה דו-קוטבית (מאניה-דרסיה) או מאניה • סובל מבעיות בעיניים, כגון סוגים מסוימים של גלאוקומה (לחץ瞳圧 עליי מוגבר) • סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכלב • סובל או סבלת בעבר מבעיות דימום • סובל מרמות נתן נמוכות או שאטה בסיכון לירידה ברמות הנתן (למשל אם אתה נוטל תרופות משתנות, במיוחד אם אתה קשיש) • סובל בעיות לב או לחץ דם גבוה ואם הינך נוטל תרופות להורדת לחץ דם • סובל מסוכרת (הטיפול בדולוקס טבע עלול

לפוגע באיזון רמות הסוכר אצל חלק מהחולים) • סובל מ对照检查 התורוקנות איטי של הקיבה • בעל היסטוריה של שימוש לרעה בתרופות

**מחשבות על התאבדות והחמרת הדיכאון או הפרעת החדרה שלך**  
דיכאון והפרעות פסיכיאטריות חמורות נוספות יוצרים הסיכון הגבוה ביותר לאובדן. למורת זאת, בחלק מהילדים, המתבגרים והבוגרים הצערניים אשר לихו תרופות נגד דיכאון, נצפתה עליה במחשבות ובמעשים אובדנים, בעיקר בתחום המטיפול, או כשהמיןון שונה. אם אתה מודכו ו/או סובל מהפרעת חרדה, יכולות לעלות בדעתך לעיתים לפעמים מחשבות על גירמת נזק לעצמך או על התאבדות. מחשבות אלה עלולות להופיע בשיכחות גבוהה יותר כאשר מתחילה ליטול תרופות נגדות דיכאון. בדרך כלל בחודשים הראשונים של הטיפול, או כשהמיןון משתנה.

יתכן שתהיה לך נטייה רבה יותר לחוש מחשבות אלה אם:

- הייך בעבר מחשבות על התאבדות או על גירמת נזק לעצמך.
  - אתה מבוגר צער. מידע שנאסף בנסיבות פסיכיאטריים ואשר טופל בתרופות נגדות דיכאון.
  - אתה סובל (או יש לך היסטוריה משפחתית) מהפרעה דו-קוטבית (מאניה-דרסיה).
- שים לב לכל שינוי במצב הרוח, בהתנהגות, במערכות, במערכות, במחשבות או ברגשות, התקשר לרופא שלך או גש מיד לבית-חולם. שם לב במיוחד לשינויים אלו בתחום טיפול ולאחר שינוי במינון. התסמינים הבאים דואווים במוגדים, ילדים ומתבגרים שטופלו בתרופות נגד דיכאון: חרדה, חוסר שקט, התකפי פאניקה, חוסר שינה, עצבנות, עינות, אגרסיביות, אימפלסיביות, אקטואיזיה (חווסף מנוחה פיסקו-מוטורי), היפומניה, מאניה. הקשר בין הופעת תסמינים אלה להחמרת הדיכאון ו/או הופעת דחפים אובדנים לא הוכח, אולם נראה כי הם מהווים סימנים ראשוניים להתנהגות אובדנית.

יתכן שייעיל שתידע קרוב משפחה או חבר קרוב שאתה סובל מדיכאון או שיש לך הפרעת חרדה, ותבקש מהם לקרוא עליך. אתה יכול לבקש מהם לומר לך אם לדעתם הדיכאון או החדרה שלך מחמורים או אם הם מודאגים ממשניים בהתנהגות שלך. כמו כן, הקפיד להגיע לכל הפגישות עם הרופא המטפל.

וממלץ כי המטופלים ובני משפחותיהם יעקבו אחר שינויים במצב הרוח והתנהגות כגון: הגברת החדרה, התתקפי פאניקה, חוסר מנוחה ואי-שקט, מאניה או היפומניה, תקופנות או הפרעות בשינה, במיוחד בתחום הטיפול או כאשר המיןון משתנה. במקרה של שינויים כגן דולוקס טבעי, יש לפנות מידית לרופא. יש להזכיר הקפדה יתרה על המלצה זאת במטופלים צעירים בגילאי 18-24 שנים.

**גלאוקומה צורת זווית (Angle Closure Glaucoma)** - הרחבה אישונים, שנגרמת לעיתים כתוצאה מטיפול בתרופות נגדות דיכאון כגן דולוקס טבעי, יכולה לגרום למוגדים בעלי מhana זווית צר, שלא עברו ניתוח לכריית קשתית, לאירוע של גלאוקומה מסווג זווית צרה.

#### בעיות של תפקוד מיני לך

דבר עם הרופא שלך אם יש לך שינויים בתפקוד המיני או אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לתפקוד המיני במהלך הטיפולadolokos טבעי. יתכן שהרופא יוכל להציג לך פתורנות. למידע נוסף אודות הנוגעות לשימוש בתרופה ראה סעיף 4 'תופעות לוואי'

**שימוש בילדים ובמתבגרים בני פחות מ-18 שנים**  
דולוקס טבעי אינה מיועדת לטיפול בילדים ובמתבגרים בני פחות מ-18 שנים.

#### תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לך חלה לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תכשירים אחרים המכילים דולוקסטין - יש להימנע משימוש בו בזמן עם תרופה זו. בדוק עם הרופא אם אתה נוטל תרופות אחרות שמכילות דולוקסטין
  - מעכביmonoaminooxidaz (MAOIs - Monoamine Oxidase inhibitors) - עליך להימנע מליטולadolokos טבעי עם אנתזוליד (MAOI).
- אתה נוטל, או אם נתלת לאחרונה (ב-14 הימים האחרונים), תרופה מסווג מעכב monoaminooxidaz (MAOI). נתילת מעכב monoaminooxidaz (כגן מתילן בלוי-טור-ורדי או לינזוליד) יחד עם תרופות מרשם רבות, כוללadolokos טבעי, עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות עד כדי סכנת חיים. עליך להמתין 14 ימים לפחות לאחר שהפסקת לטול

- מעקב מונומין אוקסידאץ לפני שתוכל ליטול דולוקס טבע. כמו כן, עליך להמתין 5 ימים לפחות לאחר שאתה מפסיק ליטול דולוקס טבע לפני שתוכל ליטול מעקב מונומין אוקסידאץ
- תרופות שימושיות את רמת הסרוטונין - התרופות הללו מבירות את הסיכון לסינדרום סרוטונין (ראה פרק 4 "תופעות לוואי") • תרופות נגדות דיכאון מקבוצת SSRI ו-SNRI • נגדי דיכאון טריציקליים
  - משכבי כאבים חזקים כגון: טרמಡול, פנטניל, מפירידין, מתאדון או אופיאידים אחרים
  - טריפטאנים (לטיפול במיגרנה)
  - טריפטופאן- חומצה אמינית הקיימת במחזונות, תמיינות עירוי להזנה ותוספי מזון
  - פרע מנוקד (היפריקום - St. John's Wort)
  - בוספירון • אמפטמינים • ליתומים
  - תרופות המשפיעות על קריית הדם והויצרות קרישים כגון:
  - אופרין (קומדיין) - אם אתה נוטל אופרין, יתכן שהרופא יעקב אחר מצבך בתחלתו ובסיומו של הטיפול בדולוקס טבע
  - תרופות נגדות דלקת שאין סטרואידיות (NSAIDs) כגון: איבופרопן, נפרוקסן או אספירין. התרופות הללו עלולות להגביר את הסיכון לדם
  - תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית
  - משתנים
  - תרופות שמורידות את רמת החומציות בקיבת (עלולות לגרום לשחרור מוקדם של דולוקס טבע וכן לפגעה בעילות)
  - תרופות המורידות לחץ דם
  - דולוקס טבע משפיעה על ריכוז תרופות אחרות בدم:
  - תאופילין (טיפול באסתמה)
  - נגדי דיכאון טריציקליים כגון: דסיפראמין, נורטראפטיין, אמייטראפטיין ואימיפראמין
  - פנטיאזידים
  - תרופות לטיפול בהפרעות קצב: פלאקיניד, פרופפנון
  - תירידין, השימוש עלול לגרום לביעות קשות בקצב הלב או מות פתאומי
  - התרופות הבאות משפיעות על הריכוז של דולוקס טבע בدم:
  - קוונינידין לטיפול בהפרעות קצב
  - פלאוקסטין, פלוובוקסמין, פרוקסטין
  - סימטידין
  - תרופות אנטי-יקロוביאליות משפחת הקווינולוניים כגון: ציפורולוקסצין או אנווקסצין

אם אתה חווה תגובה יצאת דוף כלשהי בעת נתילתichert מהתרופות מעלה עם דולוקס טבע, עליך לפנות לרופא.

הרופא שלך צריך לחייב אם אתה יכול ליטול דולוקס טבע יחד עם תרופות אחרות. אל תתחיל ולא תפסיק ליטול אף תרופה, כולל תרופות שננקנו ללא מרשם רפואי או צמחי מרפא, לפני שאתה מתיעץ עם הרופא שלך.

#### **שימוש בתרופה ומזון**

ניתן ליטול דולוקס טבע עם או בלי אוכל.

**שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**  
נתילת דולוקס טבע יחד עם צריכה אלכוהול גבוהה עלולה לגרום לנזק חמור לכבד. המנע מצריכת אלכוהול מרובה בזמן נתילת דולוקס טבע.

- הירין והנקה**  
התיעיע עם הרופא או עם הרוקח לפני שתוכל תרופה כלשהי.
- הודיע מיד לרופא שלך אם הרית או אם את חושבת שאתה בהריון בזמן שתאת נתילת דולוקס טבע. דולוקס טבע עלולה לפגוע בעובר שלך. תוכל להשתמש בדולוקס טבע אך ורק לאחר שדנת עם הרופא בתוצאות האפשריות ובנסיבות שלולים להיגרם לעובר שלך.
  - ודאי שהmäßigת שלך / או הרופא יודעם שאתה מטופלת בדולוקס טבע. כאשר נוטלים תרופות מסווג SSRI ו-SNRI, כולל דולוקס טבע, במהלך סוף השלישי של ההריון, עלול לגגדל הסיכון לסתובכים שידרשו אשפוץ של הילדות לתגובה ממושכת, תמיינה נשימתיות והזנה על ידי צינורית הזנה. הסובכים הנ"ל יכולים להתפתח מיד לאחר הלידה

- יכולם לכלול מצוקה נשימית, כיחלון, הפסיק נשימה, עוויתות, חוסר יציבות של טמפרטורת הגוף, קשיי אכילה, הקאות, היפוגליקמיה, רפין שרים, נקשות שרים, רפלקסים מוגברים, רעד, עצבנות, אי-שקט ובci ללא הפסקה. אם לאחר הלידה מופיע אצל תינוקר תסמיין כלשהו מבן אלה, או אם את מודאגת באשר לבריאות התינוק, התייעץ עם המילדת או עם הרופא שלך.
- ידע את הרופא שלך אם את מניה או מתכונת להנין. דולוקס טبع עוברת לחלב אם ועלולה להזיק לתינוק. שימוש בדולוקס טبع בתקופת ההנקה אינם מומלץ. התייעץ עם הרופא שלך לגבי הדרכו הטובה ביותר ליותר לאכיל את תינוקך בזמן נתילת דולוקס טבע.

**נהיגה ושימוש במכונות**  
השימוש בתורופה זו עלול לגרום לשינויות או להשיע על יכולת החלטות, לחשוב בנסיבות או להגיב בנסיבות, ועל כן חייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוימות ובכל פעילות המכיבת ערנות. אל תנגה ועל תשתמש במכירים או במכונות לפני שאתה יודע כיצד דולוקס טبع משפיעה לך.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התורופה**  
דולוקס טبع מכילה סוכר. אם הרופא שלך אמר לך שיש לך איסביות מסוימים של סוכר, התייעץ עם הרופא לפני שאתה נוטל את התורופה זו.

### 3. כיצד תשתמש בתורופה?

- יש לשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בעו למינון ואופן הטיפול בתכשיר. יתכן שהרופא יctrיך לשנות את המינון עד אשר ימצא את המינון המתאים המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל הוא:
  - **לכאב נירופטי הנובע מסוכרת:** המינון הרגלי של דולוקס טبع הוא 60 מ"ג פעמיום. הרופא יקבע את המינון המתאים לך.
  - **לכאב שרירי-שלדי כרוני ולהפרעת חרדה כללית:** רוב המטופלים יקבלו 60 מ"ג פעמיום, הרופא יקבע את המינון המתאים לך. אצל חלק מהמטופלים יש צורך במינון התחלתי של דולוקס טبع 30 מ"ג פעמיום למשך שבוע ולאחר מכן נתילת המינון הרגלי של 60 מ"ג פעמיום.
  - **לדיכאון:** רוב המטופלים יקבלו 60 מ"ג פעמיום. אצל חלק מהמטופלים יש צורך במינון התחלתי של דולוקס טبع 30 מ"ג פעמיום למשך שבוע ולאחר מכן נתילת המינון הרגלי של 60 מ"ג פעמיום.
  - **קשיישים - יש להתחילה את הטיפול מininון התחלתי של 30 מ"ג פעמיום למשך שבועיים ורך לאחר מכן לשקלול להעלות את המינון ל-60 מ"ג פעמיום.**
  - **פיבромיאלגיה:** המינון התחלתי של דולוקס טبع הינו 30 מ"ג פעמיום למשך שבוע ולאחר מכן נתילת המינון הרגלי של 60 מ"ג פעמיום.

לרוב, השפעת הטיפול התורופטי בדולוקס טبع ניכרת לאחר 4-2 שבועות של טיפול.

אין לעבור על המנה המומלצת.

### אופן השימוש

דולוקס טبع נועדה לניטילה דרך הפה. עליך לבולע את הרכמה בשלהמתה עם מים. דולוקס טبع מכילה כדורים מצופים בציפוי שמונע את פירוקן בקייבת. אי לך, אין ללווע או לכתוש את תוכלות הרכמה ואין לפתח את הרכמה ולפזר את תוכנה באוכל או שתיה. זאת על מנת למנוע השפעה של האוכל או השתייה על ציפוי הcadriote. כמו כן, התורופה אינה מיועדת לניטילה דרך זונדה הקיימת ותוכלות הרכמה עלולה להחסם את הצירורית. דבר עם הרופא שלך לגבי משך הזמן שאתה צריך ליטול דולוקס טבע. אל תפסיק ליטול דולוקס טבע מבלי לשוחח תחילת עם הרופא שלך.

אם נתלת בעוטות מינון גבוהה יותר, עליך להתקשר מיד לרופא או לרוקח שלך. התסמינים של מינון יתר יכולים לכלול ישנוויות, תרדמת, תסמוונת סרוטוני (תגובה שעולמה לגורם להזיות, עצבנות, תרדמת, קצב לב מהיר, לחץ דם לא יציב, שחחרות, העזה, הסמקה, חום, רעד, נקשות שרים, כיוך שרים, רפלקסים מוגברים, חוסר קואורדינציה, בחילה, הקאה ושלשול), פרכוסים, התעלפות, לחץ דם נמוך, לחץ דם גבוה, הקאות ודופק לב מהיר. אם נתلت מנת יתר או אם בעוטות בעל יلد מן התורופה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי בבית-חולים, והבא את אריזת התורופה איתך.

**אם שכחת ליטול את התרופה**,anca טול את המנה ששכחת ברגע שאתה נזכר. אם זה מועד הקרוב למועד נתילת המנה הבא, דלג על המנה ששכחת וקח את המנה הבאה בלבד. אל תיטול מנה כפולה של דולוקסطبع. יש להתמיד בטיפול כפוי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חיל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקה.

**אם אתה מפסיק את נתילת התרופה**: אם הרופא חושב שאתה זקוק עוד לדולוקסطبع, הוא יורה לך להקטין את המינון שאתה מטול בהדרגה לפני הפסיקת הטיפול לחולוין. אין להפסיק את הטיפול תרופה זו לצורך פתאומית בלבד להיוועץ ברופא. כאשר אתה מפסיק את נתילת התרופה מהר מדי או עבר מתרופה נגדית דיכאון מהר מדי יתכן שתתחשש בתסמינים החמורים הבאים: סחרחוות, כאב ראש, בחילה, שלשול, תחושת נימול (עקבוצים ודקירות), אי-שקט ועצבנות, הקאות, נזוזי שינה, חרדה, בלבול, תחושת חוסר יציבות ורגשות, תופעה של היפו-מאניה, טנטון (שמיעת צלול באוזן בעת שאין שום צליל חיצוני), עוויתות, הצעת יתר ותשישות.

אין ליטול תרופות בחוושר! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקה.

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש לדולוקסطبع יכול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן.

##### תופעות לוואי חמורות:

###### מחשבות והתקנוגיות אובדיות:

יש לפנות לרופא מייד אם הינך חש באחת מההתופעות הבאות, **במיוחד אם הן חדשות, חמימות או שהן מדאיות יותר**: ניסיונות התאבדות, דחפים מסוכנים, תוקפנות, כאס, אלימות, מחשבות על התאבדות או מוות, הופעת או החמרת דיכאון, הופעת או החמרת חרדה, התקפות פאניקה, תחושה חזקה של חוסר מנוחה, חוסר שקט, הופעת או החמרת עצבנות, בעיות שינה, עליה קיצונית בפעולות או בדיבור (מאניה), שינויים אחרים בהתנהגות או במצב הרוח.

**סימנים לפגיעה בכבד** - גירוד, כאב בחלק העליון ימני של הבطن, שטן כהה, הצבהה של העור או של החלק הלבן בעיניים (צ habitats), כבד מגדל, עליה חרדה באנזימי הכבד. במקורה של סימנים של פגיעה בכבד יש לפנות מייד לרופא.

**שינויים בלחץ הדם ונפילות** – בדוק את לחץ הדם לפני ובמהלך הטיפול. Doloksطبع עלולה להעלות את לחץ הדם או להורד את לחץ הדם כאשר נעמדים ולגרום לשחרחות או להתקלפות בעיקר כאשר נטלים Doloksطبع לראשונה או כאשר מגדים את המינון. Doloksطبع עלולה להגדיל את הסיכון לנפילות, בעיקר בקשישים.

**תסמנת סרטונן - מצב שועל לחיות מסכן חיים**: התסמינים עולמים לכלול: תגובה שיכולה לגרום לתחשוה של שינויים במצב הנפשי (כגון: עצבנות, חיות, תרדמת), חוסר יציבות אוטונומית (דופק מהיר, לחץ דם בלתי יציב, סחרחוות, הצעת יתר, הסמקה, עליה בחום הגוף), בעיות נירומוסקווריות (רעע, נקשות, עוויתות בשירים, רפלקסים מוגברים, חוסר קואורדינציה), עוויתות ו/או תסמנים במערכת העיכול (כגון: בחילה, הקאה, שלשול). פנה מיד לעזרה רפואיים אם אתה חווה תסמנים אלו.

**דימום חריג** - Doloksطبع ותרופות נגדות דיכאון אחרות יכולות להגביר את הסיכוי לדימומים וחוברות בעיקר אם אתה נוטל בנוסף תכשיר דם כגון ואפרפין, תרופות נגדות דלקת שאין סטרואידיות (NSAIDs) או אספירין. יתכן גם דימום לאחר לידה בשיכחות גבואה יותר.

**תגובה עור חמורות**: Doloksطبع עלולה לגרום לתגובות עור חמורות שייתכן שתగרומה להפסקת השימוש. יתכן שהיא צריכה לטפל בתופעות אלו בבית החולים וכן עלולות להיות מסכנות חיים. פנה מיד אל הרופא או לשירות חירום רפואי אם יש לך שלפוחיות עור, פריחה בעור שמתקלפת, פצעים בפה, סרפפת או תופעות אלרגיות אחרות.

**תופעים של מאניה** – אנרגיה מוגברת מאוד, הפרעות שינה קשות, מחשבות תציגתיות, התנהגות פוחצת, רעימות גדיים באופן לא רגיל, עצבנות או שמחה קיצונית, דיבור רב או מהיר מהרגיל.

**גלואקומה צרת זיהוי (בעיות ראייה)** – כאבי עיניים, שינוים, שינוים בראיה, נפיחות או אדמומיות מסביב לעין. רק חלק מהאנשים נמצאים בסיכון לתופעות לוואי אלו. יתכן ותרצה לבצע בדיקה של העיניים כדי לדעת האם אתה בסיכון ולקבל טיפול מניעתי במידה וכן.

###### פרכויסים והתקנוגיות

**רמות נמוכות של נתרן בדם** – (קשהים נמצאים בסיכון מוגבר לתופעה זו): התסמינים יכולים לכלול תחושת כאב ראש, חולשה או חוסר יציבות, בלבול, קושי להתריך או לחשב או בעיות בזיכרון. תסמנים חמורים יותר הם הדיזות, איבוד הכרה, פרכויסים, תרדמת, דום נשימה ומומות.

**בעיות ההקשורת במתן שמן** – התסמינים יכולים לכלול ירידה בזרימת השתן, עצירת שתן.

- הפרעות בתפקוד המיני.** נטילת סרוטונין ומעכבי ספיגה חזורת של סרוטונין ונוראפאינפרין (5NRI), כולל דולוקס
- טבע, עלולה לגרום לביעות בתפקוד המיני.
- התסמינים בגברים עלולים לכלול:
- שפיכה מאוחרת או חוסר יכולת להגעה לשפיכה • רידיה בחשך המיני • בעיות בהשגה או בשמירה על זקופה התסמינים אצל נשים עלולים לכלול:
- רידיה בחשך המיני • עיכוב באורגזמה או חוסר יכולת לחווות אורגזמה
- דבר עם הרופא שלאם פיתחת שינויים בתפקוד המיני או אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לתפקוד המיני במהלך הטיפול בדולוקס טبع. יתכן שהרופא יוכל להציג לך פתרונות.

**תופעות הלואן השכיחות ביותר שנצפו בণיסויים קליניים בקרב מבוגרים**

- כאב נירופטי הקשור לנירופטיה סוכרתית היקפית – בחילה, תחושת נמנום, תיאבן מופחת, עיצרות, החעת יתר ויבש בפה
- פיבромיאלייה – בחילה, יובש בפה, עיצרות, תחושת נמנום, הדעת יתר, חוסר מנוחה, תיאבן מופחת • כאב קרוני כתוצאה מאוטוארטרייטיס – בחילה, עיציפות, נזוזי שינה, תחושת נמנום וסחרחות • כאב קרוני של הגב התחתון – בחילה, יובש בפה, נזוזי שינה, תחושת נמנום, עיצרות, סחרחות ועיציפות

**תופעות לוואי שנצפו בשכיחות של 5% או יותר ביחס לקבוצת הביקורת בණיסויים קליניים בקרב מבוגרים:**

- בחילה; כאב ראש; יובש בפה; תחושת נמנום; עיציפות; נזוזי שינה; עיצרות; סחרחות; שלשלולים; תיאבן מופחת; הדעת יתר; כאב בטן

**תופעות לוואי שנצפו בשכיחות של 2% או יותר ביחס לקבוצת הביקורת בණיסויים קליניים בקרב מבוגרים שסובלים מדיכאון מג'ורי והפרעת חרדה כללית:**

- **הפרעותقلب – פלפיטציות (דפיקות לב)** • הפרעות בעיניים – ראייה מטוששת • הפרעות במערכת העיכול – בחילה, יובש בפה, עיצרות, שלשלולים, כאב בטן, הקאות • **הפרעות כלולות – עיציפות** • הפרעות בחילוף חומרים ובתזונה – תיאבן, יובש בפה, עיצרות, שלשלולים, כאב ראש, סחרחות, נזוזי שינה; רעד • **הפרעות פסיכיאטריות – נזוזי שינה**, חוסר מנוחה, חרדות • **הפרעות במערכת המין והשדים –** חוסר יכולת להגעה לזקפה, עיכוב בשפיכה, רידיה בלבד,

**תופעות לוואי שנצפו בשכיחות של 2% או יותר ביחס לקבוצת הביקורת בණיסויים קליניים בקרב מבוגרים שסובלים מכאב נירופטי הקשור לנירופטיה סוכרתית היקפית, פיבромיאלייה, אוטוארטרייטיס וכאב קרוני כתוצאה:**

- **הפרעות במערכת העיכול – בחילה, יובש בפה, עיצרות, שלשלולים, כאב בטן, הקאות, קשיי עיכול • הפרעות כלולות – עיציפות •** דלקת בלוע העליון והאף, דלקת במערכת הנשימה העליונה, שפעת • **הפרעות בחילוף חומרים ובתזונה – תיאבן מופחת •** שריר-שלד וركמות חיבור – כאב שריר-שלד, התכווצות שרירים • **הפרעות בנשימה ולבית החזה – העצבים –** כאב ראש, תחושת נמנום, סחרחות, נזוזי שינה; רעד • **הפרעות פסיכיאטריות – נזוזי שינה, חוסר מנוחה •** הפרעות במערכת המין והשדים – חוסר יכולת להגעה לזקפה, הפרעות בשפיכה • **הפרעות בנשימה ולבית החזה –** טיפול בעור וברקמות תה-עוריות – הדעת יתר • **הפרעות בכלי הדם –** הסמקה, עליה בלחץ הדם

**תופעות לוואי אחרות שנצפו במהלך הureכת הণיסויים הקליניים של דולוקסטין בקרב מבוגרים:**

- **הפרעותقلب –** שכיחות: פלפיטציות (דפיקות/המלומות לב). לא שכיחות: התקף לב, קצב לב מהיר, תסמנת הלב השבור (Takotsubo cardiomyopathy) • **הפרעות באוזניים ובשיני משקל –** שכיחות: כאב אוזניים וטנטון. לא שכיחות: כאב קרוני ורטיגו. • **הפרעות אנדרוקריניות –** לא שכיחות: היפווריאודיזם • **הפרעות ראייה –** שכיחות: ראייה מטוששת. לא שכיחות: ראייה כפולה, יובש בעיניים וליקויים בראייה • **הפרעות עיכול –** שכיחות: גזים במערכת העיכול. לא שכיחות: קושי בבליעה, גיהוקים, דלקת של הקיבה (אסתטיטיס), דימום במערכת העיכול, ריח רע מהפה, דלקת של הפה והשפתים. נדירות: כאבים בקיבה • **הפרעות כלולות –** שכיחות: צמרמות. לא שכיחות: נפילות, הרגשה חריפה, תחושת חום ו/או קור, הרגשות חוסר נוחות (malaise) וצמא. נדירות: הפרעות הליכה • **ziehominos וNEGUVIM –** לא שכיחות: דלקת בקיבה ובמעיים ודלקת של מיתרי הקול • **בדיקות נספות –** שכיחות: עליה במשקל, רידיה במשקל. לא שכיחות: עליה במשקלCED • **הפרעות חומרים ובתזונה –** לא שכיחות: התיבשות ועליה בשומנים בדם. נדירות: חוסר איזון של השומנים בדם • **הפרעות בשיריר-שלד וركמות חיבור –** שכיחות: כאב שריר-שלד. לא שכיחות: מתיחות של שרירים ועוינות בשירים • **הפרעות במערכת העצבים –** שכיחות: שינוי בתחושת הטעם, עיציפות, נזוזי. לא שכיחות: הפרעת קשב, תנועות חזרות ולא רצונות (dysarthria/dyskinesia), התכווצויות לא רצוניות של שרירים ואיכות שינה גורעה. לא שכיחות: חוסר יכולת לדבר

**ובבית החזה –** שכיחות: פיהוק, כאב בלב. לא שכיחות: לחץ בגרון •  **הפרעות בעור וברקמות העור –** שכיחות: גירוד. לא שכיחות: זעה קרה, דלקת עור, אדמנת, נתיה מוגברת לפתח חבורות, הצעתليلת ורגשות לאו. נדירות: אקימוזיס (ecchymosis, סוג של חבורה) •  **הפרעות בכלי הדם –** שכיחות: גלי חום. לא שכיחות: הסמקה, תת לחץ דם בעמידה והרגשת קור בגפיים

#### תופעות לוואי שנצפו לאחר התחלת טיפול:

דלקת לבלב חריפה, שוק אנפילקט, תוקפנות וכעס (bihood בשלבים מוקדים של הטיפול או לאחר הפסקת הטיפול), בעקבות בענים, בחיל הפה, בבטן ובגפיים, גלאוקומה סגורה זווית, דלקת של המעי הגס (קוליטיס, מיקרוסקופי או שאינו מובהן), דלקות של כלי הדם שעל פני העור (cutaneous vasculitis, לעיתים בעורבות סיסטמית), הפרעות אקסטראפרימידיליות, זיבת חלב, דיזמוס גיניקולוגי, הזיות, רמות גבוהות בדם (היפרליקמיה), יתר פרולקטין בדם, רגשות יתר, משבר של יתר לחץ דם, עוויונות שרירים, פריחה, תסמנת רגליים חסרות מנוחה, פרכוסים לאחר הפסקת טיפול, פרפור חרדים, טנטון (לאחר הפסקת טיפול), צביתת לסתות (trismus) וסרפדת

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלוון, עיר להתייעץ עם הרופא.

#### דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי קר תמנוע העללה. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.**
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

#### 6. מידע נוסף

נוסך על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את החומרים הבלטי פיעלים הבאים:

Sugar spheres, hypromellose phthalate, hypromellose, triethyl citrate, hydroxypropylcellulose, talc, titanium dioxide, black iron oxide (E172), imprinting ink black.

דולוקס טבע 30 מ"ג מכילה בנוסף גם את הרכיב (E133) FD&C blue 1

#### כיצד ניתן התרופה ומה תוכן האריזה

דולוקס טבע היא כמוסה העמידה בפני עצול בקיבה. כל כמוסה של דולוקס טבע מכילה גראולות של דולוקstein הידרכולוריד עם ציפוי אנטרי שמן עליהן מפני החומציות של מיצי הקיבה ומונע את פירוקן בקיבה.  
**דולוקס טבע 30 מ"ג:** כמוסה בעלת ראש בצבע כחול וגוף בצבע אפור. על הcamosa מודפס DLX 30.  
**דולוקס טבע 60 מ"ג:** כמוסה בעלת ראש בצבע לבן וגוף בצבע אפור. על הcamosa מודפס DLX 60.  
דולוקס טבע 30 מ"ג ודולוקס טבע 60 מ"ג ארכוזיט בבליסטר (מגשית). האריזה מכילה 7, 10, 14, 28, 30, 56 או 100 כמוסות. יתכן שלא כל גודלי האריזה משווים.

היצרן ובעל הרישום:  
טבע ישראל בע"מ, רח' דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

העלון נערך באוגוסט 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:  
**דולוקס טבע 30 מ"ג:** 166-99-36004      **דולוקס טבע 60 מ"ג:** 166-98-35976

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

