

עלון לצרכנית לפִי תקנות הרווקחים (תקשיירום) התשמ"ו - 1986

תרופה זו משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פולבסטרנטן רומפארם

תמייסה להזרקה בمزרק מוכן לשימוש

להזרקה תוך שרירית

הרכב:

כל מזרק מוכן לשימוש (5 מ"ל) מכיל:

Fulvestrant 250 mg 250 מ"ג

פולבסטרנטן 250 מ"ג לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר ראי סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קראי בעיון את העلون עד סופו לפני תשתמש בתרופה.

יש לשמר את העلون أولי לצרכי אותו בשנית.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, אנא פני אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעבירו אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

- פולבסטרנטן רומפארם מיועד לטיפול בסרטן שד המבטא קולטנים לאסטרוגן מתקדם או גורתי, בנשים לאחר תקופת הבളות שלא נחשפו לטיפול הורמוני קודם או כאשר יש הישנות/התקדמות המחלת עם או אחרי טיפול הורמוני תומך.
- פולבסטרנטן רומפארם בשילוב עם התכשיר פלבוציקליב (abemaciclib) או אבמציקליב (abemaciclib), מיועד לנשים עם סרטן שד מתקדם או גורתי, המבטא קולטנים לאסטרוגן ושלילי-HER2, שמחלתן התקדמה לאחר קבלת טיפול ריבוציקליב (ribociclib), מיועד לגברים ונשים לאחר תקופת הבളות עם סרטן שד מתקדם או גורתי, המבטא קולטנים לאסטרוגן ושלילי-HER2, שמחלתן התקדמה לאחר קבלת טיפול הורמוני קודם למחלת זו או טיפול הורמוני ראשוני.
- פולבסטרנטן רומפארם בשילוב עם התכשיר פלבוציקליב (abemaciclib) או אבמציקליב (abemaciclib), מיועד לבטן שד מתקדם או גורתי, המבטא קולטנים לאסטרוגן ושלילי-HER2, שמחלתן התקדמה לאחר קבלת טיפול הורמוני קודם למחלת זו או טיפול הורמוני ריבוציקליב (ribociclib).

בעת שימוש משולב של פולבסטרנטן רומפארם עם פלבוציקליב (אייברנס), אבמציקליב (וורזני) או ריבוציקליב (קיסקל) أنا קראי גם את העلون לצריך של התכשיר פלבוציקליב (אייברנס), אבמציקליב (וורזני) או ריבוציקליב (קיסקל).

קובוצה רפואיית:

אנטוגנוטט לאסטרוגן.

התכשיר פולבסטרנטן רומפארם מכיל את החומר הפעיל פולבסטרנטן, השיר לקבוצת התרופות שחוסמות פעילות של אסטרוגן. אסטרוגן הוא ההורמון מין נשי, שיכול במקרים מסוימים להיות מעורב בה��פתחות סרטן השד.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| • הינך רגישה לפולבסטרנטן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6). |
| • הינך בהריון או מיניקה. |
| • יש לך בעיות כבד חמורות. |

ازהירות מיוחדת הנוגעת לשימוש בפולבסטרנט רומפארם

לפני הטיפול בתרופה ספרי לרופא אם יש לך:

- בעיות בכלי או בכבד.
- בעיות קודמות בקרישת הדם.
- רמה נמוכה של טסיות דם (מסייעות בקרישת הדם) או הפרעות בדימום.
- אוסטאופורוזיס (דלול העצם).
- התמכרות לאלכוהול (אלכוהוליזם).
- תשhir זה עלול להפריע לתוצאות של בדיקות המודדות רמות אסטרדיול. יש לידע את הרופא כי את נוטלת פולבסטרנט רומפארם בכל הפניה לבדיקות מעבדה.

ילדים ומתבגרים

פולבסטרנט רומפארם אינם מותווים לשימוש בילדים ובמתבגרות מתחת לגיל 18 שנים.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקחת תרופות אחרות:

ספרי לרופא או לרוקח אם אתה לוקחת:

אני דווח לרופא המטפל אם הנר נוטلت תרופות נוספות בו זמנית או אם זה עתה סימת טיפול בתרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם, ייטמינים, תוספי תזונה וצמחי מרפא. זאת מכיוון שפולבסטרנט רומפארם עלול להשפיע על אופן הפעולה של תרופות מסוימות, וכן תרופות מסוימות עלולות להשפיע על אופן הפעולה של פולבסטרנט רומפארם. במיוחד אם אתה נוטلت תרופות נוגדות קריישה (אנטי קוואגולנטים).

הירין והנקה

• הירין:

אין להשתמש בפולבסטרנט רומפארם אם הנר בהירין. במידה והנر בגין הפוריות ואת עלולה להיכנס להירין, עליך להשתמש באמצעי מניעה ייעילים למניעת הירין בתקופת הטיפול בפולבסטרנט רומפארם ושנתיים לאחר קבלת המנה האחורה של הטיפול.

• הנקה:

אין להיניק בתקופת הטיפול בפולבסטרנט רומפארם.

נהיגה ושימוש במכונות

פולבסטרנט רומפארם לא אמור להשפיע על יכולת הנהיגה שלך או היכולת להפעיל מכונות. במידה והנركשה עייפה בעקבות הטיפול, אין לנוהג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים:

פולבסטרנט רומפארם מכיל v/w 12.4% (משקל לנפח) אתנוול (אלכוהול), למשל עד 1000 מ"ג אלכוהול במנה, שווה ערך ל- 25 מ"ל בירה או ל- 10 מ"ל יין במנה. כמות זו יכולה להזיק לאלו הסובלים מהתמכרות לאלכוהול. יש לקחת זאת בחשבון בנסיבות בהריון או מניקות, ילדים ואנשים בקבוצת סיכון כגון חולים עם מחלת כבד או אפילפסיה. כמות האלכוהול בתרופה זו עשויה לשנות את ההשפעות של תרופות אחרות.

פולבסטרנט רומפארם מכיל 500 מ"ג בנזיל אלכוהול לזריקה, שווה ערך ל- 100 מ"ג/מ"ל. בנזיל אלכוהול עלול להוביל לתגובות אלרגיות.

פולבסטרנט רומפארם מכיל 750 מ"ג בנזיל בנזואט לזריקה, שווה ערך ל- 150 מ"ג/מ"ל.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש בתרופה לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוחה. הרופא יסביר לך לגבי נטילת התרופה (כמה ומתי להזריק). החזק ומשך זמן הטיפול נקבעים על ידי הרופא בהתאם למחלה ממנה אתה סובל.

המינון המקבול בהעדר הוראה אחרת מהרופא הוא:

- המינה המקבולת היא 500 מ"ג פולבסטרנט רומפארם (2 זריקות של 250 מ"ג/5 מ"ל) הניתנת אחת לחודש, ובנוסף מנה של 500 מ"ג, הניתנת שבועיים לאחר המנה הראשונה.
- כאשר פולבסטרנט רומפארם ניתן בשילוב עם איברנס, ורצני או קיסקל' המינון המקבול של פולבסטרנט רומפארם הוא 500 מ"ג ביום 1, 15 ו- 29 ופעם בחודש לאחר מכן. יש לפנות לעלון לצרכן של איברנס, ורצני או קיסקל'.

אופן השימוש

הרופא שלך או האחות יזריקו לך את **הפולבסטרנט רומפארם** בהזרקה תוך שרירית איטית. זריקה אחת לכל אחד מצד'i היישן.

אם נטלה בטיעות מינון גבוה יותר או אם בטיעות בעל יلد מהתרופה, פני מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והביאי את אריזת התרופה איתך.

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא. שלהකפיד על יישום הוראות נטילת התרופה בדיקנות ולשאול את הרופא במידה וק"מ ספק כלשהו.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפולבסטרנט רומפארם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבחלי למקרא רשותת תופעות הללו. יתכן ולא תסבלி מכך מהן.

תופעות לוואי המחייבות התיעשות מיוחדת:

פולבסטרנט רומפארם עשוי לגרום לתופעות לוואי חמורות, לרבות:

- **פגעה עצבית הקשורה למקום ההזרקה.** אם הנר מפתח ברגלייך תסמינים אלו לאחר ההזרקה של פולבסטרנט רומפארם, אנא פנה לרופא שלך:
 - נימול.
 - עקצוץ.
 - חולשה.

יתכן ותזדקקי לטיפול רפואי דחוף במידה ומופיעות תופעות הלואאי הבאות:

- תגובת רגשות יתר (אלרגיה), כולל התנפחות הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון. תופעות אלה עלולות להיות סימנים לתגובהות אנafiliktיות.
- תרומבואמבוליזם - עליה בסיכון לקרישי דם*.
- דלקת בכבד (הפטיטיס).
- כשל בכבד.

**דוחי לרופא, לאחות או לרוקח שלך אם מופיעות תופעות הלואין הבאות:
תופעות ללוואי שכיחות מאוד (משפיעות על יותר מטופל 1 מתוך 10 מטופלים):**

- תגבות באטר ההזרקה, כגון כאב /או דלקת.
- רמות לא תקין של אנדמי כבד (בדיקות דם)*.
- בחילה.
- חולשה*.
- עייפות*.
- כאבי מפרקים, שרירים ושלד.
- גלי חום.
- פריחה עורית.
- שיעול.
- עצירות.
- תגבות רגשות יתר (אלרגיה), כולל התנפחות הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון.

תופעות ללוואי נוספות:

תופעות ללוואי שכיחות (משפיעות על עד מטופל אחד מתוך 10 מטופלים):

- כאב ראש.
- הקאה, שלשול או אובדן תיאבון*.
- דלקת בדרכי השתן.
- כאבגב*.
- עלייה ברמת הבילירובי (פיגמנט מרה המיצר על ידי הכבד).
- תרומבואמבוליזם - עלייה בסיכון לקרישי דם*.
- ירידת ברמות הטסיות בדם (תרומבוציטופניה).
- דימום וגינלי.
- כאבים בגב התחתון המקרים לרגל לצד אחד, סכיאטיקה (sciatica).
- חולשה פתאומית, חוסר תחושה, עקצוצים או אובדן התנועה ברגליים, במיוחד רק מצד אחד של הגוף, בעיה פתאומית ביכולת ההליכה או בשינוי משקל (peripheral neuropathy).
- כאב בזרועות, ידים, רגליים או כפות רגליים.
- קוצר נשימה.

תופעות ללוואי שאינן שכיחות (משפיעות על עד מטופל אחד מתוך 100):

- הפרשה סמוכה ולבנה מהנרטיק וזיהום פטריטי.
- חבלה, דימום במקום ההזרקה.
- עלייה ברמה של אנדמי כבד הנקרים גמא GT (בדיקות דם).
- דלקת בכבד (הפטיטיס).
- כשל בכדי.
- עקצוצים, חוסר תחושה וכאב.
- תגובה אנאפרילקטית (אלרגית).

* כולל תופעות ללוואי בהן לא ברורה השפעתו של פולבסטרנט רומפארム, בשל מחלת הרקע.

**אם הופיעה תופעת ללוואי, אם אחת מתופעות הלואין חמירה או כאשר את סובלת מטופעת ללוואי
שלא צינה בעلون, עליך להתייעץ עם הרופא.**

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המופיע לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה.
- אין לגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
- יש לשמור בין 2°C - 8°C (במקرار).
- יש לשמור את פולבסטרטנט רומפארם באזירה המקורית בכך להגן מארו.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזירה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש. בכל מקרה של ספק, עליך להיעץ ברוקח שספק לך את התרופה.

6. מידע נוסף

נוסך על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Benzyl benzoate, benzyl alcohol, ethanol 96%, castor oil.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזירה

- פולבסטרטנט רומפארם היא תמייסה צלולה-חסרת צבע עד צהובה, ללא חלקיקים הנראים לעין, שומנית וצמיגת במזרק זכוכית המוכן לשימוש. כל מזרק מכיל 5 מ"ל תמייסה להזרקה.
- כל אזירה מכילה שני מזרקי זכוכית מוכנים לשימוש ומחייבים בטיחותיות (BD SafetyGlide™) לחיבור לכל מזרק.

היצן :

חברת רומפארם אס.אר.אל, רומניה

בעל הרישום:

אי.אל.מד-מרקט בע"מ, רח' הקטיף 3, פארק תעשיות עמוק חפר, 3877701

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

175-98-37067-99

נערך באוגוסט 2024