

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986
يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

**ميقوفينوليك أسيد أوفيك 180 ملغ
ميقوفينوليك أسيد أوفيك 360 ملغ**

أقراص باطلاق ممتد

يحتوي كل قرص باطلاق ممتد على:

ميقوفينوليك أسيد أوفيك 180 ملغ:
180 ملغ من حمض الميكوفنوليك (ما يعادل 192.4 ملغ ميكوفينولات الصوديوم)
180 mg mycophenolic acid (equivalent to 192.4 mg mycophenolate sodium)

ميقوفينوليك أسيد أوفيك 360 ملغ:
360 ملغ من حمض الميكوفنوليك (ما يعادل 384.8 ملغ ميكوفينولات الصوديوم)
360 mg mycophenolic acid (equivalent to 384.8 mg mycophenolate sodium)

المواد غير الفعالة ومستويات الحساسية في المستحضر: انظر الفصل 6 "معلومات إضافية" والفصل 2 بند "معلومات مهمة عن قسم من مرکبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين. لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

معلومات هامة لاطلاعك

- تحذير: يسبب ميكوفينولات (mycophenolate) الإجهاض والتشوهات الخلقية. إذا كنت امرأة قادرة على الحمل، سيتوجب عليك الحصول لفحص حمل تكون نتيجته سلبية قبل بدء العلاج والتفيد بتوجيهات منع الحمل التي يقدمها لك الطبيب.
- سيتحدث الطبيب إليك، خصوصاً بشأن تأثير ميكوفينولات على الأجنحة. رجاءً، راجع المعلومات جيداً وتقدّمها بالتعليمات.
- قبل تناول المستحضر، يجب استشارة الطبيب إذا لم تفهمي التعليمات بصورة كاملة.
- معلومات إضافية، انظر بند "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء" و"الحمل، الإرضاع ومنع الحمل".

1. لم أعد هذا الدواء؟

يتم إعطاء ميكوفينوليك أسيد أوفيك بالدمج مع سيكلوسبيورين وكوريوكستيرونيدات لمنع رفض الزرع الحاد لدى البالغين الذين خضعوا لزرع كلية.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول كيفية عمل ميكوفينوليك أسيد أوفيك أو لماذا تم وصف هذا الدواء لك، راجع الطبيب.

المجموعة العلاجية: مثبطات الجهاز المناعي.

2. قبل استعمال الدواء

سيوصف لك ميكوفينوليك أسيد أوفيك من قبل طبيب لديه خبرة في أدوية الزرع فقط.
يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) لحمض الميكوفنوليك، ميكوفينولات الصوديوم، ميكوفينولات موفيتيل أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء، والمفصلة في الفصل 6 "معلومات إضافية".
- كنت امرأة في سن الخصوبة ولم تجري فحص حمل نتيجته سلبية قبل تلقي أول وصفة لميكوفينوليك أسيد أوفيك، هذا لأن ميكوفينولات يسبب حالات الإجهاض والتشوهات الخلقية.
- كنت حاملاً، تحاطئين للحمل أو تعتقدين بأنك حامل.
- كنت امرأة بسن الخصوبة ولا تستخدمني وسيلة منع حمل ناجعة (معلومات إضافية، انظري بند "الحمل، الإرضاع ومنع الحمل").
- كنت مرضعة (معلومات إضافية، انظري بند "الحمل، الإرضاع ومنع الحمل").
إذا كانت إحدى الحالات الواردة أعلاه تتطابق عليك، أخبر الطبيب بذلك ولا تتناول الدواء.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

قبل العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك، أخبر الطبيب أو الصيدلي:

- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من اضطراب جدي في الجهاز الهضمي، مثل القرحة المعدية.

hypoxyanthine-guanine phosphoribosyl-transferase Kelley-Seegmiller (HGPRT) مثل متلازمة Lesch-Nyhan

عليك أيضاً الانتباه للأمور التالية:

يمسّ هذا الدواء بآلية حماية جلد الجسم من الشمس. لذلك، فإنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. عليك تقيد تعرشك للشمس ولأشعة UV من خلال تغطية الجلد المكشوف قدر الإمكان ودهن واقبات الشمس ذات معامل الحماية المرتفع. استشر الطبيب بالنسبة للوقاية من الشمس.

إذا عانيت في الماضي من التهاب الكبد الوبائي (هيباتيتس) من النوع B أو C، قد يزيد استعمال ميكوفينوليك أسيد أو فيك خطورة تكرار ظهور هذه الأمراض. قد يجري الطبيب فحوص الدم وفحوصاً لأعراض هذه الأمراض. إذا شعرت بأي عرض (جلد أو عينين باللون الأصفر، غثيان، فقدان الشهية، بول داكن) عليك بإبلاغ الطبيب فوراً.

إذا كنت تعاني من سعال متواصل أو تشعر بضيق تنفس، لا سيماء أثناء تناول مثبتات المناعة الأخرى، عليك إخبار الطبيب فوراً.

قد يفحص الطبيب مستوى المضادات في الدم أثناء العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك ويعطيك التوجيهات إذا كان عليك موافقة تناول ميكوفينوليك أسيد أو فيك، لا سيما عند وجود حالات عدوى متكررة وتتناولك لمثبتات مناعية أخرى.

إذا شعرت بأعراض العدوى (مثل الحمى، ألم الحلق)، كدمات وأو نزيف غير متوقعة، عليك بإبلاغ الطبيب فوراً.

قد يفحص الطبيب مستوى كريات الدم البيضاء أثناء العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك ويعطيك التوجيهات بشأن موافقة العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك.

المادة الفعالة في الدواء، المسماة "حمض الميكوفينوليك" غير مطابقة للمادة الفعالة في أدوية أخرى تبدو أسماؤها متشابهة، مثل "ميكوفينولات موفيتيل". لا تقم بالتبديل بين الأدوية دون توجيهات من الطبيب.

قد يضرّ استعمال ميكوفينوليك أسيد أو فيك خلال الحمل بالجنين (انظر أيضاً "الحمل، الإرضاع ومنع الحمل") ويزيد خطورة فقدان الحمل (الإجهاص الطبيعي).

بالنسبة لمنافي العلاج الذين يخطفون للحمل، يجب التفكير بالعلاج بواسطة أدوية بديلة مثبتة للمناعة، ذات خطرة أقل للتبسيب بالتسنم لدى الجنين. يجب مناقشة الطبيب بشأن خطورة العلاج مقابل فوادنه.

يُمنع التبرع بالدم أثناء العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك وحتى 6 أسابيع على الأقل بعد انتهاء العلاج.

لدى الرجال، يُمنع التبرع بالنطف (الحيوانات المنوية) أثناء العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك وحتى 90 يوماً على الأقل بعد انتهاء العلاج.

التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكمّلات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

وبشكل خاص، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

أدوية أخرى مثبتة للجهاز المناعي مثل آزاثيوريرين أو تاكروليموس.

الأدوية التي تستعمل لعلاج مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم مثل كوليسترامين.

الفم الفعال الذي يستعمل لعلاج مشاكل الهضم مثل الإسهال، ألم البطن والغازات.

الأدوية المضادة للحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم والألومنيوم.

الأدوية التي تستعمل لعلاج حالات العدوى الفيروسية مثل أسيكلوفيرون أو چانسيكلوفيرون.

عليك إخبار الطبيب إذا كنت تختلط لنافي أي لقاحات (تطعيمات).

استعمال الدواء والغذاء

يجب تناول ميكوفينوليك أسيد أو فيك على معدة فارغة، قبل الأكل بساعة أو بعد ذلك بساعتين. هذا، لضمان امتصاص الجسم لنفس الكمية من الدواء في كل يوم.

المسنون

يمكن للمسنين (عمر 65 عاماً وما فوق) استعمال ميكوفينوليك أسيد أو فيك دون الحاجة لملاءمة الجرعة.

الأطفال والمرأهقون

لا يوصى باستعمال ميكوفينوليك أسيد أو فيك للأطفال والمرأهقين نظراً لعدم توفر معلومات حول ذلك.

الحمل، الإرضاع ومنع الحمل

إذا كنت حاملاً أو مريضة، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء. سيتحدث الطبيب معك حول المخاطر في حالات الحمل وحول العلاجات البديلة لمنع رفض العضو المزروع إذا:

- كنت تخططين للحمل.

- لم يحصل لديك الطمث أو كنت تعتقدين أنه لم يحصل طمث، لديك نزيف طمئني مختلف عن المع vad، أو تشکین بأنك حامل.
- مارست علاقة جنسية دون استعمال وسيلة منع حمل ناجحة.

إذا حملت أثناء العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك، يجب إبلاغ الطبيب فوراً. مع ذلك، يجب موافقة تناول ميكوفينوليك أسيد أو فيك إلى حين الالتقاء بالطبيب.

الحمل

يسبب ميكوفينولات حالات الإجهاض بنسبة شيوخ مرتفعة جداً (نحو 50%) وتشوهات خلقية خطيرة (23%-27%) لدى الجنين. تشمل التشوهات الخلقية التي تم الإبلاغ عنها، تشوهات في الأذنين، في العينين، في الوجه (الشفة المشقوقة/الحنك المشقوق)، في تطور الأصابع، القلب، في المريء (الأنبوب الذي يصل بين الحلق والمعدة)، في الكلى والجهاز العصبي (مثلاً انشقاق العمود

الفقري - لا تتطور عظام العمود الفقري كما ينبغي). قد يصاب الطفل بوحد أو أكثر من هذه التشوهات.

إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، يُمنع بدء العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك دون فحص حمل سلبي قبل بدء العلاج. يجب التقيد بمتوجبات منع الحمل التي يقدمها لك الطبيب. قد يطلب الطبيب أكثر من فحص حمل واحد لأجل ضمان عدم كونك حاملاً قبل بدء العلاج.

الإرضاع

يُمنع استعمال ميكوفينوليك أسيد أو فيك إذا كنت مريضة، نظراً لأن كميات قليلة من الدواء قد تنتقل إلى حليب الأم.

منع الحمل لدى النساء اللواتي يتناولن ميكوفينوليك أسيد أو فيك

إذا كنت امرأة بسن الخصوبة، عليك استعمال طريقة ناجحة لمنع الحمل خلال هذه الفترات:

- قبل بدء العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك.
- طوال فترة العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك.

- على مدار 6 أسابيع بعد التوقف عن العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك.

يجب استشارة الطبيب بشأن الوسائل الأكثر ملاءمة لك لمنع الحمل. سيتم تحديد هذه الوسائل بناءً على حالتك. من الأفضل استعمال طريقتين لمنع الحمل لأن ذلك يقلل خطورة حصول حمل غير مقصود.

يجب مراجعة الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا كنت تعتقدين أن وسيلة منع الحمل لم تكن ناجحة أو إذا نسيت تناول حبوب منع الحمل.

إذا كنت تستوفين أحد المعايير التالية، فليس من المفترض أن تحمل:

- أنت امرأة بعمر انقطاع الطمث. أي: عمرك 50 عاماً على الأقل وحصل لديك آخر طمث قبل أكثر من سنة (إذا توقف الطمث لديك في أعقاب علاج السرطان، يبقى هناك احتمال بأن تحمل).

- خضعت لجراحة استئصال قنوات فالوب والمبيضين (bilateral salpingo-oophorectomy).

- خضعت لجراحة استئصال الرحم (hysterectomy).

- المبيضان لا يعملان (فشل مبيضي مبكر، تم تشخيصه من قبل طبيب نسائي مختص).

- ولدت مع إحدى الحالات النادرة التالية، والتي لا تسمح بالحمل:

- نمط جيني XY (XY genotype)، متلازمة تيرنر (Turner's syndrome) أو عدم تخلق الرحم (uterine agenesis).

- أنت طفلة أو مراهقة، قبل بدء الطمث.

منع الحمل لدى زوجات الرجال الذين يتناولون ميكوفينوليك أسيد أو فيك

لا تشير الدلائل المتوفرة إلى ارتفاع في خطر حصول التشوهات أو حالات الإجهاض إذا كان الأب يتناول ميكوفينولات، لكن الخطورة غير مستبعدة بصورة كاملة.

لأجل توكيل الحذر، من المفضل أن تقوم أنت أو زوجتك باستعمال وسيلة منع موثوقة أثناء العلاج وعلى مدار 90 يوماً بعد الانتهاء من تناول ميكوفينوليك أسيد أو فيك. إذا كنت تخطط مع زوجتك للحمل، تحدث إلى الطبيب بشأن المخاطر المحتملة.

السيادة واستعمال الماكينات

يؤثر ميكوفينوليك أسيد أو فيك بصورة قليلة على القدرة على السيادة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي ميكوفينوليك أسيد أوفيك على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على 12 ملг صوديوم (مكون أساسي في ملح الطعام) في كل قرص ميكوفينوليك أسيد أوفيك 180 ملг. هذه الكمية تعادل 0.65% من الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم لاستهلاك البالغين ضمن نظامهم الغذائي. يحتوي هذا الدواء على 25 ملг صوديوم (مكون أساسي في ملح الطعام) في كل قرص ميكوفينوليك أسيد أوفيك 360 ملг. هذه الكمية تعادل 1.3% من الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم لاستهلاك البالغين ضمن نظامهم الغذائي.

يحتوي ميكوفينوليك أسيد أوفيك على اللاكتوز

إذا قات لك الطبيب إن لديك عدم تحمل لسكرياتات معينة (بضمها اللاكتوز، الجالاكتوز والجلوكوز)، راجع الطبيب قبل تناول ميكوفينوليك أسيد أوفيك.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وتوقيت الإعطاء

الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة التناول

يجب بلع القرص كاملاً مع كأس من الماء.

نظراً لكون الأقراص مغلفة، يُمنع مضغ، كسر أو سحق الأقراص.

يُمنع بلع قرص مكسور أو مشطور.

مدة العلاج بميكوفينوليك أسيد أوفيك

يجب أن يستمر العلاج طالما كنت بحاجة لتشييط الجهاز المناعي لمنع رفض الكبد المزروعة.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة أعلى أو إذا قات طفل أو شخص آخر عن طريق الخطأ بابتلاع كمية من الدواء فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك. قد تكون هناك حاجة لعلاج طبي.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول الجرعة المنسية فور تذكرها، إلا إذا كان موعد تناول الجرعة التالية قريباً. استمر بتناول الدواء في الأوقات المحددة. يجب استشارة الطبيب.

يُمنع تناول جرعة مضاعفة للتوضيح عن الجرعة المنسية.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء، إلا بتعليمات من الطبيب. قد يؤدي التوقف عن العلاج بميكوفينوليك أسيد أوفيك إلى زيادة خطر رفض الكبد المزروعة.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تتحقق من الملصق ومن الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلحة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال ميكوفينوليك أسيد أوفيك أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدesh عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتل ألا تعاني من أي منها.

قد يعاني متلقوا العلاج المسئون أعراضًا جانبية أكثر بسبب جهاز المناعة الأضعف.

تقلل مثبطات المناعة، وبضمنها ميكوفينوليك أسيد أو فيك، الآيات الحماية في الجسم، لمنعه من رفض العضو المزروع. نتيجة لذلك، تكون قدرة الجسم على محاربة حالات العدوى أقل من الحالة الطبيعية. لذلك، إذا كنت تتناول ميكوفينوليك أسيد أو فيك، فإنك قد تعاني من حالات عدوى أكثر من المعتاد، وبضمنها حالات العدوى في الدماغ، الجلد، الفم، المعدة والأمعاء، الرئتين والمسالك البولية.

سيجري لك الطبيب فحوص دم منتظمة لمراقبة التغيرات في عدد خلايا الدم أو مستويات المواد الأخرى في الدم، مثل السكر، الدهون والكوليسترول.

بعض الأعراض الجانبية قد تكون خطيرة:

يجب مراجعة الطبيب فوراً إذا:

- كنت تعاني من أعراض حالات عدوى تتضمن حمى، حالات قشعريرة، تعرق، شعور بالتعب، نعاس أو انعدام الطاقة. إذا كنت تتلقى العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك، فقد تكون أكثر حساسية من المعتاد لحالات العدوى الفيروسية، البكتيرية والفطرية. قد يؤثر ذلك على مختلف الأجهزة في جسمك، حيث أن الأكثر شيوعاً هي الكلى، المثانة البولية والمجرى التنفسية العليا وأو السفلي.

- كنت تعاني من حالات نقبي دموي، براز أسود أو دموي، قرحة في المعدة أو في الأمعاء.
- لديك غدد متضخمة، أورام جلدية جديدة أو ازدياد حجم أورام موجودة، أو تغيير في الشمامات الموجودة. كما قد يحصل لدى المرضى الذين يتلقون العلاج بأدوية تثبيط الجهاز المناعي، نشأ لدى عدد قليل جداً من المرضى الذين يتلقون العلاج بميكوفينوليك أسيد أو فيك سرطان في الجلد أو في العقد المفاوية.

أعراض جانبية أخرى:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

- مستوى منخفض من خلايا الدم البيضاء
- مستوى كالسيوم منخفض في الدم (نقص كالسيوم الدم)
- مستوى بوتاسيوم منخفض في الدم (نقص بوتاسيوم الدم)
- مستوى مرتفع من حمض البول في الدم (فرط حمض بوريك الدم)
- ضغط دم مرتفع
- هلع
- إسهال
- ألم في المفاصل (الألم المفصلي)

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 10-100 مستعملين من بين 100:

- مستوى منخفض من خلايا الدم الحمراء، والذي قد يؤدي إلى التعب، ضيق النفس والشحوب (فقر الدم)
- مستوى منخفض من الصفائح الدموية، والذي قد يؤدي إلى نزيف وظهور كدمات غير متوقعة (نقص صفائح الدم)
- مستوى مرتفع من البوتاسيوم (فرط بوتاسيوم الدم)
- مستوى منخفض من المغنيسيوم (نقص مغنيسيوم الدم)
- دوار
- ألم رأس (صداع)
- سعال
- ضغط دم منخفض
- ضيق تنفس
- ألم في البطن أو المعدة، التهاب في جدار المعدة، انتفاخ في البطن، إمساك، صعوبات الهضم، غازات، براز رخو، غثيان، حالات نقبي
- تعب، حمى
- نتائج غير صحيحة في فحوص أداء الكبد أو الكلى
- عدوى في مجاري التنفس
- حب الشباب
- ضعف (وهن)
- آلام في العضلات (الألم العضلي)
- انتفاخ في راحتي اليدين، في الكاحلين أو في القدمين (أعراض متحملة للوندمة المحيطية)
- حكة

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

- نبضات قلب سريعة أو نبض غير منتظم في القلب (ventricular extrasystoles)، احتقان (وذمة) في الرئة.
- كيسة تحتوي على سائل لمفاوي

- رجفة، صعوبات في النوم
- احمرار وانتفاخ في العينين (التهاب الملتحمة)، رؤية مشوشة
- أصوات تنفس تشبه الصفير (wheezing)
- تشوش، رائحة كريهة من الفم، انسداد الأمعاء، تقرحات في الشفة، حرقة، تغيير في لون اللسان، جفاف في الفم، التهاب اللثة، التهاب البنكرياس الذي يسبب ألمًا شديداً في أعلى البطن (التهاب البنكرياس)، انسداد في غدد اللعاب، التهاب في غشاء الصفاق (peritonitis).
- عدوى في العظام، في الدم وفى الجلد
- بول دموي، تضرر الكلى، ألم وصعوبة في التبول
- تساقط الشعر، كدمات في الجلد
- التهاب المفاصل، ألم ظهر، تشنجات عضلية
- فقدان الشهية، ارتفاع مستوى الدهنيات في الدم (فرط شحميات الدم)، السكر (سكري)، الكوليسترونول (فرط كوليسترونول الدم)، أو مستوى منخفض من الفوسفات في الدم.
- أعراض الإنفلونزا (مثل التعب، القشعريرة، ألم الحلق، ألم في المفاصل أو في العضلات)، انتفاخ في الكاحلين والقدمين، ألم، رجفة، ضعف أو شعور بالعطش.
- أحلام غريبة، أفكار وهمية (وهام)
- انعدام القدرة على تحقيق أو الحفاظ على الانتصاب
- سعال، صعوبات أثناء التنفس (أعراض محتملة لمرض رئوي خلالي)

أعراض جانبية نسبة شيوخها غير معروفة (لا يمكن تحديد تواترها بحسب المعلومات المتوفرة):

- طفح جلدي
- حمى، ألم الحلق، حالات عدوى متكررة (أعراض محتملة لنقص الخلايا البيضاء في الدم [ندرة المحببات])

أعراض جانبية إضافية تم الإبلاغ عنها في أعقاب استعمال أدوية شبيهة بميكوفينوليك أسيد أو فيك:

تم الإبلاغ عن أعراض جانبية إضافية في أعقاب استعمال أدوية تتمنى لنفس المجموعة الدوائية التي ينتهي إليها بميكوفينوليك أسيد أو فيك: التهاب في الأمعاء الغليظة، التهاب في جدار المعدة نتيجة لفيروس CMV (cytomegalovirus)، حصول ثقب في جدار الأمعاء يسبب ألام بطن شديدة مع نزيف محتمل، تقرحات في المعدة أو في الاثني عشر، انخفاض عدد خلايا دم بيضاء معينة أو كل خلايا الدم، حالات عدوى خطيرة مثل عدوى في القلب والصمامات في القلب، عدوى في الغشاء المحيط بالدماغ والعود الفقري، ضيق تنفس، سعال قد يكون ناتجاً عن توسيع القصبات الهوائية (bronchiectasis) - حالة تتواجد فيها المسالك الهوائية في الرئتين بصورة غير سليمة) وحالات عدوى بكتيرية أخرى أقل شيوعاً قد تؤدي لحصول اضطراب رئوي خطير (السل وحالات العدوى الناتجة عن متفطرات غير نمطية).
راجع الطبيب إذا أصبحت سعال متواصل أو ضيق تنفس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية جراء علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استماراة عبر الإنترنت للتبلغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجب التسميم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و المجال روبي الأولاد وأو الأطفال، وهذا تتطلب التسميم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25°C. يجب حمايته من الرطوبة.
- بعد فتح العينة، بالإمكان استعمال الأقراص لمدة شهرين.
- يُمنع استعمال الدواء إذا لاحظت أن العبوة تالفة أو عليها علامات ضرر.
- يُمنع إلقاء الدواء في سلة المهملات أو في المجل. يجب استشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الدواء الذي لم تعد بحاجة له. يساعد ذلك في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Lactose anhydrous, crospovidone, povidone, pregelatinized starch, magnesium stearate.

تركيبة غلاف القرص:

ميكوفينوليك أسيد أو فيك 180 ملغ -

Hypromellose phthalate, triethyl citrate, hypromellose type 2910, Opadry II white
(31K58901), Opacode WB black (NS-78-17821)

ميكوفينوليك أسيد أو فيك 360 ملغ -

Hypromellose phthalate, triethyl citrate, hypromellose type 2910, Opadry complete film
coating system 03F63022 orange, Opacode WB black (NS-78-17821).

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة

ميكوفينوليك أسيد أو فيك 180 ملغ: أقراص بيضاء مغلفة، مستديرة.

ميكوفينوليك أسيد أو فيك 360 ملغ: أقراص برئالية مغلفة، بيضوية.

حجم العبوة: قنينة بلاستيكية تحتوي على 120 قرصا. عبوة صعبة الفتح للأطفال.

صاحب التسجيل وعنوانه: أو فيك فارما م.ض.، شارع سنير 22،بني درور 4581500.

اسم المنتج وعنوانه:

Twi Pharmaceuticals, Inc., 4f, No. 41, Lane 221, Kang Chien Rd., Taipei 11494, Taiwan

تم تحريرها في آب 2024

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

ميكوفينوليك أسيد أو فيك 180 ملغ: 173-68-37462-99

ميكوفينوليك أسيد أو فيك 360 ملغ: 173-69-37463-99

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معد لكل الجنسين.