

עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (תקשיים) התשמ"א-1986

התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד.

וואקיקס 4.5 מ"ג, וואקיקס 18 מ"ג

טבליות מצופות

החומר הפעיל וכמותו:

וואקיקס 4.5 מ"ג

כל טבליה מכילה פיטוליסנט הידרוכלוריד, שהוא שווה ערך ל-4.45 מ"ג פיטוליסנט (Pitolisant).

וואקיקס 18 מ"ג

כל טבליה מכילה פיטוליסנט הידרוכלוריד, שהוא שווה ערך ל-17.8 מ"ג פיטוליסנט (Pitolisant).

חומרים בלתי פעילים וארגנים בתכשיר: ראה סעיף 6 " מידע נוסף".

קרא בעין את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה בעבר. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

וואקיקס מיועד:

- טיפול במוגרים עם נרקלפסיה עם או בלי קטפלקסייה.
- לשיפור הערנות ולהפחיתת ישנוויות יתר בשעות היום (excessive daytime sleepiness). במוגרים עם דום נשימה חסימתית בשינה (apnoea obstructive) שעורם ישנוויות היתר בשעות היום לא טיפול באופן משכיע רצון בעדרת הטיפול הראשון. ביום נשימה חסימתית בשינה, כגון מכשיר CPAP (לחץ אויר חיובי מתמשך לדרכי הנשימה), או הופגנה חוסר סבילות לטיפול זה.

קבוצה רפואיית: תרופות אחרות למערכת העצבים.

- נרקלפסיה** היא מצב הגורם ישנוויות יתר בהירדם בנסיבות מסוימות במצבים בלתי מתאימים (התקפי שינה).
- קטפלקסייה** היא חולשת שרירים או שיתוק פתאומיים ללא איבוד הכרה, כתגובה לריגוש פתאומי, כגון כאב, פחד, שמחה, צחוק או הפתעה.
- דום נשימה חסימתית בשינה** הוא מצב הגורם לעצירת נשימה ל-10 דקות לפחות במהלך השינה. זה יכול להוביל לשנוויות יתר בשעות היום ולנטיה להירדם בנסיבות מסוימים בלתי מתאימים (התקפי שינה).

כיצד פועלת וואקיקס

המרכיב הפעיל, פיטוליסנט, נקשר לקולטנים שלל תא המוח המעורבים בגירוי ערנות. דבר זה מסייע בהפחיתת הישנוויות בשעות היום, העייפות, והקטפלקסייה וביעידות ערנות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל, פיטוליסנט, או לכל אחד מהרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה רשימת מוצרים בלתי פעילים בסעיף 6).
- אתה סובל מהפרעה חמורה בתפקוד כבד, לאחר שפיטוליסנט עבר פירוק בכבד ורמת גבוהות מדי עלולות להצטבר במטופלים עם הפרעה חמורה בתפקוד הכבד.
- את מניקה.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בוואקיקס, ספר לרופא אם

- סבלת מחרדה או דיכאון עם מחשבות אובדן.
- אתה סובל מהפרעות בתפקוד כבד, היות שיתיכון ותידרש התאמת מנה.
- אתה סובל מכיב קיבה או נוטל תרופות שיכילות לגרום לגירוי הקיבה, כגון תרופות נוגדות דלקת, מכיוון שתగבות של הקיבה דוחחו בנוגע

לוואקיקו.

- אתה סובל מבעיות לבביות. הרופא יctrיך לנטר תפקוד לבבי באופן סדרי כל עוד אתה נוטל וואקיקו.
- אתה סובל ממחלת כיפון (אפילפסיה) קשה.

למטופלים שמקבלים את התרופה לנركולפסיה עם או ללא קטפלקסיה בלבד

- אתה סובל מהפרעות בתפקוד הכללי, היות שתיכן ותידרש התאמת mana.

- אתה סובל מהשמנת יתר קיצונית או מאנורקסיה, כיוון שמשקלך עשוי להשנות (עלות או לרדת) במהלך הטיפול בוואקיקס.

- חלק מהמטופלים בוואקיקס, הסובלים מההיסטוריה של הפרעות פסיאטראיות, דיווחו על קיום מחשבות אובדן במהלך הטיפול. עדכן את הרופא מידית אם אתה מרגיש שאתה נהיה מודכו או שיש לך מחשבות אובדן (ראה סעיף 4). שוקל לבקש מבן משפחה או חבר קרוב לעזור לך לאתר סממני דיכאון או שינויים בהתנהגותך.

למטופלים שמקבלים את התרופה לדום נשימה חסימתית בשינה בלבד

- אתה סובל מעודף משקל או מתח משקל מושמעותים, כיוון שמשקלך עשוי לעלות או לרדת במהלך הטיפול בוואקיקס.

ילדים ומתבגרים

וואקיקס אינה מיועדת לילדים או למתבגרים מתחת לגיל 18. לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתרופה זאת בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקחת, או אם לךחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במקרהך אם אתה לוקחת:

- גוגדי דיכאון כגון קלומיפרמין, דולוקסטין, פלאוקסטין, אימיפרמין, מירטזא芬, פרוקסטין ונגלפקסין
- בופרופין, תרופה נגד דיכאון או לסיעו בגמילה מעישן
- תרופות לטיפול באלהgia הנקראות אנטיביסטמינים, כגון פניראמין מליאט, קלורפניראמין, דיפנהידראמין, פרומתאצין, מפיראמין, דוקסילאמין
- ריפמפיקין, אנטיביטוקה המשמשת לטיפול בשחפת ומספר זיהומים נוספים
- תרופות לטיפול בכיפון (אפילפסיה; למניעת פירקוזים) כגון קרבמזהפין, פנובארביטל ופניטואין
- תרופות לבב כגון דיזוקסין וכיינדין
- סנט ג'ון וורט (פרע מחרור; *Hypericum perforatum*), תרופה צמחית נגד דיכאון
- סינקלצט, לטיפול בהפרעות בבלוטת יותרת התריס
- טרכינאפין, לטיפול בדיזוזים פטרייתיים
- תרופות לטיפול בסוכרת כגון מטפורמין ורפלגיניד
- תרופות לטיפול בסרטן כגון דוסטאקסול, אירינוקטאן
- ציסאפריד, לטיפול בהחזר (ריפולוקס) קיבתי
- פימוזיד, לטיפול בהפרעות נפשיות מסוימות
- הלופנטרין, לטיפול במלריה
- אפיבירמן, תרופה אנטית ויראלית לטיפול באידייד
- מורפין, לטיפול באכבים חזקים
- פראצטמול, לטיפול באכבים
- תרופות נגדות קרישא (אנטיקואגולנטים; למניעת קרישי דם) כגון דיביגטראן וארפרין
- פרובונציד, לטיפול בשיגdon
- אמצעי מניעה הורМОנליים (תרופות למניעת הירון), ראי גם סעיף "הירון, הנקה ופוריות" בהמשך
- תרופות נגדות דלקת, נגד כאבים ולהורדת חום, כגון חומצה אצטיל סליצילית (אספירין), דיקלופנק, איבופרופן, מלוקסיקם ונפרוקסן

נרקולפסיה עם או ללא קטפלקסיה

- ניתן להשתחם בפיטוליסנט יחד עם מודפיניל או עם סודים אוקסיבט.

הירון, הנקה ופוריות

אם את בהירון או מניקה, חושבת שאתה בהירון או מתכונת להרות, היועץ ברופא או לרוקח לפני ניתילת תרופה זו.

הירון

אין להשתמש בוואקיקס בזמן הירון, אלא אם כן הורה הרופא אחרת. לא קיים מספיק מידע כדי לדעת אם קיים סיכון כלשהו הקשור לניטילת וואקיקס בזמן הירון. כל אישת חיבת להשתמש באמצעות הירון במהלך הטיפול בוואקיקס ולמשך לפחות 21 ימים לאחר הפסקת הטיפול. היהות שוואקיקס עלולה להפחית את העילות של אמצעי מנעה הורМОנליים, ש להשתמש בשיטה חלופית עיליה למניעת הירון.

ואקיקס עוברת לחלב בבעל חיים. מטופלות הנוטלות ואקיקס חייבות להפסיק להנתק.

נהיגה ושימוש במכונות

אתה עשוי לשנותו יישנו או שיכולת הריכוז שלך עשויה להיפגע.

עליך לנקט משנה זהירות בבחירה פועלות הדורשות ריכוז, כגון נהיגה והפעלת מכונות. אם אין בטוח אם מצבך משפיק לרעה על כשרותך לנהוג, שוחח עם הרופא.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בכך למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

נרקולפסיה עם או בלי קטפלקסיה

הטיפול מתחילה בדרך כלל במינה של 9 מ"ג פעם ביום, ועליה בהדרגה במשך 3 שבועות עד למינון המתאים. בכל זמן, הרופא יכול להפחית או להגדיל את המינון בהתאם להשפעת התרופה עליך ומידת הסבירות שלך אליה.

יכולים לעבור מספר ימים עד שתתרגישי את התועלת שהתרופה מעניקת, והתועלת המרבית מורגשת בדרך כלל לאחר מספר שבועות. אין לשנות את המינון של ואקיקס על דעת עצמן. כל שינוי במינון מחיב הוראה ומעקב של הרופא.

עבור מינה של 4.5 מ"ג, קח טבליה אחת של 4.5 מ"ג.

עבור מינה של 9 מ"ג, קח שתי טבליות של 4.5 מ"ג.

עבור מינה של 18 מ"ג, קח טבליה אחת של 18 מ"ג.

עבור מינה של 36 מ"ג, קח שתי טבליות של 18 מ"ג.

-dom נשימה חסימתית בשינה

הטיפול מתחילה בדרך כלל במינה של 4.5 מ"ג פעם ביום, ועליה בהדרגה במשך 3 שבועות עד למינון המתאים. בכל זמן, הרופא יכול להפחית או להגדיל את המינון בהתאם להשפעת התרופה עליך ומידת הסבירות שלך אליה. המינון היומיית המרבית היא 18 מ"ג.

יכולים לעبور מספר ימים עד שתתרגישי את התועלת שהתרופה מעניקת, והתועלת המרבית מורגשת בדרך כלל לאחר מספר שבועות. אין לשנות את המינון של ואקיקס על דעת עצמן. כל שינוי במינון מחיב הוראה ומעקב של הרופא.

עבור מינה של 4.5 מ"ג, קח טבליה אחת של 4.5 מ"ג.

עבור מינה של 9 מ"ג, קח שתי טבליות של 4.5 מ"ג.

עבור מינה של 18 מ"ג, קח טבליה אחת של 18 מ"ג.

יש ליטול ואקיקס פעם ביום דרך הפה, בבוקר עם ארוחת הבוקר. אל תיקח ואקיקס אחרי הצהרים, כי הדבר עלול לגרום לקשי הירדמות.

אין לעبور על המינון המומלצת.

אין מידע לגבי כתישה/חציה/לעיסה של הטבליות.

אם נטלה בטעות מינון גבוה יותר של ואקיקס

במקרה של נטלה כמות גדולה מדי של טבליות ואקיקס יש להתקשר לחדר המין של בית החולים הקרוב ביותר או להודיע על כך מיד לרופא או לרוקח. אתה עשוי להרגיש כאבי ראש, כאבי בטן, בחילה או עצבנות וגם קשיי שינה. יש לקחת את העלון הזה ואת כל הטבליות הנותרות איתך. אם בטעות בעליל מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול ואקיקס

אם שכחת ליטול את התרופה, יש ליטול את המינון הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מינון כפולה כדי לפזר על המינון שנשכח.

יש להתמיד טיפול כפי שהוא מילץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

עליך להמשיך ליטול את התרופה כל עוד הרופא מינה אותך לקחתה. אל תפסיק בפתאומיות ליטול ואקיקס על דעת עצמן. גם אם חל

шибור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתroxophya ללא התיעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק את התווית והמגה **בכל פעם** שאתה נוטל תרופת. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתroxophya, היועץ ברופא או ברוקת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופת, השימוש בוואקיוק עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואו. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

תופעות לוואי שכיחות מאד (עלולות להופיע ביותר מחד כמות 10 מטופלים):

דום נשימה חסimmersית בשינה	נרוקולפסיה עם או בלי קטפלקסיה
- כאב ראש	

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע עד אחד כמות 10 מטופלים):

דום נשימה חסimmersית בשינה	נרוקולפסיה עם או בלי קטפלקסיה
<ul style="list-style-type: none"> - קשיי שינה, חרדה, עצבנות, דיכאון, בעיות שינה, חרדה - תחושת "סחרור" (וּרְטִיגָו) - לחץدم גבוה - בחילה, תחושת אי נוחות בבטן, שלשול - כאב וחוסר נוחות 	<ul style="list-style-type: none"> - קשיי שינה, חרדה, עצבנות, דיכאון, בעיות שינה - כאבי ראש, תחושת "סחרור" (וּרְטִיגָו), הפרעות בשינוי משקל, רעד - בחילה, הקאה, הפרעות עיכול - עיפות (תשישות)

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להופיע بعد אחד כמות 100 מטופלים):

דום נשימה חסimmersית בשינה	נרוקולפסיה עם או בלי קטפלקסיה
<ul style="list-style-type: none"> - זיהום ויראלי של דרכי הנשימה העליונות (הצטננות), פצעי קור - שינויי בבדיקות דימום, תוצאות חריגות בעריכי בדיקות דם המשיכות לתפקוד כבד, עלייה בלחץ דם, עלייה בرمמות הcolesterol בדם - אי סבלות לאלכוהול, תיאבן מוגבר, רמת סוכר נמוכה בדם, שינויים במשקל הגוף - נרגנות, מצב בלבול, פחד, תגובה בהלה (פאניקה), עניין מוגבר או שונה במין, דיכאון, עצבנות - איבוד שיווי משקל, בעיות בתזמון השינה, פגיעה בחוש הטעם, הארעויות פתאומיות ובلتן צפיפות של תנועות וheid ויעדר תנומתיות, מיגרנה, שיתוק שינה, אובדן יכולת לבצע פעולות פיזיות - יובש בעין, הבוהקים או כתמים שחורים בראש - צלצול או צמצום באוזן - דופק לא סדייר, דפיקות לב (פלפיטציות), קצב לב מהיר, קצב לב חריג - גלי חום - פיהוק, שיעול, קשיי נשימה בלילה - עצירות, יובש בפה, בעיות במערכת העיכול, דלקת במערכת העיכול, שינוי בצבע הצואה, ריח של האויר הננשף, גזים, דימום מפני הטבעת, הפרשת רוק מוגברת - פריחה, גרד בפנים, אדמניות של העור, זיהה קרה, הצעת יתר, הצעת לילה, רגשות מוגברת חריגה לאור המשמש - חוסר נוחות בזרועות וברגליים, עוינותות שרירים, כאבי שרירים, כאבי מפרקים, כאבים בגידים - תכיפות במתן שמן - עיפות (תשישות), תחושת חום, צמא 	<ul style="list-style-type: none"> - הזעה - תיאבן מוגבר או מוגבר - בזקת עצבנות, קופצנות, שמייה או ראייה של דברים שאינם קיימים במציאות - רגשות מתחלפים - חלומות לא רגילים - מתח - קשיי הירדמות בתחילת הלילה, אמצע או סוף הלילה, קושי להמשיך בשינה, ישנוויות מוגזמת, נמנום - מצב של שווון نفس וחוסר רגש - סימוטים ליליים - תחושת אי-שקט וחוסר יכולת לשבת במנוחה - תגובה בהלה (פאניקה) - מחשבות אובדן - עניין מוגבר או שונה במין - אירוע פתאומי וחולף של חולשת שרירים, עוינותות שריר בלתי-נשלות או תנומות של רגל אחת - הפרעת קש - מיגרנה - כיפון (אפילפסיה) - חולשה - הפרעות תנומת, תנומות איטיות של הגוף - תחושה של עקצוץ, דגדוג, דקירה או בעירה בעור - הירעות תנומת פתאומיות ובلتן צפיפות של תנומתיות והעדר תנומתיות - תחושת אי-יציבות - ירידת בחדות ראייה, התכווציות חריגות או מצטצים של העפוף - שימוש קולות כאשר לא קיים קול חיוני במציאות - דופק לא סדייר, קצב לב מהיר או איטי, עלייה או ירידת גלי חום, גלי חום

דום נשימה חסימתית בשינה	נركולפסיה עם או בלי קטפלקסייה
	<ul style="list-style-type: none"> - פיהוק - יבש בפה - שלשול, כאב בטן, תחושת אי-נוחות בטן, עצירות, צרבת, כאבים ואי נוחות באזורי הקיבה, דלקת בקיבה, חומציות יתר במערכת העיכול - עקצוץ, אדמומיות לא רגילה של האף והלחיים, הצעת יתר - כאבי מפרקים, כאבי גב, נזקשות שרירים, חולשת שרירים, כאבי שרירים ועכומות, כאבים באצבועות הידיים והרגליים - מתן שתן לא רגיל - דימום רחמי לא סדייר - חוסר כוח או עייפות קיצונית, כאבים בחזה, חולשה, באזקנות - עלייה בממשק, ירידה בממשק, רישום חריג של פעילות הלב (אק"ג), תוצאות חריגות בערכי בדיקות דם המשיכות לתפקודו כבד

תופעות לוואי נדירות (עלולות להופיע بعد אחד מתוך 1,000 מטופלים):

דום נשימה חסימתית בשינה	נركולפסיה עם או בלי קטפלקסייה
	<ul style="list-style-type: none"> - איבוד תיאבון, תיאבון מוגבר - התנהגות חריגה, מצב בלבול, מצב רוח דיכאוני, התרגשות יתר, תחושות של אי נוחות רגשית ונפשית, תחושה של שמיעה וראיה של דברים שאינם קיימים במצבים בזמן השינה - איבוד הכרה, כאבי ראש ממתח, הפרעות זיכרון, איכות שינה ירודה - תחושות אי-נוחות בטן, כאים או כאב בבלעה, גזים, דלקת במערכת העיכול - דיזומומים בעור, רגשות מוגברת חריגה לאור השימוש - כאבי צוואר, כאבים בחזה - הפלת טבעית - כאב, הצעת לילה, תחושה של דיכוי - רמות גבוהות של האנדומרים קריאטינין פוספוקינאז בدم, מצב גופני כללי חריג, שינויים ברישום הפעולות החש밀ית של הלב (אק"ג)

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (il. www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או ע"ז כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנع הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הארזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון :

אין לאחסן מעל 30°C. לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 40 ימים, בטמפרטורה שאינה עולה על 30°C.

אין להשליך תרופות לאשפה הביתיית או לביב. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאינן משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יעזרו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

microcrystalline cellulose, crospovidone, talc, Opadry II HP85F18422 white (containing polyvinyl alcohol, titanium dioxide, Macrogol 3350, talc), magnesium stearate, colloidal anhydrous silica.

כיצד נראה התווך ומה תוכן הארץ:

ואקיקס 4.5 מ"ג היא טבליה לבנה, עגולה, מצופה, שקוטרها 3.7 מ"מ, קמורה משני צדדייה עם הספירה "5" המנסומנת על צידה אחד.
ואקיקס 18 מ"ג היא טבליה לבנה, עגולה, מצופה, שקוטריה 7.5 מ"מ, קמורה משני צדדייה עם המספר "20" המנסומן על צידה האחד.
ואקיקס זמיןה בבקבוקונים המכילים 30 טבליות ווסף לחות.

בעל הרישום וכתובתו: תרומד בע"מ, רח' בני גאון 10, נתניה 4250499.

שם הייצור וכתובתו: ביופרגט פארמה פריז, צרפת.

עלון זה אושר על ידי משרד הבריאות בדצמבר 2022.

מספר רישום התווך בפנקס התווכחות הממלכתי במשרד הבריאות:

ואקיקס 4.5 מ"ג 164-01-36119
ואקיקס 18 מ"ג 164-02-36120

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון ذכר. על אף זאת, התווך מיועד לבני שני המינים.

PL-1041 05-08.24