

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986**

يسوق الدواء بموجب وصفة فقط

## ريفيديات إل.إي.

## 10، 20، 30، 40، 60 ملغ

### كيسولات معثلة الإطلاق

تحتوي كل كيسولة معثلة الإطلاق على مثيل فيديات هيدروكلوريد (Methyphenidate hydrochloride) 10، 20، 30، 40 أو 60 ملغ على التوالي.

النود 2 الفعالة ومسببات الأرجية في الدواء – انظر البند 6 "معلومات إضافية" في

المواد غير معلومة هامة عن بعض مركبات الدواء."

**أقرأ النشرة بإمعان حتى نهتفئها قبل استعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات مختصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي. لقد وُصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تعَلمه لآخرين. قد يضرهم هذا حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

**المعاقرة، الاستعمال الخطأ والإدمان**

يجب استعمال **ريفيديات إل.إي** هناك احتمال كبير لمعاقرتة واستعماله بشكل خاطئ وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في استعمال المواد تشمل الإدمان. المعرفة والاستعمال الخاطئ للمواد المنوية للرجال **المنصبي** الريفيديات إل.إي، بما في ذلك **ريفيديات إل.إي**، قد يؤديان إلى فرط الجرعة الدوائية والموت، ويزداد خطر حدوث ذلك في الجرعات الأكبر أو في أشكال الإطداء غير المصنق عليها، مثل الاستنشاق أو الحقن.

#### 1. لأي غرض خصص هذا الدواء؟

لعلاج اضطرابات نقص الانتباه والتركيز (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

**الفصيلة العلاجية:** منته للجهاز العصبي المركزي.

تحتوي كيسولات **ريفيديات إل.إي** المركب الفعال ميثيل فيدييات هيدروكلوريد. مثيل فيدييات هيدروكلوريد هو منته للجهاز العصبي المركزي.

تُستعمل كيسولات **ريفيديات إل.إي** لعلاج اضطراب نقص الانتباه والتركيز (ADHD) اضطراب فرط الحركة) وهو اضطراب سلوكي لدى الأولاد والمراهقين والبالغين. يعاني ما يقرب من 3% من الأولاد من هذا الاضطراب، الذي لا ينتج لهم الجلس بسببكنة أو التركيز بآلمهام لفترة ما. الأولاد المصابون بهذا الاضطراب قد يواجهون صعوبة في الدراسة وفي تحضير الواجبات البيتية. في أحيان متقاربة قد يكون من الصعب إدارة الشؤون/التعامل معهم في المدرسة والبيت.

بالغيون المصابون بـ ADHD يواجهون صعوبة في التركيز في أحيان متقاربة. غالبًا ما يشعرون بالتامل وانعدام الصبر، ويكون ذلك مصحوبًا بمسوى منخفض من الإصغاء، ويشعرون بالملل بسهولة. قد يستمتعون بتنظيم حياتهم الشخصية وفي العمل.

يُخضع أول ميثيل فيدييات يعمل من خلال تناول مواد كيميائية معينة في الدماغ تؤثر على السلوك يساهم في تركيز الانتباه، وفي حبس الأمور الهلوسية ويمكن الأشخاص الانتفاعيين من التفكير قبل الإقدام على العمل. إذا نجح العلاج، فهو يحسن قدرة الشخص الطبيعية على الإصغاء.

هذا الدواء يشكّل جزءًا من برنامج علاجي يشمل عادةً أيضًا علاجًا نفسيًا وتربويًا واجتماعيًا.

إذا توفّر لديك أي سؤال عن كيفية عمل **ريفيديات إل.إي** أو عن سبب وصف هذا الدواء لك أو لوليك، فراجع طبيبك.

#### 2. قبل استعمال الدواء

**لا يجوز استعمال الدواء:**

- إذا وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (ميثيل فيدييات) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6). قد تشمل بعض أعراض رد الفعل التحسسي على ضيق التنفس، آزيز أو صعوبات في التنفس؛ انتفاخ الوجه، التشنج، التشنج، التشنج أو أجزاء أخرى من الجسم؛ طفح جلدي، حكة أو شرى جلدي.

**لا يجوز استعمال ريفيديات إل.إي إذا كنت تعاني من الحالات الطبية التالية:**

مقلّاة من الفلق أو التوتر أو الهياج
مقلّاة من توريت (حالة جرع خاضعة للسيطرة من الحركات الجسدية والنطق أو الغرائب) أو إذا وجد لديك مضاع عاثي من هذا الاضطراب
تزيد الإصطط داخل العين (جلوكوما)

- فرط نشاط الغدة الدرقية (تيرويد) أو مشاكل أخرى في الغدة الدرقية
- مشاكل القلب مثل نوبة قلبية، بنض غير منتظم، الألم في الصدر (ذبحة صدرية)، قصور القلب، مرض قلبي أو مشككة خَلْصِي في القلب
- ضعف دم مرتفع جدًا (فرط ضغط الدم) أو تضيق الأوعية الدموية الشريانية (انسداد الشرايين الذي قد يسبب ألمًا في الرئتين والرجلين)
- ورود رائد في الغدة الكظرية (فوق الكظرية) يعرف باسم ورم القواتم

**لا يجوز استعمال ريفيديات إل.إي إذا كنت تستعمل دواء من فصيلة مثبطات الإكسمايذاز أحادي الأمين (MAO) أو إذا استعملت مثبطات MAO خلال 14 يومًا قبل البدء بالعلاج بريفيديات إل.إي (انظر أيضًا البند "التفاعلات بين الأدوية)".** استعمال ريفيديات إل.إي سويًا مع أدوية من فصيلة مثبطات MAO قد يسبب رد فعل خطيرًا يشمل ارتفاعًا فجائيًا في حرارة الجسم، ضغط دم مرتفعًا للغاية وتشنجات شديدة.

اسأل الطبيب إذا لم تكن متأكدًا من أنك استعملت أحد هذه الأدوية.

**تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء**

**أخطر الطبيب إذا وجدت لديك أرجية (حساسية) لأي دواء آخر أو لغذاء أو لمواد ملونة أو لمواد حافظة.**
سيرغب الطبيب في معرفة ما إذا وجد لديك ميل لنشوء أرجيات.

#### 2. قبل استعمال الدواء

عند استعمال **ريفيديات إل.إي** هناك احتمال كبير لمعاقرتة واستعماله بشكل خاطئ وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في استعمال المواد تشمل الإدمان. المعرفة والاستعمال الخطئ ل**ريفيديات إل.إي** والأدوية أخرى تحتوي على ميثيل فيدييات تحتوي على أمفيتامين (الكريات الصفيرة) على كمية صغيرة من الطعام الخرو (مثل هريس الفلاح).

- يجب التأكد من أن الطعام ليس ساخنا لأن هذا الشيء قد يؤثر على الصفات الخاصة للكريات الموجودة في الكبسولة
- يجب تناول الحبوب/الدواء/الطعام بأكمله بشكل فوري

لا يجوز الاحتفاظ بالخاليط لامتعامله في المستقبل

إذا سببت لك كيسولات أترز علاجًا في البطن، فيمكن تناولها مع الطعام، لكن يجب الحرص على تناولها دائمًا بنفس الشكل (يعني: دائمًا مع الطعام أو دائمًا بدون الطعام). بهذه الطريقة سيكون التأثير متماثلًا على الدوام.

إرشادات فتح العبوة الشرطية:
تتوفر هذا الدواء في عبوات شرطية يصبغ فتحها من قبل الأولاد، ويمكن تفسيرها. يرجى الانتباه إلى التعليمات التالية لفتح العبوة الشرطية لفتح:

- لا يجوز فعل الكبسولة إلى خارج العبوة الشرطية لأن هذه العملية ستسحق الكبسولة.
- أسك بالعبوة الشرطية بحيث يتجه الورق الفضي المطبوع إلى الأعلى وعلى يمينه إلى الخلف على طول الخط المتقوّب. إن العبوة الشرطية بالألوان المعاكس ومزمق على طول الخط المتقوّب.

إذا لم يزد طول وِلْك أو لم يرتفع وزنه كما يُتوقَّع منه، فقد يتطلّب ذلك إجراء توفقات في إعطاء ريفيديات إل.إي.

**التفاعلات بين الأدوية**

**إذا كنت تستعمل أن.إن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة**

**طبيب وإضافات غذائية، فأخطر طبيب أو الصيدلي بذلك.**

إذا استعملت بعض الأدوية سويًا مع ريفيديات إل.إي فإن الواحد قد يعيق عمل الآخر.

تُشتمَل هذه الأدوية على:

- أدوية ترفع ضغط الدم
- مضادات التخثر المستعملة عن طريق الفم أو وارفارين (أدوية تُستعمل لمنع الخثرات الدموية)
- ناهضات المستقبل من النوع 2أ مثل كلوندين (المستعملة لعلاج ضغط الدم المرتفع)
- أدوية لعلاج الاكتئاب، مثل مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات وميثيلات الأوكسيتراز، أحادي الأمين (MAO). انظر أيضًا البند "لا يجوز استعمال الدواء إذا"
- برعض مضادات الاختلاج (أدوية تُستعمل لعلاج الصرع أو التوابع الصرعية)
- فينيل بوتازون (لعلاج الإلام أو الحمى)
- جوانيتيينيد
- المواد المخدرة
- أدوية تؤثر على مستوى الدوبامين في الجسم (الأدوية دويامينية المفعول تُستعمل لعلاج مرض الباركنسون أو الزهاجن)
- أدوية ترفع مستوى الدوبامين في الجسم (أدوية سيروتونينية المفعول، مثلًا تلك المستعملة لعلاج الاكتئاب مثل سيترالين وفينيلالانكسول).

قد تكون هناك حاجة إلى تغيير جرعة أدويةك أو قد تضطر إلى استعمال أدوية أخرى. استشر الطبيب.

إذا لم تخبر الطبيب عن الأدوية الإضافية التي تستعملها، فاستشره قبل استعمال **ريفيديات إل.إي**.

إذا كنت على وشك البدء بالعلاج بدواء جديد، ففكر طبيبك أو طبيب الأسنان أو الصيدلي أنك تتلقى العلاج بريفيديات إل.إي.

**استعمال الدواء والطعام**

يمكن تناول كيسولات **ريفيديات إل.إي** مع الطعام أو بدونه.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**

لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بريفيديات إل.إي. تذكر أن ألعمة معينة والأدوية قد يكون هناك حاجة إلى تغيير جرعة أدويةك أو قد تضطر إلى استعمال أدوية أخرى.

استشر الطبيب.

إذا لم تخبر الطبيب عن الأدوية الإضافية التي تستعملها، فاستشره قبل استعمال **ريفيديات إل.إي**.

أفكر أو محاولات لتقلّ نفسك (تفكير انتحاري أو محاولة الانتحار بما في ذلك الانتحار فعليًا)

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول كيسولات **ريفيديات إل.إي** مع الطعام أو بدونه.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**
لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بريفيديات إل.إي. تذكر أن ألعمة معينة والأدوية قد يكون هناك حاجة إلى تغيير جرعة أدويةك أو قد تضطر إلى استعمال أدوية أخرى.

استشر الطبيب.
إذا لم تخبر الطبيب عن الأدوية الإضافية التي تستعملها، فاستشره قبل استعمال **ريفيديات إل.إي**.

أفكر أو محاولات لتقلّ نفسك (تفكير انتحاري أو محاولة الانتحار بما في ذلك الانتحار فعليًا)

#### استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول كيسولات **ريفيديات إل.إي** مع الطعام أو بدونه.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**
لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بريفيديات إل.إي. تذكر أن ألعمة معينة والأدوية قد يكون هناك حاجة إلى تغيير جرعة أدويةك أو قد تضطر إلى استعمال أدوية أخرى.

استشر الطبيب.
إذا لم تخبر الطبيب عن الأدوية الإضافية التي تستعملها، فاستشره قبل استعمال **ريفيديات إل.إي**.

أفكر أو محاولات لتقلّ نفسك (تفكير انتحاري أو محاولة الانتحار بما في ذلك الانتحار فعليًا)

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول كيسولات **ريفيديات إل.إي** مع الطعام أو بدونه.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**
لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بريفيديات إل.إي. تذكر أن ألعمة معينة والأدوية قد يكون هناك حاجة إلى تغيير جرعة أدويةك أو قد تضطر إلى استعمال أدوية أخرى.

استشر الطبيب.
إذا لم تخبر الطبيب عن الأدوية الإضافية التي تستعملها، فاستشره قبل استعمال **ريفيديات إل.إي**.

أفكر أو محاولات لتقلّ نفسك (تفكير انتحاري أو محاولة الانتحار بما في ذلك الانتحار فعليًا)

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول كيسولات **ريفيديات إل.إي** مع الطعام أو بدونه.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**
لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بريفيديات إل.إي. تذكر أن ألعمة معينة والأدوية قد يكون هناك حاجة إلى تغيير جرعة أدويةك أو قد تضطر إلى استعمال أدوية أخرى.

استشر الطبيب.
إذا لم تخبر الطبيب عن الأدوية الإضافية التي تستعملها، فاستشره قبل استعمال **ريفيديات إل.إي**.

أفكر أو محاولات لتقلّ نفسك (تفكير انتحاري أو محاولة الانتحار بما في ذلك الانتحار فعليًا)

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول كيسولات **ريفيديات إل.إي** مع الطعام أو بدونه.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**
لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بريفيديات إل.إي. تذكر أن ألعمة معينة والأدوية قد يكون هناك حاجة إلى تغيير جرعة أدويةك أو قد تضطر إلى استعمال أدوية أخرى.

استشر الطبيب.
إذا لم تخبر الطبيب عن الأدوية الإضافية التي تستعملها، فاستشره قبل استعمال **ريفيديات إل.إي**.

أفكر أو محاولات لتقلّ نفسك (تفكير انتحاري أو محاولة الانتحار بما في ذلك الانتحار فعليًا)

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول كيسولات **ريفيديات إل.إي** مع الطعام أو بدونه.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**
لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بريفيديات إل.إي. تذكر أن ألعمة معينة والأدوية قد يكون هناك حاجة إلى تغيير جرعة أدويةك أو قد تضطر إلى استعمال أدوية أخرى.

استشر الطبيب.
إذا لم تخبر الطبيب عن الأدوية الإضافية التي تستعملها، فاستشره قبل استعمال **ريفيديات إل.إي**.

أفكر أو محاولات لتقلّ نفسك (تفكير انتحاري أو محاولة الانتحار بما في ذلك الانتحار فعليًا)

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول كيسولات **ريفيديات إل.إي** مع الطعام أو بدونه.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**
لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بريفيديات إل.إي. تذكر أن ألعمة معينة والأدوية قد يكون هناك حاجة إلى تغيير جرعة أدويةك أو قد تضطر إلى استعمال أدوية أخرى.

استشر الطبيب.
إذا لم تخبر الطبيب عن الأدوية الإضافية التي تستعملها، فاستشره قبل استعمال **ريفيديات إل.إي**.

أفكر أو محاولات لتقلّ نفسك (تفكير انتحاري أو محاولة الانتحار بما في ذلك الانتحار فعليًا)

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول كيسولات **ريفيديات إل.إي** مع الطعام أو بدونه.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**
لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بريفيديات إل.إي. تذكر أن ألعمة معينة والأدوية قد يكون هناك حاجة إلى تغيير جرعة أدويةك أو قد تضطر إلى استعمال أدوية أخرى.

استشر الطبيب.
إذا لم تخبر الطبيب عن الأدوية الإضافية التي تستعملها، فاستشره قبل استعمال **ريفيديات إل.إي**.

أفكر أو محاولات لتقلّ نفسك (تفكير انتحاري أو محاولة الانتحار بما في ذلك الانتحار فعليًا)

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول كيسولات **ريفيديات إل.إي** مع الطعام أو بدونه.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**
لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بريفيديات إل.إي. تذكر أن ألعمة معينة والأدوية قد يكون هناك حاجة إلى تغيير جرعة أدويةك أو قد تضطر إلى استعمال أدوية أخرى.

استشر الطبيب.
إذا لم تخبر الطبيب عن الأدوية الإضافية التي تستعملها، فاستشره قبل استعمال **ريفيديات إل.إي**.

أفكر أو محاولات لتقلّ نفسك (تفكير انتحاري أو محاولة الانتحار بما في ذلك الانتحار فعليًا)

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول كيسولات **ريفيديات إل.إي** مع الطعام أو بدونه.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**
لا يجوز استهلاك الكحول في فترة العلاج بريفيديات إل.إي. تذكر أن ألعمة معينة والأدوية قد يكون هناك حاجة إلى تغيير جرعة أدويةك أو قد تضطر إلى استعمال أدوية أخرى.

استشر الطبيب.
إذا لم تخبر الطبيب عن الأدوية الإضافية التي تستعملها، فاستشره قبل استعمال **ريفيديات إل.إي**.

أفكر أو محاولات لتقلّ نفسك (تفكير انتحاري أو محاولة الانتحار بما في ذلك الانتحار فعليًا)

استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول كيسولات **ريفيديات إل.إي** مع الطعام أو بدونه.

- ارتفاع فحاني في حرارة الجسم، تعرّق، نبض سريع، ألم في الصدر، تصلب العضلات وتقلّبات في ضغط الدم قد تؤدي إلى الغيبوبة (كوما)

حالة دائمة من وجود أعراض شبيهة بالإنفلونزا مثل شعيرة، حمى، ألم في الحلق وسيلان الأنف، قد تشكّته، الألم في العضلات أو في المفاصل

تزيد نمو أو كتل متجمدة غير عادية

تعب غير عادي، ضيق التنفس أثناء القيام بنشاط بدني، دوام، شحوب الجلد

انتفاض لا إرادي للجسم (ارتجاج) مثل التشنجات، الانتفاض أو حركات تلوّ غير خاضعة للسيطرة

اختلاجات (نوبات) أو إغماء لا مبرر له

ألم أو نيحة في الصدر

نبض سريع أو غير منتظم

اصفرار الجلد أو العينين، ألم في غامق اللون أو براز فاتح اللون

ارتباك، أو هام أو طورابات (زبديّة أثناء أو الإحساس بشيء غير موجودة)

انفعال، فقدان النشاط وسيلوك غير العواظ

صداع شديد أو دائم

نطق وحركات جسم غير خاضعة للسيطرة (متلازمة توريت)

انتصاب مطول يسبب ارتعاجًا في القضيب (علامة للفحاح)

أفكار أو محاولات لتقلّ نفسك (تفكير انتحاري أو محاولة الانتحار بما في ذلك الانتحار فعليًا)

استعمال الإحسان في أصابع اليدين والقدمين، والشعور بالبرودة فيها، والشعور بالخوض فيها وأنها تغير لونها (من الأصفر إلى الأحمر) ثم لتأخر من عند التعرض للبرد (ظاهرة رينو، برودة محيطية)

تشنجات وانتفاضات غير خاضعة للسيطرة (خلل الحركة)

انخفاض استثنائي في مستويات جميع أنواع خلايا الدم. بذلك يفقر الدم ويانفخض انخفاض الدموية ويانفخض في خلايا الدم البيضاء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى التعب

وإلى زيادة خطر حدوث نزيف دموي و/أو زيادة خطر نشوء ثلوث. قد يكون ذلك خطيرًا أو يشكل خطرًا على الحياة (قلة الكريات الشاملة)

الأعراض الجانبية التي تكررت أعلا قد تكون خطيرة. قد تكون هناك حاجة إلى مراقبة طبية مستعجلة

**أعراض جانبية إضافية**
بلغ الطبيب إذا لاحظت وجود أحد الأعراض التالية وكان مقلًا لك:

**أعراض جانبية شائعة جدًا** (أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):

- غثان
- قدان الشهية
- ألم في الحلق وسيلان الأنف
- عصبية
- أرق
- جفاف في الفم

**أعراض جانبية شائعة** (أعراض تظهر عند 10-100 مستعملين من بين 100):

تقيؤ أو ألم في البطن
انزعاج في البطن أو صعوبات في الهضم

إحساس بأثقل أو الجرع
إحساس بالثوثر المتزايد

هياج (عدم الهدوء)

اضطرابات في النوم

صداع

سعال

نعاس

دوار

تتملّ

تساقط الشعر

طفح جلدي (شرى)

الإم المفاصل

ألام الأسنان

فرط التعرّض

نظم قلبي غير طبيعي

إبراك الذقات العلية

ضائقة عاطفية بألمة أو انفعال

انخفاض الوزن

إحساس بالأكتئاب

إحساس بالعدوانية

صيرير (اصطكاك) الأسنان بشكل مبالغ فيه

**أعراض جانبية غير شائعة** (أعراض تظهر عند 10-100 مستعملين من بين 1,000):

رؤية مشوشة أو اضطرابات في تركيز النظر

**أعراض جانبية نادرة جدًا** (أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

حالة مزاجية متذبذبة عابرة

تشنجات عضلية

فقر الدم (انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء)، قلة الكريات البيضاء (انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء)، قلة الصفيحات (انخفاض في عدد صفيحات الدم)

**أعراض جانبية جدية مشوّعها غير معروف** (أعراض لا يتم تحديده مدى شيوعها بعد):

تأثّر

سلس البول الليلي عند الأولاد.

ألم في الصدر، تعب

عدم القدرة على إنشاء انتصاب (القضيب) أو المحافظة عليه، التشنج التشنج لدى الرجال

التهاب السليماك الالتهابي والقلبية

انتفاخ الأندين (علامة لرد فعل تحسسي)

تهيجيّة، عدوانية، تغرّات في المزاج، سلوك أو تفكير غير سليمين، غضب، فرط الإدراك البصرية المحيطة، إحساس غير عادي بالألوان، فرط النشاط وانعدام الضوابط (فوبس)، توهان، تغير في الدفاع الجنسي، نقص اللمعة أو الإحسان، تكرار الأفعال

مرض ثلو الأخرى، وسواس لوسّي، واحد أو ارتباك، الجمذ

ضعف العضلات الموترقة، قدان الإحسان في الجلد

الجسم يبسط ضغط مؤقت في تزويد الدماغ بالدم (neurological deficit reversible ischemic)
توقف النبض، نوبة قلبية
رؤية مزدوجة، توسع الحدقتين، صعوبة في الرؤية
توقف النبض، نوبة قلبية
ألم في الحلق، ضيق التنفس
إسهال، إمساك
احمرار أو إتهاء العضلات، بقع حمراء وكبيرة على الجلد تظهر خلال بضع ساعات من تناول الدواء
ألام العضلات، تشنّجات عضلية
تزايد الضغط داخل العين

**أعراض جانبية إضافية حدثت عند استعمال أدوية أخرى تحتوي نفس المادة الفعالة مثل ريفيديات إل.إي:**
متم في البول
موت فحاني
مشخّشات غير عادية من القلب

**إذا ظهر عرض جانبي، أو تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، ففعلك استشارة الطبيب.**

**التبليغ عن الأعراض الجانبية:**
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "1-800-551-1111"
**تفصوات لواء: عكبر تسيول تروثوت**" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الإسمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:
**https://sideeffects.health.gov.il**

#### 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

أمنع التسمّم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستعص التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXPIRY DATE) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

**ظروف التخزين:** يجب التخزين في درجة حرارة دون 25°C.

#### 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Sugar spheres, methacrylic acid-methyl methacrylate copolymer (1:1), ammonio methacrylate copolymer (type B), povidone, talc, triethyl citrate, gelatin, titanium dioxide (E171), red ink (shellac glaze) (E904), propylene glycol (E1520), red iron oxide (E172), strong ammonia solution (E527), potassium hydroxide (E525)

إضافة إلى ذلك، يحتوي ريفيديات إل.إي 10 ملغ، 30 ملغ، 40 ملغ و60-ملغ على iron oxide yellow (E172)

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:**

كريات باللون الأبيض والضراب إلى 10 ملغ، 20 ملغ، 30 ملغ، 40 ملغ، 60 ملغ على **ريفيديات إل.إي** 10 ملغ؛ كبسولة ذات غطاء أصفر غامق معتم وجسم أبيض معتم، على الغطاء مطبوع "RUB" باللون الأحمر وعلى الجسم مطبوع "10" باللون الأحمر.

**ريفيديات إل.إي 20 ملغ؛** كبسولة لونها أبيض معتم، على الغطاء مطبوع "RUB" باللون الأحمر وعلى الجسم مطبوع "20" ملغ؛ كبسولة لونها عاجي معتم، على الغطاء مطبوع "RUB" باللون الأحمر.

**ريفيديات إل.إي 30 ملغ؛** كبسولة لونها عاجي معتم، على الغطاء مطبوع "RUB" باللون الأحمر وعلى الجسم مطبوع "30" ملغ؛ كبسولة لونها أصفر غامق معتم، على الغطاء مطبوع "RUB" باللون الأحمر.

**ريفيديات إل.إي**