

עלון לצרcn לפי תקנות הרוקחים (ఈշירים) התשמ"ו-1986

תרופה זו משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קאלקונסTM טבליות טבליות מצופות

רכיב

כל טבלייה מכילה:

אקלברוטיניב (כמליאייט) 100 mg

Acalabrutinib (as maleate) 100 mg

למרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים, אנא ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוספים".

קרה בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

קאלקונס טבליות מיועדת לטיפול:

- במוגרים עם Mantle cell lymphoma (MCL) אשר קיבלו לפחות טיפול אחד קודם.
- במוגרים עם לוקמיה כרונית של תא הlimפה (Chronic lymphocytic leukemia - CLL) או בלימפומה של לימפוציטים קטנים (Small lymphocytic lymphoma - SLL).

קובצת תרפואיית
מעכבי Bruton tyrosine kinase (BTK).

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשתמש בתרופה אם:
אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (נא ראה סעיף 6 – "מידע נוספים").

אוherence מיחודות הנוגעות לשימוש בקאלקונס טבליות:

לפני נטילת קאלקונס טבליות ספר לרופא אם:

- עברת ניתוח לאחזרונה או מתכנן לעבר ניתוח. ייתכן והרופא שלך יפסיק את הטיפול בקאלקונס טבליות עבור כל הליך ניתוח מתוכנן, רפואי, או ניתוח שינויים מתוכן.
- הנך סובל מביעות דימום.
- הנך סובל או סבלת מהפרעה בקצב הלב.
- הנך סובל מழימות.
- את בהריון או מתחכנת להכנס להריון.
- את מניקה או מתחכנת להניך.

ילדים ומתבגרים

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה בילדים ומתבגרים.

בדיקות ומעקב:

על מנת לבצע ניטור של ספירת הדם, הרופא יפנה ואחר בדיקת דם של ספירת דם באופן קבוע במהלך הטיפול בකאלקונס טבליות.
הרופא יבצע בדיקה לסרען עור במהלך הטיפול בකאלקונס טבליות.
במידה והנر בגיל הפוריות, ייתכן והרופא יפנה ואחר לביצוע בדיקת הריון טרם תחילת השימוש בתרכופה.

איןטראקציות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. נטילת קאלקונס טבליות עם תרופות מסוימות עלולה להשפיע על אופן פעולתה ועלולה לגרום לתופעות לוואי. במקרה יש לידע את הרופא אם אתה נוטל:

- **תרופות לדילול דם.**

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול את התרכופה עם או ללא מזון.

הריון, הנקה ופוריות:

הריון:

אם הנר בהריון, חשוב שahnך בהריון או מתכנת להיכנס להריון, יידעו את הרופא לפני נטילת תרופה זו.
קאלקונס טבליות עלולה לפגוע בעורר ולגרום לעבירות במהלך הלידה (דיסטוציה). הרופא עשוי לבקש ממך לבצע בדיקת הריון לפני תחילת הטיפול בקאלקונס טבליות. אם הנר בגיל הפוריות, עליך לשימוש באמצעות מניעת ייעיל במהלך הטיפול בקאלקונס טבליות ולמשך שבוע לאחר המנה الأخيرة.

הנקה

לא ידוע האם קאלקונס טבליות עוברת דרך חלב האם. אין להניך במהלך הטיפול בקאלקונס טבליות ובמשך שבועיים לאחר נטילת המנה الأخيرة של קאלקונס טבליות.

נהיגה ושימוש במכונות

קאלקונס טבליות לא אמורה להשפיע על יכולתך לנוהג או להפעיל מכונות, אך אם הנר חש סחרחוות, חולשה או עייפות בזמן השימוש בקאלקונס טבליות, אין לנוהג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחת מ-1-ミילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, ככלומר, היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשימוש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
- המינון המקובל בדרך כלל הוא: טבליה אחת של קאלקונס טבליות פעמיים ביום (בהפרש של כ- 12 שעות).
- אין לשנות את המנה או להפסיק את נטילת התרופה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- הרופא יכול להורות לך להפחית את המנה, להפסיק באופן זמני או קבוע את נטילת התרופה, אם מופיעות תופעות לוואי מסוימות.
- אין להחליף את טבליות הקאלקונס שלך עם קאמוסות קאלקונס.
- **אין לעבור על המנה המומלצת.**

אופן הנטילה

- ניתן ליטול עם או ללא מזון.
- יש לבלוות את הטבליה בשמלמותה עם כוס מים. אין ללעום, לכחותש, להמיס או לחתוור את הטבליה.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר או אם בטיעות בעליל מהתרופפת, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים, והבא את אריזת התרופפת אליו.

אם שכחת ליטול את התרופפת:

אם שכחת ליטול תרופפה זו בזמן המיעוד, יש ליטול אותה מיד כשנecessית. אם עברו יותר מ- 3 שעות מהזמן בו הייתה אמרה ליטול את התרופפת, יש לדלג על המנה שנשכחה וליטול את המנה הבאה בזמן המתוכנן הרגיל ולהיוועץ ברופא. אין ליטול מנה כפולה בכדי לפצוח על המנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שהן נוטל את התרופפת. הרכב משקפיים אם הן זוקן להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופפת, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופפת, השימוש באקלקוונס טబליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבחלה למקרא רישימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

תופעות המחייבות התיחסות מיוחדת:

פנה מיד לרופא או לחדר מין אם אתה חש אחת מן התופעות הלואוי החמורות הבאות:

- **זיהומיים חמוריים** יכולים להופיע במהלך הטיפול באקלקוונס טబליות ועלולים להוביל למות. יתכן והרופא המטפל ירשום לך תרופות מסוימות אם הרו בסיכון מוגבר ללקות בזיהום. יידע את הרופא מיד אם יש לך סימנים או תסמינים של זיהום כולל חום, צמרמות או תסמים דמוני שפעת.
- **בעיות דימום** יכולות להופיע במהלך הטיפול באקלקוונס טబליות. בעיות הדימום יכולות להיות חמורות ולהוביל למות. הסיכון של דימום עלול לעלות אם הנר נוטל גם תרופות לדילול דם. יידע את הרופא אם יש לך כל סימן או תסמין של דימום, הכולל:
 - דם בצואה או צואה שחורה (נראת כזפת)
 - שתן בצעע ורוד או חום
 - דימום לא צפוי, דימום רציני או דימום שאינו יכול לשלווט בו
 - הקאת דם או קיא שנראה כמו גרגירי קפה
 - שימוש עם דם או עם קרישי דם
 - סחרחות
 - חולשה
 - בלבול
 - שינוי בדיבור
 - כאב ראש הנמשך זמן רב
 - חבלות עוריות, או כתמי עור אדומים או סגולים
- **ירידה בספירת الدم** (ירידה במספר תאי דם לבנים, טסיות ותאי דם אדומים). ירידה בספירת דם יכולהSCI להיגרם במהלך הטיפול באקלקוונס טబליות, אך יכולה להיות חמורה. הרופא שלך יבצע בדיקות דם על מנת לבדוק את ספירת הדם שלך באופן קבוע במהלך הטיפול באקלקוונס טబליות.
- **גידול סרטני ראשוני נוספים.** גידולים סרטניים חדשיםอาจירעו במטופלים במהלך הטיפול באקלקוונס טబליות, כולל סרטן של העור או של איברים אחרים. הרופא יבצע בדיקה לסרטן עור במהלך הטיפול באקלקוונס טబליות. יש להשתמש בקרם הגנה בעת החשיפה לאור השמש.

- **הפרעות בקצב הלב** אירעו לאנשים שטופלו באALKONOS טבליות, ועלוות להיות חמורות או לגרום למוות.
 - יש לידע את הרופא אם מופיע כל אחד מהסימנים או התסמינים הבאים:
 - קצב הלב שלך מהיר או לא סדר
 - סחרחות
 - עילפון
 - קוצר נשימה
 - תחושת אי נוחות בחזה
- **בעיות בכבד** יכולות להתרחש במהלך הטיפול באALKONOS טבליות, ועלוות להיות חמורות או מסכנות חיים או לגרום למוות. יש לפנות לרופא אם אתה חש כאבי בטן או אי נוחות בטנית, שטן בצלב כהה או הצהבה של העור שלך. הרופא המטפל ינתח לבצע בדיקות לניטור תפקודי הכבד שלך במהלך הטיפול באALKONOS טבליות.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) - תופעות שמופיעות ביותר משתמש אחד מעשרה:

- כאב ראש
- שלשול
- כאבי שרירים וכאבי מפרקים
- זיהום בדרכי הנשימה העליונות
- חבורות

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמירה, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המוקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן אתALKONOS טבליות?

- מניע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
- אין לשמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל -30°C .

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעילALKONOS טבליות מכילה גם:
טבלייה:

mannitol, microcrystalline cellulose, low-substituted hydroxypropyl cellulose and sodium stearyl fumarate.

ציפוי הטבלייה:

hypromellose, copovidone, titanium dioxide, macrogol 3350, medium-chain triglycerides, iron oxide yellow, iron oxide red.

האריזה מכילה 60 טבליות באריזת בליסטר.
טבליתKalokonos טבליות 100 מ"ג - מצופה, כתומה, אובלית, קמורה משני הצדדים, בצד אחד הבלטה של
"ACA 100mg", ובצד השני חלקה.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות: 99-37586-50-176

יצרן: אסטרזהזיניקה AB, סודרטליה, שוודיה.

בעל הרישום והיבואן: אסטרזהזיניקה (ישראל) בע"מ, רח' עתיר ידע 1, כפר סבא 4464301.

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בספטמבר 2024.