

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טריטיקו 50 מ"ג

טריטיקו 100 מ"ג

טבליות מצופות

החומר הפעיל:

כל טבליה מצופה של טריטיקו 50 מ"ג מכילה:

Trazodone hydrochloride 50 mg ששקול ל- Trazodone 45.5 mg

כל טבליה מצופה של טריטיקו 100 מ"ג מכילה:

Trazodone hydrochloride 100 mg ששקול ל- Trazodone 91.1 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופות נוגדות דכאון (Anti Depressants) מעלות את הסיכון להתנהגות ומחשבות אובדניות בילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים.
עם תחילת הטיפול בתרופה, על מטופלים בכל הגילאים וקרוביהם, לעקוב אחר שינויים התנהגותיים כגון: החמרת הדיכאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות וכדומה.
במידה וחלים שינויים כגון אלה, יש לפנות מיד לרופא.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול במצבי דיכאון, עם או ללא חרדה.

קבוצה תרפויטית: נוגדי דיכאון.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל Trazodone hydrochloride או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה תרופה זו (ראה סעיף 6, "מידע נוסף").
-אתה צורך כמויות גדולות של אלכוהול.
- אתה צורך כמויות גדולות של תרופות שינה (hypnotics).
- עברת לאחרונה התקף לב.
- אין להשתמש בתרופה בילדים ומתבגרים. ראה סעיף 'ילדים ומתבגרים'.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

אין להחליף בתכשיר אחר המכיל Trazodone (החומר הפעיל בתכשיר) אלא ביעוץ רפואי ומעקב.

שוחח עם הרופא שלך או הרוקח לפני ובמהלך נטילת טריטיקו.

במיוחד ספר לרופא אם:

- אתה או המטפל שלך מבחינים בשינוי או החמרה בדיכאון שלך, או בהתנהגותך הרגילה, או אם יש לך מחשבות אובדניות. אם זה קורה, פנה **מיד** לרופא.
- יש לך או היו לך אי פעם התקפים או פרכוסים (**אפילפסיה**), במקרה זה, הרופא שלך ימנע מעליה או ירידה פתאומית במינון.
- יש לך **תפקוד כבד לקוי**, במיוחד אם הוא חמור (אי ספיקת כבד).
- יש לך **תפקוד כליות לקוי**, במיוחד אם הוא חמור (אי ספיקת כליות).
- יש לך **הפרעות לב או בכלי הדם**, כגון כאבים בחזה (אנגינה פקטוריס), הפרעות במערכת ההולכה החשמלית של הלב או שעברת לאחרונה התקף לב. ראה גם סעיף 'אין להשתמש בתרופה אם'.
- יש לך **היפרתירואידיזם** (פעילות יתר של בלוטת התריס).
- יש לך **קושי במתן שתן**, כמו במקרה של היפרטרופיה של הערמונית (ערמונית מוגדלת).
- יש לך **גלאוקומה** צרת זווית חריפה (לחץ מוגבר בעין).
- אתה **סובל מסכיזופרניה או כל הפרעה נפשית אחרת**, כיוון ששימוש בטריטיקו עלול להחמיר את ההפרעות הללו, למשל הגברת מחשבות פרנואידיות (להאמין שמהשו הוא אמיתי או נכון כאשר הוא לא). ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי אפשריות".
- יש לך **כאב גרון וחום**. במקרה זה, הרופא שלך עשוי ליעץ לך לבצע בדיקת דם מכיוון שאלו יכולים להיות תסמינים של הפרעת דם (אגרנולוציטוזיס).
- הינך חש **לא בטוב או בעלפון** (במיוחד כשאתה קם מהמיטה או נעמד ממצב ישיבה), מכיוון שזה יכול להיות סימן ללחץ דם נמוך.
- אתה זכר ויש לך **זקפה ממושכת וכואבת**. אם זה קורה, הפסק את הטיפול מיד.

מטופלים מעל גיל 65 שנים

השתמש בתרופה זו בזהירות, מכיוון שאתה עשוי להיות בעל סיכוי גבוה יותר לחוות תופעות לוואי, למשל ירידה בלחץ הדם כשאתה נעמד (תת לחץ דם אורתוסטטי) או ישנוניות. ספר לרופא שלך אם אתה או המטפל שלך מבחינים בתופעות הלוואי הללו. הם יבצעו מעקב מקרוב אחריך, במיוחד בתחילת הטיפול ולפני ובמהלך העלאות מינון. ספר לרופא שלך אם יש לך מחלות כלשהן או אם הנך נוטל תרופות אחרות (ראה סעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות"). הרופא ינקוט את אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע עלייה בתופעות הלוואי.

הפרעה לבדיקות שתן

אם במהלך הטיפול בטריטיקו אתה עובר בדיקת שתן לאיתור סמים המשתמשת בטכניקות מיוחדות (immunoassays), אתה עלול לקבל תוצאה חיובית שגויה עבור זיהוי אמפטמינים. אם זה קורה, שוחח עם הרופא שלך ובקש בדיקה המבוססת על טכניקות אחרות.

ילדים ומתבגרים

טריטיקו אינה מיועדת לילדים או למתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

תרופות שעלולות להגביר את תופעות הלוואי האפשריות של טריטיקו

- תרופות שמשנות את אופן פעולת הכבד, כגון:
 - אריתרומיצין (אנטיביוטיקה).
 - קטוקונזול, איטראקונזול (תרופות המשמשות לטיפול בזיהומים פטרייתיים).
 - ריטונאביר, אינדינאביר (תרופות המשמשות לטיפול בזיהום HIV).
 - נפאזודון (תרופה המשמשת לטיפול בצורות שונות של דיכאון).
- הימנע מנטילת טריטיקו עם תרופות אלו. במידת הצורך, הרופא שלך יפחית את המינון של טריטיקו.
- תרופות נוגדות דיכאון טריציקליות (תרופות המשמשות לטיפול בדיכאון). הימנע מנטילת תרופות אלו ביחד עם טרזודון.
- פלאוקסטין (תרופה המשמשת לטיפול בחרדה ודיכאון).
- תרופות נירולפטיות (תרופות המשמשות לטיפול בהפרעות נפשיות כגון סכיזופרניה).
- פנותיאזינים (תרופות המשמשות לטיפול בהפרעות נפשיות כגון סכיזופרניה), כגון כלורפרומאזין, פלופנזין, לבומפרומאזין, פרפנזין.
- תרופות העלולות להאריך את מרווח ה QT (תרופות הגורמות לשינויים באלקטרוקרדיוגרמה).
- תכשירים המכילים פרע מחורר (Hypericum perforatum) (סנט ג'ון וורט, צמח המשמש כנוגד דיכאון).

תרופות המפחיתות את ההשפעה של טריטיקו

- אמצעי מניעה במתן פומי (גלולות למניעת הריון).
- פניטואין (תרופה המשמשת לטיפול באפילפסיה).
- קרבתמפין (תרופה המשמשת לטיפול באפילפסיה). הרופא שלך יבצע מעקב אחר כך כדי לקבוע אם יש להעלות את המינון של טריטיקו.
- ברביטורטים תרופות המשמשות כתרופות סדציה (הרגעה), הרדמה, תרופות אנטי-אפילפטיות, היפנוטיות (תרופות לשינה).

תרופות המגבירות את ההשפעה של טריטיקו

- סימטידין (תרופה המשמשת לטיפול בכיב קיבה).

תרופות אחרות היוצרות אינטראקציה עם טריטיקו

- תרופות אנטי-פסיכיות (תרופות המשמשות לטיפול במחלות נפש מסוימות), תרופות היפנוטיות (תרופות לשינה), תרופות סדטיביות (תרופות הרגעה), תרופות אנקסיוליטיות (תרופות לטיפול בחרדה) ואנטי-היסטמינים (תרופות המשמשות לטיפול באלרגיות), שכן השפעתן הסדטיבית עשויה להיות מוגברת (ירידה בערנות). במקרה זה, הרופא שלך עשוי להפחית את המינון של תרופות אלו.
- MAOI's: מעכבי מונואמין אוקסידאז (תרופות המשמשות לטיפול בחרדה ודיכאון). אין ליטול טרזודון ביחד עם MAOI's או בשבועיים שלאחר הפסקת הטיפול עם MAOI's. כמו כן, אין להשתמש ב MAOI's בשבוע שלאחר הפסקת הטיפול בטרזודון.
- חומרי הרדמה. אם אתה צריך לעבור ניתוח המצריך שימוש בחומרי הרדמה בשאיפה, ספר לרופא המרדים שאתה נוטל טריטיקו.
- טריטיקו עשוי להגביר את השפעת חומר ההרדמה.

- מרפי שרירים (תרופות הגורמות להרפיית שרירים). אם אתה צריך לעבור ניתוח הדורש שימוש בתרופות מרפות שרירים, ספר לרופא המרדים שאתה נוטל טריטיקו.
- טריטיקו עשוי להגביר את ההשפעה של תרופות אלו.
- לבדופה (תרופה המשמשת לטיפול במחלת פרקינסון), מכיוון שההשפעה של לבדופה עלולה לרדת.
- קלונדין (תרופה המשמשת להורדת לחץ דם גבוה) שכן טרזודון יכול להפחית את ההשפעה של קלונדין.
- תרופות נוגדות קרישה ו/או נוגדות טסיות (משמשות לדילול הדם): ייתכן שינוי בקרישתיות הדם עם סיכון לדימום.
- תרופות אנטי-היפרטנסיביות (תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה), מכיוון שהרופא עשוי להפחית את מינון התרופה להורדת לחץ הדם במידת הצורך.
- דיגוקסין (תרופה המשמשת לטיפול בבעיות לב).

שימוש בתרופה ומזון

במידה ומתאפשר, יש ליטול את הטבליות על קיבה מלאה. נטילת טריטיקו לאחר ארוחות מפחית את הסיכוי להופעת תופעות לוואי.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אל תיקח טריטיקו אם אתה צורך כמויות גדולות של אלכוהול (ראה סעיף 2 " אין להשתמש בתרופה אם"). טריטיקו מגביר את ההשפעות הסדטיביות (ירידה בערנות) של אלכוהול. לכן עליך להימנע משתיית אלכוהול במהלך הטיפול בטריטיקו.

הריון, הנקה ופוריות

המידע אודות נטילת טריטיקו במהלך הריון מוגבל. אם הנך בהריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהריון או מתכננת הריון, היוועצי עם הרופא או הרוקח שלך בטרם נטילת התרופה. יש ליטול טריטיקו במהלך הריון או הנקה רק במקרה של צורך אמיתי ותחת השגחה צמודה של הרופא המטפל. במידה והרופא מחליט על נטילת התרופה עד הלידה יש לעקוב אחר היילוד כדי לנטר תסמיני גמילה.

נהיגה ושימוש במכונות

לטריטיקו יש השפעה קלה או מתונה על היכולת לנהוג ולהשתמש במכונות. לכן, היזהר במיוחד אם אתה צריך לנהוג או להשתמש במכונות. אל תנהג או תשתמש במכונות אם אתה חווה תופעות לוואי כלשהן כגון ישנוניות, סדציה (ירידה בערנות), סחרחורת, בלבול או טשטוש ראייה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

טריטיקו 50 מ"ג טבליות מצופות וטריטיקו 100 מ"ג טבליות מצופות מכילות:
לקטוז - אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, היוועץ עם הרופא בטרם נטילת תרופה זו.

שמן קיק (Castor oil) - עלול לגרום לקלקול קיבה ושלשולים.
נתרן - תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בטבליה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

טריטיקו 50 מ"ג טבליה מצופה מכילה גם (E110) Sunset yellow:
E110 Sunset yellow: עלול לגרום לתגובות אלרגיות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מבוגרים

- המינון ההתחלתי נע בין 75 מ"ג (טבליה וחצי של טריטיקו 50 מ"ג) לבין 150 מ"ג (3 טבליות של טריטיקו 50 מ"ג או טבליה וחצי של טריטיקו 100 מ"ג) ליום, לנטילה במנות מחולקות.
- במהלך הטיפול, הרופא שלך עשוי להעלות את המינון עד ל-300 מ"ג (6 טבליות של טריטיקו 50 מ"ג או 3 טבליות של טריטיקו 100 מ"ג) ליום, לנטילה במנות מחולקות. במטופל מאושפז, ניתן להעלות את המינון לעד 600 מ"ג ביום.

מטופלים מעל גיל 65 שנים

הרופא שלך יתאים את המינון בהתאם למצבך הבריאותי הכולל ולסבילותך לתרופה. באופן כללי, המינון ההתחלתי המומלץ הוא של 100 מ"ג ליום, במנות מחולקות או במנה בודדת, לנטילה בלילה. יש להימנע ממנות של יותר מ-100 מ"ג בפעם בודדת במטופלים אלה. סביר להניח שלא יהיה צורך במינונים של מעל ל-300 מ"ג ביום.

אופן הנטילה

במידה ומתאפשר, יש ליטול את הטבליות על קיבה מלאה. נטילת טריטיקו לאחר ארוחות מפחיתה הופעת תופעות הלוואי. את מנת הלילה יש ליטול לפני השינה. ניתן לחצות את הטבליה לשני חצאים שווים. זה מאפשר לחלק מנות במהלך היום על פי הוראות הרופא שלך. אין ללעוס או לכתוש את הטבליות – משום היותן מצופות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

יש ליטול תכשיר זה למשך הזמן המומלץ על ידי הרופא שלך.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

במקרה של נטילה בטעות או נטילת יתר של טריטיקו, יש ליצור קשר מידי עם הרופא או לגשת לבית החולים הקרוב. יש לקחת עימך עלון זה.

אם נטלת מנת יתר של תרופה זו, התופעות הבאות עלולות להופיע:

- ישנוניות
- סחרחורת
- בחילה
- הקאה

במקרים החמורים יותר, התופעות הבאות עלולות להופיע:

- תרדמת
- טכיקרדיה (האצת קצב הלב)
- תת לחץ דם (לחץ דם נמוך)
- היפונתרמיה (ירידה ברמות הנתרן בדם הגורמת לתחושת חולי כללית)
- פרכוסים
- קושי חמור בנשימה
- הפרעות לב הכוללות ברדיקרדיה (ירידה בקצב הלב), אריתמיה (הפרעות בקצב הלב).

הרופא יחליט על הטיפול התומך המתאים ביותר, בהתאם לסוג ולחומרת התופעות.

הסימפטומים עלולים להופיע תוך 24 שעות או יותר לאחר מנת היתר.

אם שכחת ליטול את התרופה

אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא שלך.

אם אתה מפסיק ליטול את התרופה

אין להפסיק את נטילת התרופה בפתאומיות, במיוחד בטיפול ממושך. יש להפסיק את הטיפול בתרופה זו בהדרגה ובפיקוח רפואי, כדי למזער הופעת תסמיני גמילה כגון בחילות, כאבי ראש ותחושת חולי.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטריטיקו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

אם אחת מתופעות הלוואי הבאות מתרחשות או אם המטפל שלך הבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות, יש להפסיק את הטיפול בתרופה זו ולפנות מייד לרופא:

- צהבת (הצהבה של העור והאזור הלבן בעיניים).
- החמרה של הדיכאון המאופיינת בהתנהגות מאנית (התנהגות ו/או מחשבות אובססיביות).
- פריאפיזם (זקפה חריגה שאינה נעלמת).

אם אחת מתופעות הלוואי הבאות מתרחשות או אם המטפל שלך הבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות, יש ליצור קשר מידי עם הרופא:

- מחשבות אובדניות או התנהגות אובדנית או כל שינוי אחר בהתנהגות. תסמינים אלה עלולים להופיע גם במהלך הטיפול וגם בשלבים המוקדמים לאחר הפסקת הטיפול. לכן הרופא שלך יבצע מעקב אחר תופעות אלה.

בנוסף, תופעות הלוואי הבאות עשויות להופיע בתדירות שאינה ידועה:

תופעות לוואי נוספות ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- אגרנולוציטוזיס/ לויקופניה (ירידה בספירת תאי הדם הלבנים)
- אאוזינופיליה (עליה בספירת תאי הדם הלבנים)
- טרומבוציטופניה (ירידה בספירת טסיות הדם)
- אנמיה (ירידה בהמוגלובין-חומר האחראי על נשיאת החמצן בדם)
- תגובות אלרגיות
- תסמונת הפרשה הלא תואמת של הורמון ADH (מחלה המאופיינת בירידה ברמות הנתרן בדם)
- ירידה ברמות הנתרן בדם
- ירידה במשקל, איבוד תיאבון עם ירידה חמורה במשקל, תיאבון מוגבר
- בלבול, אינסומניה (נדודי שינה), חוסר התמצאות, חרדה, עצבנות ואי שקט (אגיטציה) (העלולה לעיתים להחמיר לדליריום (מצב בלבול חריף))
- דליריום (מצב בלבול חריף), אגרסיביות, הזיות (לראות דברים שלא באמת קיימים), סיוטי לילה
- ירידה בחשק המיני
- תסמונת גמילה (הופעת תסמיני גמילה עם תסמינים כמו בחילה, כאב ראש, תחושת חולי)
- תסמונת סרוטונין (מחלה המאופיינת בהשפעה מוגברת של החומר סרוטונין, הגורמת למספר תופעות כגון כאב ראש, אי שקט (אגיטציה), בלבול, הזיות ותרדמת).
- פרכוסים
- תסמונת נוירולפטית ממארת (מחלה חמורה של מערכת העצבים)
- סחרחורת, ורטיגו, כאב ראש
- ישנוניות, אי שקט, ירידה בערנות
- רעד
- טשטוש ראייה
- הפרעות בזיכרון
- התכווצויות שרירים (מיוקלונוס)
- הפרעות בדיבור (אפזיה אקספרסיבית)
- שינויים בתחושתיות (נימול)
- שינויים בטונוס השרירים (דיסטוניה)
- שינויים בחוש הטעם
- אריתמיה לבבית (הפרעות בקצב הלב), ברדיקרדיה (ירידת בקצב הלב), טכיקרדיה (עליה בקצב הלב), שינויים באלקטרוקארדיוגרמה.
- תת לחץ דם (לחץ דם נמוך), כולל תת לחץ דם אורתוסטטי (ירידה חריפה בלחץ הדם במעבר לעמידה)
- סינקופה (עלפון)
- יתר לחץ דם (לחץ דם גבוה)
- גודש באף (אף סתום), דיספניאה (קשיי נשימה)
- בחילה, הקאה, יובש בפה, עצירות, שלשול, בעיות בעיכול, כאבי בטן, גסטרואינטריטיס (דלקת המערכת את הקיבה והחלק העליון של המעינים), ריור יתר, חסימת מעיים שיתוקית
- שינויים בתפקודי כבד (כולל נזק לכבד ועימרון מרה (כולסטזיס))

- פריחה, גירוד, הזעת יתר (היפרהידרוזיס)
- כאב זרועות ורגליים, כאב גב, מיאלגיה (כאבי שרירים), ארתרלגיה (כאבי פרקים)
- קושי במתן שתן, בריחת שתן (איבוד שתן) או אצירת שתן (חוסר יכולת במתן שתן).
- חולשה, בצקת (התנפחות בעקבות אגירת נוזלים), תסמינים דמויי שפעת, תשישות, כאבי חזה, חום
- עליה באנזימי הכבד (חומרים הנמצאים בכבד, כאשר מספרם עולה, מצביע על קיום נזק לכבד).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה לאחר תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: תכשיר זה אינו מצריך תנאי אחסון מיוחדים, אך מומלץ לאחסן בטמפרטורת החדר.
- אין לזרוק תרופה זו למי השפכים או לפח האשפה הביתי. שאל את הרוקח שלך כיצד להיפטר מתרופה בה אין לך צורך יותר. הדבר יעזור להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:
טריטיקו 50 מ"ג, טבליות מצופות מכילות:

Lactose monohydrate, Calcium hydrogen phosphate *2H₂O, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Sodium starch glycolate type A, Povidone, Magnesium stearate, Ethylcellulose, Sunset yellow (E110) Lake, Castor oil (virgin), E wax, Talc.

טריטיקו 100 מ"ג, טבליות מצופות מכילות:

Lactose monohydrate, Calcium hydrogen phosphate *2H₂O, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Sodium starch glycolate type A, Povidone, Magnesium stearate, Ethylcellulose, Talc, Castor oil (virgin), E wax.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליות טריטיקו 50 מ"ג

טבליית טריטיקו 50 מ"ג היא טבליה מצופה בצבע כתום-צהוב בהיר, עגולה, חלקה, מבריקה, קמורה משני צידיה ובעלת קו חציה (בצד אחד) המאפשר חציה.

טבליות טריטיקו 100 מ"ג

טבליית טריטיקו 100 מ"ג היא טבליה מצופה בצבע לבן עד קרמי, עגולה, חלקה, מבריקה, קמורה משני צידיה ובעלת קו חציה (בצד אחד) המאפשר חציה.

הטבליות ארוזות במגשיות (בליסטרים) באריזות של 30 טבליות (2 בליסטרים של 15 טבליות, במינון של 50 מ"ג או במינון של 100 מ"ג).

שם בעל הרישום והיבואן וכתובתו:

רז רוקחות בע"מ, רחוב גשר העץ 31, פארק תעשיות עמק חפר, ישראל

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

TRITTICO 50 MG: 173-30-36297-00

TRITTICO 100 MG: 173-31-36296-00

עלון זה נערך ביולי 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

RAZP3612/29-02