

إذا توقفت عن تناول الدواء

عليك مواصلة تناول الدواء لطالما يريشدك الطبيب بتناوله. لا تتوقف بشكل مفاجئ عن تناول واكبيس من تلقاء نفسك. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال واكبيس قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تظهر لدى أكثر من واحد من بين 10 متعالجين):

النوم الإنتيابي مع أو بدون مرض الجمدة	إنقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم
	- صداع

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى حتى واحد من بين 10 متعالجين):

النوم الإنتيابي مع أو بدون مرض الجمدة	إنقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم
- صعوبات في النوم، قلق، عصبية، إكتئاب، مشاكل في النوم - صداع، الشعور بـ "دوار" (فيرتيغو)، إضطرابات في التوازن، إرتجاج - غثيان، تقيؤ، إضطرابات هضمية - إرهاق (إنهاك)	- صعوبات في النوم، مشاكل في النوم، قلق - الشعور بـ "دوار" (فيرتيغو) - إرتفاع ضغط الدم - غثيان، الشعور بإنزعاج في البطن، إسهال - ألم وعدم الراحة

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى حتى واحد من بين 100 متعالجين):

النوم الإنتيابي مع أو بدون مرض الجمدة	إنقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم
- تعرق - قلة أو زيادة الشهية للطعام - وذمة - عصبية، إنتفاض، سماع أو رؤية أشياء غير موجودة في الواقع - تبدل المشاعر - أحلام غير عادية - توتر - صعوبات النوم في بداية، منتصف أو نهاية الليل، صعوبة مواصلة النوم، ميل مبالغ فيه للنوم، نعاس - حالة من الإترزان النفسي وقلة الإحساس - كوابيس ليلية - الشعور بعدم هدوء وعدم القدرة على الجلوس بسكون - رد فعل من الذعر (Panic) - أفكار إنتحارية - إهتمام زائد أو مختلف بالجنس - حدث مفاجئ وعابر لضعف العضلات، تشنجات عضلية خارجة عن السيطرة أو حركات لرجل واحدة - إضطراب في الإصغاء - شقيقة - صرع (Epilepsy) - ضعف - إضطرابات في الحركة، حركات بطيئة للجسم - الشعور بوخز، دغدغة، وخز أو حرق في الجلد - حوادث مفاجئة وغير متوقعة من الحركة وإنعدام الحركة - الشعور بعدم ثبات - إنخفاض في حدة الرؤية، تقلصات شاذة أو ترمش الجفن - سماع أصوات عندما لا يكون هناك صوت خارجي في الواقع - نبض غير منتظم، نظم قلب سريع أو بطيء، إرتفاع أو إنخفاض ضغط الدم، هبات من الحر - تتأؤب - جفاف في الفم - إسهال، ألم في البطن، الشعور بإنزعاج في البطن، إمساك، حرقان، آلام وإنزعاج في منطقة المعدة، إلتهاب المعدة، فرط حموضة في الجهاز الهضمي - وخز، إحمرار غير إعتيادي للأنف والخدين، فرط تعرق - آلام في المفاصل، آلام في الظهر، تصلب العضلات، ضعف عضلي، آلام في العضلات والعظام، آلام في أصابع اليدين والرجلين - تبؤل غير إعتيادي - نزف رحمي غير منتظم - قلة قوة أو إرهاق شديد، آلام في الصدر، ضعف، ودمات - زيادة في الوزن، إنخفاض في الوزن، شذوذ في تخطيط نشاط القلب (ECG)، نتائج شاذة في فحوص الدم المرتبطة بوظائف الكبد	- تلوث فيروسي في الطرق التنفسية العلوية (رشح)، قروح البرد - تغيير في فحوص النزف، نتائج شاذة في قيم فحوص الدم المرتبطة بوظائف الكبد، إرتفاع ضغط الدم، زيادة في نسب الكولسترول في الدم - عدم تحمل الكحول، زيادة الشهية للطعام، إنخفاض السكر في الدم، تغيرات في وزن الجسم - التهيج، حالات إرتباك، خوف، رد فعل من الذعر (Panic)، إهتمام زائد أو مختلف بالجنس، إكتئاب، عصبية - فقدان التوازن، مشاكل في توقيت النوم، تضرر حاسة التذوق، أحداث مفاجئة وغير متوقعة في الحركة وإنعدام الحركة، شقيقة، شلل النوم، فقدان القدرة على القيام بأعمال جسدية - جفاف في العين، ومضات أو ظهور بقع سوداء في الرؤية - طنين أو رنين في الأذن - عدم إنتظام النبض، ضربات القلب (خفقان)، نظم قلب سريع، نظم قلب شاذ - هبات من الحر - تتأؤب، سعال، صعوبات في التنفس ليلاً - إمساك، جفاف في الفم، مشاكل في الجهاز الهضمي، إلتهاب في الجهاز الهضمي، تغير في لون البراز، رائحة هواء الزفير، غازات، نزف من الشرج، زيادة إفراز اللعاب - طفح، حكة في الوجه، إحمرار في الجلد، تعرق بارد، تعرق مفرد، تعرق ليلي، حساسية متزايدة شاذة لضوء الشمس - إنزعاج في الذراعين والرجلين، تشنجات عضلية، آلام في العضلات، آلام في المفاصل، آلام في الأوتار - تكرار التبول - إرهاق (إنهاك)، شعور بالحرارة، عطش

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى حتى واحد من بين 1,000 متعالج):

النوم الإنتيابي مع أو بدون مرض الجمدة	إنقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم
- فقدان الشهية للطعام، زيادة الشهية للطعام - سلوك شاذ، حالات إرتباك، مزاج إكتيابي، إنفعال مفرد، الشعور بإنزعاج إنفعالي ونفسي، الشعور بسماع ورؤية أشياء غير موجودة في الواقع خلال النوم - فقدان الوعي، صداع ناتج عن التوتر، إضطرابات في الذاكرة، جودة متدنية للنوم - شعور بإنزعاج في البطن، صعوبات أو ألم في البلع، غازات، إلتهاب في الجهاز الهضمي - تلوثات في الجلد، حساسية زائدة وشاذة لضوء الشمس - آلام في الرقبة، آلام في الصدر - إجهاض تلقائي - ألم، تعرق ليلي، شعور بإحباط - نسب مرتفعة من إنزيم كيرياتينين فوسفوكيناز في الدم، حالة جسدية عامة شاذة، تغيرات في تخطيط النشاط الكهربائي للقلب (ECG)	

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين:

لا يجوز التخزين فوق 30 درجة مئوية. بعد الفتح للمرة الأولى بالإمكان الإستعمال لمدة 40 يوماً، بدرجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية.

لا يجوز إلقاء الأدوية في القمامة المنزلية أو في المجاري. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

microcrystalline cellulose, crospovidone, talc, Opadry II HP85F18422 white (containing polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 3350, talc), magnesium stearate, colloidal anhydrous silica.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

واكبيس 4.5 ملغ عبارة عن قرص أبيض، مستدير، مطلي، قطره 3.7 ملم، محدب من كلا الجانبين معلم بالرقم "5" في جانب واحد.

واكبيس 18 ملغ عبارة عن قرص أبيض، مستدير، مطلي، قطره 7.5 ملم، محدب من كلا الجانبين معلم بالرقم "20" في جانب واحد.

يتوفر واكبيس ضمن قناني صغيرة تحتوي على 30 قرصاً وماص للرطوبة.

صاحب الإمتياز وعنوانه: ترومدم.ض.، شارع بني چاؤون 10، نتانيا 4250499.

إسم المنتج وعنوانه: بيوپروجت فارما باريس، فرنسا.

تمت المصادقة على هذه النشرة من قبل وزارة الصحة في كانون الأول 2022.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

واكبيس 4.5 ملغ 164-01-36119

واكبيس 18 ملغ 164-02-36120

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.