

# وايكس 4.5 ملغ، وايكس 18 ملغ

## أقراص مطلية

**المادة الفعالة وكميتها:**

**وايكس 4.5 ملغ**

يحتوي كل قرص على بيتوليسنت هيدروكلوريد، الذي يساوي بالقيمة لـ 4.45 ملغ بيتوليسنت (Pitolisant).

**وايكس 18 ملغ**

يحتوي كل قرص على بيتوليسنت هيدروكلوريد، الذي يساوي بالقيمة لـ 17.8 ملغ بيتوليسنت (Pitolisant).

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أجلي. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

### 1) لأي غرض مخصص الدواء؟

وايكس مخصص:

● لعلاج الكبار الذين لديهم النوم الإنتيابي مع أو بدون مرض الجُمدة.

● لتحسين اليقظة وتقليل النعاس المفرط خلال ساعات النهار (excessive daytime sleepiness). لدى الكبار الذين لديهم إنقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم (obstructive sleep apnoea) الذين لم يتم علاج النعاس المفرط خلال ساعات النهار بشكل مُرضٍ بمساعدة العلاج الأولي لإنقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، مثل جهاز CPAP (ضغط هواء إيجابي متواصل للطرق التنفسية)، أو تم إظهار عدم تحمل لهذا العلاج.

**الفصيلة العلاجية:** أدوية أخرى للجهاز العصبي.

● **النوم الإنتيابي** عبارة عن حالة التي تؤدي إلى فرط الميل للنوم خلال ساعات النهار وميل للنوم بشكل مفاجئ في حالات غير مناسبة (نوبات النوم).

**مرض الجمدة** عبارة عن ضعف عضلي أو شلل مفاجئين بدون فقدان للوعي، كإستجابة لإنفعال مفاجئ، مثل غضب، خوف، فرح، ضحك أو مفاجأة.

● **إنقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم** عبارة عن حالة تؤدي إلى توقف التنفس لمدة 10 ثوانٍ على الأقل أثناء النوم. يمكن أن يؤدي هذا إلى فرط الميل للنوم خلال ساعات النهار والميل للنوم بشكل مفاجئ في حالات غير مناسبة (نوبات النوم).

### كيف يعمل وايكس

المركب الفعال، بيتوليسنت، يرتبط بالمستقبلات التي على خلايا الدماغ الضالعة بتنشيط اليقظة. هذا الأمر يساعد في تقليل الميل إلى النوم خلال ساعات النهار، الإرهاق، ومرض الجمدة ويحث على اليقظة.

### 2) قبل إستعمال الدواء

**لا يجوز إستعمال الدواء إذا:**

- كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة، بيتوليسنت، أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر قائمة المواد غير الفعالة في الفقرة 6).
- كنت تعاني من إضطراب خطير في الأداء الوظيفي الكبدي، لأن بيتوليسنت يتفكك في الكبد وقد تتراكم نسب أكبر مما ينبغي لدى متعالجين لديهم إضطراب خطير في الأداء الوظيفي الكبدي.
- كنت مرضعة.

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء**

**قبل العلاج بـ وايكس، إحك للطبيب إذا**

- عانيت من قلق أو إكتئاب يترافق بأفكار إنتحارية.

- كنت تعاني من إضطرابات في الأداء الوظيفي الكبدي، لأنه من الجائز أن يتطلب الأمر ملاءمة للمقدار الدوائي.

- كنت تعاني من قرحة معدية أو كنت تتناول أدوية يمكن أن تؤدي إلى تهيج المعدة، مثل أدوية مضادة للإلتهاب، لأنه بُلغ عن ردود فعل للمعدة بخصوص وايكس.

- كنت تعاني من مشاكل قلبية. يحتاج الطبيب إلى مراقبة الأداء الوظيفي للقلب بشكل منتظم لطالما كنت تتناول وايكس.

- كنت تعاني من مرض صرع (epilepsy) شديد.

*للمتعالجين الذين يتلقون الدواء للنوم الإنتيابي مع أو بدون مرض الجمدة فقط*

- كنت تعاني من إضطرابات في الأداء الكلوي، لأنه من الجائز أن يتطلب الأمر ملاءمة للمقدار الدوائي.

- كنت تعاني من سمنة مفرطة قصوى أو من القهم (فقدان الشهية للطعام)، لأن وزنك قد يتغير (يزداد أو ينقص) خلال فترة العلاج بـ وايكس.

- بُلغ بعض المتعالجين بـ وايكس، الذين يعانون من سابقة لإضطرابات نفسية، عن وجود أفكار إنتحارية خلال العلاج. أطلع الطبيب فوراً إذا كنت تشعر أنك مكتئب أو لديك أفكار إنتحارية (أنظر الفقرة 4). فكر في الطلب من قريب عائلي أو صديق مقرب لمساعدك في تشخيص علامات إكتئاب أو تغيرات أخرى في سلوكك.

*للمتعالجين الذين يتلقون الدواء لإنقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم فقط*

- كنت تعاني من زيادة أو نقص ملحوظين في الوزن، لأن وزنك قد يزداد أو ينقص أثناء العلاج بـ وايكس.

### الأطفال والمراهقون

وايكس غير مخصص للأطفال أو للمراهقين دون عمر 18 سنة. لا تتوفر معلومات حول سلامة ونجاعة إستعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

### التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

● مضادات إكتئاب مثل كلوميبرامين، دولوكسيتين، فلوأوكسيتين، إيميبرامين، ميرتازابين، پاروكسيتين وفينلافكسين

● بوبروبيون، دواء مضاد للإكتئاب أو للمساعدة على الإقلاع عن التدخين

● أدوية لعلاج الحساسية المُسماة مضادات الهيستامين، مثل فينييرامين ماليات، كلورفينيرامين، ديفينهيدرامين، بروميتازين، ميبيرامين، دوكسيلامين

● ريفامبيسين، مضاد حيوي يُستعمل لعلاج السل وعدد من التلوثات الإضافية

● أدوية لعلاج الصرع (لمنع الإختلاجات) مثل كاربامازيبين، فينوباربيتال وفينيتوئين

● أدوية للقلب مثل ديجوكسين وكينيدين

● سانت جون وورت (العرن المثقوب؛ *Hypericum perforatum*)، دواء نباتي مضاد للإكتئاب

● سيناكالسيت، لعلاج إضطرابات الغدة نظيرة الدرقية

● تيربينافين، لعلاج التلوثات الفطرية

● أدوية لعلاج السكري مثل ميتفورمين وريپاجلينيد

● أدوية لعلاج السرطان مثل دوسيتاكسيل، إيرينوتيكان

● سيساڤريد، لعلاج الإرتداد المعدي

● پيموزيد، لعلاج إضطرابات نفسية معينة

● هالوفانترين، لعلاج الملاريا

● إيفاقيرنز، دواء مضاد للفيروسات لعلاج الإيدز

● مورفين، لعلاج الآلام القوية

● پاراسيتامول، لعلاج الآلام

● أدوية مضادة للتخثر (مضادات التخثر؛ لمنع الخثرات الدموية) مثل دابيجاتران ووارفارين

● پروبيسيد، لعلاج النقرس

● وسائل منع الحمل الهرمونية (أدوية لمنع الحمل)، أنظري أيضاً الفقرة "الحمل، الإرضاع والخصوبة" في السياق

● أدوية مضادة للإلتهاب، ضد الآلام ولخفض السخونة، مثل حمض أسيتيل الساليسيليك (أسبيرين)، ديكلوفيناك، إيبوبروفين، ميلوكسيكام ونابروكسين

*النوم الإنتيابي مع أو بدون مرض الجمدة*

● بالإمكان إستعمال بيتوليسنت سوية مع مودافينيل أو مع صوديوم أوكسيلات.

### الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

### الحمل

لا يجوز إستعمال وايكس خلال فترة الحمل، إلا إذا أوصاك الطبيب خلاف ذلك. لا تتوفر معلومات كافية لمعرفة فيما إذا وُجدت أية خطورة تتعلق بتناول وايكس خلال فترة الحمل. يتوجب على كل امرأة إستعمال وسيلة منع حمل أثناء العلاج بـ وايكس ولمدة 21 يوماً على الأقل بعد التوقف عن العلاج. بما أن وايكس قد يقلل من نجاعة أقراص منع الحمل الهرمونية، فيجب إستعمال وسيلة بديلة ناجعة لمنع الحمل.

### الإرضاع

ينتقل وايكس إلى الحليب لدى الحيوانات. يتوجب على المتعالجات اللواتي يتناولن وايكس التوقف عن الإرضاع.

### السياقة وإستعمال الماكنت

من شأنك أن تشعر بميل إلى النوم أو أن قدرتك على التركيز قد تتضرر.

عليك توخي الحذر عند القيام بنشاطات تتطلب التركيز، مثل السياقة وتشغيل الماكنت. إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كانت حالتك تنعكس سوءاً على كفاءتك على السياقة، تحدث مع الطبيب.

### 3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قِبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

### النوم الإنتيابي مع أو بدون مرض الجمدة

عادة يتم بدء العلاج بمقدار دوائي قدره 9 ملغ مرة في اليوم، ويتم رفعه بالتدرج لمدة 3 أسابيع حتى بلوغ المقدار الدوائي المناسب. في أي وقت، بإمكان الطبيب خفض أو رفع المقدار الدوائي بحسب تأثير الدواء ومدى تحملك له.

يمكن أن تمر عدة أيام إلى أن تشعر بالفائدة التي يوفرها الدواء، ويتم عادة الشعور بالفائدة القصوى بعد عدة أسابيع.

لا يجوز تغيير المقدار الدوائي من وايكس من تلقاء نفسك. أي تغيير للمقدار الدوائي يلزم تعليمات ومتابعة من قِبل الطبيب.

بخصوص مقدار دوائي قدره 4.5 ملغ، تناول قرصاً واحداً من عيار 4.5 ملغ.

بخصوص مقدار دوائي قدره 9 ملغ، تناول قرصين من عيار 4.5 ملغ.

بخصوص مقدار دوائي قدره 18 ملغ، تناول قرصاً واحداً من عيار 18 ملغ.

بخصوص مقدار دوائي قدره 36 ملغ، تناول قرصين من عيار 18 ملغ.

### إنقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم

عادة ما يتم بدء العلاج بمقدار دوائي قدره 4.5 ملغ مرة واحدة في اليوم، ويتم رفعه بالتدرج لمدة 3 أسابيع حتى بلوغ المقدار الدوائي المناسب. في أي وقت، بإمكان الطبيب خفض أو رفع المقدار الدوائي بحسب تأثير الدواء عليك ومدى تحملك له.

المقدار الدوائي اليومي الأعظمي هو 18 ملغ.

يمكن أن تمر عدة أيام إلى أن تشعر بالفائدة التي يوفرها الدواء، ويتم عادة الشعور بالفائدة القصوى بعد عدة أسابيع.

لا يجوز تغيير المقدار الدوائي من وايكس من تلقاء نفسك. أي تغيير للمقدار الدوائي يلزم تعليمات ومتابعة من قِبل الطبيب.

بخصوص مقدار دوائي قدره 4.5 ملغ، تناول قرصاً واحداً من عيار 4.5 ملغ.

بخصوص مقدار دوائي قدره 9 ملغ، تناول قرصين من عيار 4.5 ملغ.

بخصوص مقدار دوائي قدره 18 ملغ، تناول قرصاً واحداً من عيار 18 ملغ.

يجب تناول وايكس مرة في اليوم عن طريق الفم، في الصباح مع وجبة الفطور. لا يجوز تناول وايكس بعد الظهر، لأن ذلك قد يؤدي إلى صعوبات في النوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

لا تتوفر معلومات بخصوص سحق/شطر/مضغ الأقراص.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر من وايكس

في حال تناول كمية أكبر مما ينبغي من أقراص وايكس فيجب الإتصال بغرفة الطوارئ في المستشفى الأقرب أو الإبلاغ عن ذلك فوراً للطبيب أو للصيدلي. من شأنك أن تشعر بصراع، آلام في البطن، غثيان أو عصبية وأيضاً صعوبات في النوم. عليك أخذ هذه النشرة وكافة الأقراص المتبقية معك. إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

### إذا نسيت تناول وايكس

إذا نسيت تناول الدواء، فيجب تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

#### إذا توقفت عن تناول الدواء

عليك مواصلة تناول الدواء لطالما يريشدك الطبيب بتناوله. لا تتوقف بشكل مفاجئ عن تناول واكبيس من تلقاء نفسك. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### (4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال واكبيس قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تظهر لدى أكثر من واحد من بين 10 متعالجين):

النوم الإنتيابي مع أو بدون مرض الجمدة	إنقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم
- صداع	

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى حتى واحد من بين 10 متعالجين):

النوم الإنتيابي مع أو بدون مرض الجمدة	إنقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم
- صعوبات في النوم، قلق، عصبية، إكتئاب، مشاكل في النوم - صداع، الشعور بـ "دوار" (فيرتيغو)، إضطرابات في التوازن، إرتجاج - غثيان، تقيؤ، إضطرابات هضمية - إرهاق (إنهاك)	- صعوبات في النوم، مشاكل في النوم، قلق - الشعور بـ "دوار" (فيرتيغو) - إرتفاع ضغط الدم - غثيان، الشعور بإنزعاج في البطن، إسهال - ألم وعدم الراحة

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى حتى واحد من بين 100 متعالجين):

النوم الإنتيابي مع أو بدون مرض الجمدة	إنقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم
- تعرق - قلة أو زيادة الشهية للطعام - وذمة - عصبية، إنتفاض، سماع أو رؤية أشياء غير موجودة في الواقع - تبدل المشاعر - أحلام غير عادية - توتر - صعوبات النوم في بداية، منتصف أو نهاية الليل، صعوبة مواصلة النوم، ميل مبالغ فيه للنوم، نعاس - حالة من الإتران النفسي وقلة الإحساس - كوابيس ليلية - الشعور بعدم هدوء وعدم القدرة على الجلوس بسكون - رد فعل من الذعر (Panic) - أفكار إنتحارية - إهتمام زائد أو مختلف بالجنس - حدث مفاجئ وعابر لضعف العضلات، تشنجات عضلية خارجة عن السيطرة أو حركات لرجل واحدة - إضطراب في الإصغاء - شقيقة - صرع (Epilepsy) - ضعف - إضطرابات في الحركة، حركات بطيئة للجسم - الشعور بوخز، دغدغة، وخز أو حرق في الجلد - حوادث مفاجئة وغير متوقعة من الحركة وإنعدام الحركة - الشعور بعدم ثبات - إنخفاض في حدة الرؤية، تقلصات شاذة أو ترمش الجفن - سماع أصوات عندما لا يكون هناك صوت خارجي في الواقع - نبض غير منتظم، نظم قلب سريع أو بطيء، إرتفاع أو إنخفاض ضغط الدم، هبات من الحر - تتأؤب - جفاف في الفم - إسهال، ألم في البطن، الشعور بإنزعاج في البطن، إمساك، حرقان، آلام وإنزعاج في منطقة المعدة، إلتهاب المعدة، فرط حموضة في الجهاز الهضمي - وخز، إحمرار غير إعتيادي للأنف والخدين، فرط تعرق - آلام في المفاصل، آلام في الظهر، تصلب العضلات، ضعف عضلي، آلام في العضلات والعظام، آلام في أصابع اليدين والرجلين - تبؤل غير إعتيادي - نزف رحمي غير منتظم - قلة قوة أو إرهاق شديد، آلام في الصدر، ضعف، ودمات - زيادة في الوزن، إنخفاض في الوزن، شذوذ في تخطيط نشاط القلب (ECG)، نتائج شاذة في فحوص الدم المرتبطة بوظائف الكبد	- تلوث فيروسي في الطرق التنفسية العلوية (رشح)، قروح البرد - تغيير في فحوص النزف، نتائج شاذة في قيم فحوص الدم المرتبطة بوظائف الكبد، إرتفاع ضغط الدم، زيادة في نسب الكولسترول في الدم - عدم تحمل الكحول، زيادة الشهية للطعام، إنخفاض السكر في الدم، تغيرات في وزن الجسم - التهيج، حالات إرتباك، خوف، رد فعل من الذعر (Panic)، إهتمام زائد أو مختلف بالجنس، إكتئاب، عصبية - فقدان التوازن، مشاكل في توقيت النوم، تضرر حاسة التذوق، أحداث مفاجئة وغير متوقعة في الحركة وإنعدام الحركة، شقيقة، شلل النوم، فقدان القدرة على القيام بأعمال جسدية - جفاف في العين، ومضات أو ظهور بقع سوداء في الرؤية - طنين أو رنين في الأذن - عدم إنتظام النبض، ضربات القلب (خفقان)، نظم قلب سريع، نظم قلب شاذ - هبات من الحر - تتأؤب، سعال، صعوبات في التنفس ليلاً - إمساك، جفاف في الفم، مشاكل في الجهاز الهضمي، إلتهاب في الجهاز الهضمي، تغير في لون البراز، رائحة هواء الزفير، غازات، نزف من الشرج، زيادة إفراز اللعاب - طفح، حكة في الوجه، إحمرار في الجلد، تعرق بارد، تعرق مفرد، تعرق ليلي، حساسية متزايدة شاذة لضوء الشمس - إنزعاج في الذراعين والرجلين، تشنجات عضلية، آلام في العضلات، آلام في المفاصل، آلام في الأوتار - تكرار التبول - إرهاق (إنهاك)، شعور بالحرارة، عطش

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى حتى واحد من بين 1,000 متعالج):

النوم الإنتيابي مع أو بدون مرض الجمدة	إنقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم
- فقدان الشهية للطعام، زيادة الشهية للطعام - سلوك شاذ، حالات إرتباك، مزاج إكتيابي، إنفعال مفرد، الشعور بإنزعاج إنفعالي ونفسي، الشعور بسماع ورؤية أشياء غير موجودة في الواقع خلال النوم - فقدان الوعي، صداع ناتج عن التوتر، إضطرابات في الذاكرة، جودة متدنية للنوم - شعور بإنزعاج في البطن، صعوبات أو ألم في البلع، غازات، إلتهاب في الجهاز الهضمي - تلوثات في الجلد، حساسية زائدة وشاذة لضوء الشمس - آلام في الرقبة، آلام في الصدر - إجهاض تلقائي - ألم، تعرق ليلي، شعور بإحباط - نسب مرتفعة من إنزيم كيرياتينين فوسفوكيناز في الدم، حالة جسدية عامة شاذة، تغيرات في تخطيط النشاط الكهربائي للقلب (ECG)	

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### (5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

#### ظروف التخزين:

لا يجوز التخزين فوق 30 درجة مئوية. بعد الفتح للمرة الأولى بالإمكان الإستعمال لمدة 40 يوماً، بدرجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية.

لا يجوز إلقاء الأدوية في القمامة المنزلية أو في المجاري. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

#### (6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

microcrystalline cellulose, crosopovidone, talc, Opadry II HP85F18422 white (containing polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 3350, talc), magnesium stearate, colloidal anhydrous silica.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

واكبيس 4.5 ملغ عبارة عن قرص أبيض، مستدير، مطلي، قطره 3.7 ملم، محدب من كلا الجانبين معلّم بالرقم "5" في جانب واحد.

واكبيس 18 ملغ عبارة عن قرص أبيض، مستدير، مطلي، قطره 7.5 ملم، محدب من كلا الجانبين معلّم بالرقم "20" في جانب واحد.

يتوفر واكبيس ضمن قناني صغيرة تحتوي على 30 قرصاً وماص للرطوبة.

صاحب الإمتياز وعنوانه: ترومد م.ض.، شارع بني چاؤون 10، نتانيا 4250499.

إسم المنتج وعنوانه: بيوپروجت فارما باريس، فرنسا.

تمت المصادقة على هذه النشرة من قبل وزارة الصحة في كانون الأول 2022.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

واكبيس 4.5 ملغ 164-01-36119

واكبيس 18 ملغ 164-02-36120

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.