



ספטמבר 2024

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

טרוקסימה / TRUXIMA

החומר הפעיל בתכשיר וחוזקו: Rituximab 10 mg/ml

צורת מינון ודרך מתן: Concentrate for solution for infusion , Intravenous (I.V.)

פרנציציות:

1 vial x 50 ml
2 vials x 10 ml

התכשיר Truxima הינו ביוסימילאר לתכשיר הייחוס Mabthera 10 mg/ml I.V. חברות פאdagיס שמהה להודיעו משרד הבריאות אישר את התחליפיות של תכשיר הביאויסימילאר Truxima. התחליפיות של התכשיר Truxima מתאפשרה במסגרת התוויות המאושרות לתכשיר הביוסימילאר ובהתאם לפרצנטציות התכשיר הרשומות בישראל.

כמו כן, חברת פאdagיס ישראל סוכניות בע"מ מבקשת להודיע על עדכוני שבוצעו בעלון לרופא של התכשיר Truxima שהוותם עדכוני נסוח בהתאם לעלון האסמכתא של תכשיר הייחוס כפי שעודכן בישראל ביולי 2024.

העלון המעודכן לרופא נשלח לפרסום במאגר התרופות באתר משרד הבריאות:
<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug>

התוויות רשותות לתכשיר בישראל:

Truxima is indicated in adults for the following indications:

* Non-Hodgkin's lymphoma (NHL)

Truxima is indicated for the treatment of patients with relapsed or refractory low-grade or follicular, B-cell non-hodgkin's lymphoma. Truxima is indicated for the treatment of previously untreated patients with low-grade or follicular lymphoma in combination with chemotherapy. Truxima is indicated for the treatment of patients with CD20 positive diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma in combination with CHOP chemotherapy. Truxima maintenance therapy is indicated for the treatment of follicular lymphoma patients responding to induction therapy.

* Chronic lymphocytic leukaemia (CLL)

Truxima in combination with chemotherapy is indicated for the treatment of patients with previously untreated and relapsed/refractory CLL. Only limited data are available on efficacy and safety for patients previously treated with monoclonal antibodies including rituximab or patients refractory to previous rituximab plus chemotherapy.

* Granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis

Truxima, in combination with glucocorticoids, is indicated for the treatment of adult patients with granulomatosis with polyangiitis (GPA) (Wegener's Granulomatosis (WG)) and microscopic polyangiitis (MPA).



* Pemphigus vulgaris (PV)

Truxima is indicated for the treatment of adult patients with moderate to severe pemphigus vulgaris (PV).

בברכה,
פאdagיס ישראל סוכנויות בע"מ