

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

كاپريلسا 100 ملغ

أقراص مطلية

المادة الفعالة:

يحتوي كل قرص على: فانديتانيب 100 ملغ vandetanib100mg لقائمة المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر، أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

إحفظ النشرة، من الجائز أن تحتاجها ثانية. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تشعر بعرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، الرجاء التوجه إلى طبيبك فوراً.

بالإضافة للنشرة، تتوفر للمستحضر كإبريلسا بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها، قبل بدء العلاج وخلال العلاج بـ كإبريلسا، والتصرف وفقها. يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لقراءتها بتمعن ثانية إذا دعت الحاجة.

1 لأي غرض مخصص الدواء؟

كإبريلسا مخصص لعلاج سرطان الغدة الدرقية النخاعي النقيلي، سرطان لا يمكن إزالته بعملية جراحية أو أنه قد إنتشر لأجزاء أخرى من الجسم. يعمل كإبريلسا عن طريق إبطاء نمو أوعية دموية جديدة في الورم (في السرطان)، الأمر الذي يمنع تزويد الورم بالغذاء والأكسجين. كإبريلسا يمكنه أن يعمل أيضاً بشكل مباشر على خلايا السرطان، لإبادتها أو لإبطاء وتيرة نموها.

الفصيلة العلاجية:

مثبط عمل الإنزيم بروتئين كيناز.

2 قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة فانديتانيب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").
- وُجد لديك إضطراب خلقي بعمل القلب المسمى 'متلازمة إطالة مقطع QT الخلقى'، الأمر الذي يظهر في فحص تخطيط القلب الكهربائي (ECG).
- كنت مرضعة.
- كنت تتناول إحدى الأدوية التالية: أرسينيك، سيسإبريد (لعلاج الحرقان)، إريتروميسين بالإستعمال الوريدي وموكسيفلوكساسين (لعلاج الإلتهابات التلوثية)، تورميفين (لعلاج سرطان الثدي)، ميزولاستين (لعلاج الحساسية)، أدوية مضادة لإضطراب نظم القلب من فصيلة IA ومن فصيلة III (تُستعمل لعلاج إضطرابات نظم القلب).
- لا يجوز إستعمال المستحضر إذا كان واحد مما ذكر سابقاً يخصك. إذا لم تكن واثقاً الرجاء إستشر الطبيب.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ كإبريلسا إحكِ للطبيب إذا:

- كنت حساساً للشمس.
- إن الأشخاص الذين يتناولون كإبريلسا قد تكون لديهم حساسية أكبر للشمس، حساسية التي تتجلى بحروق الشمس. أثناء تناول كإبريلسا عليك الإحتراس من التعرض للشمس، وداثماً إستعمال كريم واقى من الشمس وملابس طويلة لتجنب التعرض للشمس.
- وُجد لديك ضغط دم مرتفع.
- وُجدت لديك أو كانت لديك في الماضي أنورسما (أم الدم، تضخم وضعف جدار الوعاء الدموي) أو تمزق في جدار وعاء دموي.
- توجب عليك إجتياز عملية جراحية. من الجائز أن يدرس طبيبك إيقاف العلاج بـ كإبريلسا إذا كنت ستجتاز عملية جراحية كبيرة لأن كإبريلسا قد يؤثر على شفاء الجروح. بالإمكان بدء العلاج بـ كإبريلسا من جديد بعد تحقيق شفاء كافٍ للجروح.
- وُجدت لديك مشاكل في الكلى.

بُلِّغ عن أعراض جانبية جلدية خطيرة، بما في ذلك متلازمة ستيفنس جونسون (SJS) أو إنحلال البشرة النخري السمي (TEN)، فيما يخص العلاج بـ فانديتانيب. توقف عن إستعمال كإبريلسا وتوجه فوراً لتلقي علاج طبي إذا لاحظت إحدى الأعراض المتعلقة بردود الفعل الجلدية الخطيرة هذه، المفصلة في الفقرة 4 "أعراض جانبية".

مراقبة دمك وقلبك:

سوف يجري الطبيب فحوص الدم لفحص نسب البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيزيوم والهورمون المحرض للغدة الدرقية (TSH) وكذلك يفحص النشاط الكهربائي للقلب (ECG). سوف يجري لك الطبيب تلك الفحوص في المواعيد التالية:

- قبل بدء العلاج بـ كإبريلسا.
- بشكل منتظم أثناء العلاج بـ كإبريلسا.
- في الأسبوع الأول، الثالث والسادس بعد بدء العلاج بـ كإبريلسا.
- إثنى عشر أسبوعاً بعد بدء العلاج بـ كإبريلسا.
- كل ثلاثة أشهر بعد ذلك.
- إذا غيّر لك الطبيب المقدار الدوائي من كإبريلسا.
- إذا بدأت علاجاً دوائياً يؤثر على القلب.
- حسب إرشادات الطبيب.

الأطفال والمراهقون:

كإبريلسا غير مخصص للأطفال ولمراهقين دون عمر 18 سنة.

الفحوص والمتابعة:

أنظر فقرة التحذيرات.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكِ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. نظراً لأن كإبريلسا قد يؤثر على طريقة عمل أدوية معينة، كما أن أدوية معينة قد تؤثر على طريقة عمل كإبريلسا.

يجب إبلاغ الطبيب بالأخص إذا كنت تتناول إحدى الأدوية التالية:

- إيتراكونازول، كيتوكونازول، ريتونافير، كلاريتروميسين، ريفامپيسين وموكسيفلوكساسين (أدوية لعلاج التلوثات).

- كاربامازيبين وفينوباربيتال (تُستعمل لعلاج الصرع).

- أوندانسيترون (لعلاج الغثيان والتقيؤات).

- سيسإبريد (لعلاج الحرقان)، بيموزيد (دواء نفسي لعلاج حركات الجسم والإندفاعات الكلامية المتكررة وغير المسيطر عليها)، هالوفانترين ولوميفانترين (لعلاج الملاريا).

- ميتادون (لعلاج الإدمان)، هالوپيريدول، كلورپرومازين، سولپيريد، أميسولپيريد وزوكلوپنتيكسول (لعلاج الأمراض النفسية).

- پنتاميدين (لعلاج التلوثات).

- مضادات فيتامين K ودابيجاتران (مميعات دم).

- سيلكوسپورين وتاكروليموس (لمنع رفض نسيج مزروع)، ديجوكسين (لإضطرابات نظم القلب)، ميتفورمين (لعلاج السكري).

- مثبطات مضخة البروتون (لعلاج الحرقان).

إستعمال الدواء والطعام:

بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.

الحمل والإرضاع:

- لا يجوز تناول كإبريلسا إذا كنت حاملاً. إذا كنت حاملاً، مرضعة، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب قبل بدء العلاج بـ كإبريلسا. نظراً لأن كإبريلسا قد يلحق الضرر بالجنين. سوف يشرح لك الطبيب حول مخاطر وفوائد العلاج بـ كإبريلسا في هذه الفترة.

- يتوجب على النساء في سن الخصوبة إستعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل أثناء تناول كإبريلسا، ولفترة حتى أربعة أشهر على الأقل بعد التوقف عن تناول كإبريلسا.

- لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج بـ كإبريلسا، للحفاظ على سلامة رضيعك.

السياقة وإستعمال الماكنت:

عليك توخي الحذر خلال سياقة المركبة أو إستعمال الأجهزة والماكنت، لأن كإبريلسا قد يؤدي إلى إرهاق، ضعف أو إلى تشوّش الرؤية.

3 كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي:

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي من كإبريلسا هو عادة 300 ملغ في كل يوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة الإستعمال:

يجب الحرص على تناول الأقراص في نفس الساعة من كل يوم.

يجب بلع القرص مع الماء.

لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو شطر الأقراص.

إذا وُجدت صعوبة في بلع القرص:

بالإمكان خلط القرص مع الماء على النحو التالي:

- تناول نصف كأس من الماء (غير الغازية)، يجب إستعمال الماء ولا يجوز إستعمال أي مشروب آخر.

- ضع القرص داخل الماء.

- إخلط القرص بالماء حتى بعثرته في الماء، الأمر الذي قد يستغرق حتى عشر دقائق تقريباً.

- يجب الشرب مباشرة.

من أجل ضمان عدم تبقي بقايا دواء في الكأس، يجب إضافة حوالي نصف كأس ماء إضافية إلى الكأس الفارغة التي تحتوي على بقايا الدواء ومن ثم الشرب.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر:

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا كنت تشعر بعرض جانبي:

الرجاء إبلاغ الطبيب إذا كنت تشعر بأية أعراض جانبية. يمكن لطبيبك أن يوصيك بتناول مقدار دوائي أخفض من كإبريلسا. من شأن طبيبك أيضاً أن يصف لك أدوية أخرى لعلاج الأعراض الجانبية. أنظر تفصيل الأعراض الجانبية في الفقرة 4.

إذا نسيت تناول الدواء:

عليك التصرف وفقاً للوقت المتبقي حتى تلقي المقدار الدوائي القادم.

- إذا تبقت **12 ساعة أو أكثر حتى موعد تناول المقدار الدوائي القادم** تناول المقدار الدوائي المنسي مباشرة حال تذكرك، بعد ذلك تناول المقدار الدوائي القادم في الوقت الإعتيادي.

- إذا تبقى **أقل من 12 ساعة حتى موعد تناول المقدار الدوائي القادم** فوّت المقدار الدوائي المنسي، بعد ذلك تناول المقدار الدوائي القادم في الوقت الإعتيادي.

لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كإبريلسا قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندمsh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها. إذا وُجد لديك عرض جانبي، فمن شأن طبيبك أن يوصيك بتناول مقدار دوائي أخفض من كإبريلسا. من شأن طبيبك أيضاً أن يصف لك أدوية أخرى لعلاج الأعراض الجانبية.

توجه فوراً للطبيب إذا كنت تشعر بواحد أو أكثر من الأعراض الجانبية التالية - فمن الجائز أن تحتاج علاجاً طبياً طارئاً:

- إغماء، دوار أو تغير بنظم القلب. يمكن لتلك أن تكون علامات لتغير في النشاط الكهربائي لقلبك. لوحظت هذه الأعراض لدى 8% من المتعالجين الذين تناولوا كإبريلسا لعلاج سرطان الغدة الدرقية النخاعي النقيلي. يمكن لطبيبك أن يوصيك بتناول مقدار دوائي أخفض من كإبريلسا أو بالتوقف عن العلاج بـ كإبريلسا. لقد كان كإبريلسا وبشكل غير شائع مرتبطاً بتغيرات تشكل خطورة على الحياة بنظم القلب.
- توقف عن إستعمال كإبريلسا وتوجه فوراً لتلقي علاج طبي إذا كنت تلاحظ إحدى الأعراض التالية: بقع مائلة للون الأحمر غير بارزة فوق الجلد، على شكل هدف أو دائرة في الجزء المركزي من الجسم، تترافق أحياناً بحويصلات في المركز، تقشر الجلد، تقرحات في الفم، في الحنجرة، في الأنف، في الأعضاء التناسلية وفي العينين. قبل ظهور هذا الطفح الجلدي الشديد قد تظهر سخونة وأعراض تشبه الإنفلونزا (متلازمة ستيفنس - جونسون، إنحلال البشرة النخري السمي).
- إسهال شديد.

• ضيق تنفسي شديد، أو تفاقم مفاجئ بضيق التنفس، من الجائز أن يترافق بسعال أو بسخونة مرتفعة. قد ينجم هذا لأن لديك إلتهاب رئوي من نوع interstitial lung disease. هذا العرض غير شائع (يظهر لدى أقل من 1 من بين 100 مستعمل)، لكنه يمكن أن يشكل خطورة على الحياة.

• إختلاجات، صداع، إرتباك أو صعوبة في قدرة على التركيز. يمكن أن تكون هذه علامات لمتلازمة تسمى (reversible posterior leukoencephalopathy syndrome). هذه المتلازمة، غالباً تزول عند التوقف عن العلاج بـ كابريلسا. RPLS غير شائع (يظهر لدى أقل من 1 من بين 100 مستعمل).

بَلِّغ الطبيب فوراً إذا كنت تشعر بإحدى الأعراض الجانبية المدونة أعلاه.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً (التي تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 مستعملين):

- إسهال. من شأن طبيبك أن يصف لك دواء لعلاج الإسهال، لكن إذا تفاقم الإسهال الرجاء بَلِّغ طبيبك فوراً
- ألم في البطن
- طفح جلدي أو حب الشباب (acne)
- إكتئاب
- إرهاق
- غثيان
- ألم بطن (عسر هضم)
- مشاكل في الأظافر
- تقيؤ
- فقدان الشهية للطعام (anorexia)
- ضعف (asthenia)
- ضغط دم مرتفع، من الجائز أن يصف لك الطبيب دواء لعلاج ضغط الدم
- صداع
- إرهاق (كلل)
- أرق (insomnia)
- إلتهاب الممرات الأنفية
- إلتهاب في الممرات الهوائية الأساسية في الرئتين
- تلوثات في الطرق التنفسية العلوية
- إلتهاب المسالك البولية
- وخز أو خدر في الجلد
- شعور غير عادي في الجلد

- دوار
- ألم
- وذمة (إنتفاخ ناجم عن فائض من السوائل)
- حصى أو رواسب من الكالسيوم في الكلى أو في المسالك البولية (تحصي كلوي)
- تشوش الرؤية، يشمل تغيرات طفيفة في العينين التي تسبب تشوش الرؤية
- حساسية الجلد لضوء الشمس. أثناء تناول كابريلسا، إحم نفسك من التعرض للشمس وإستعمل دائماً كريم واقى وملابس طويلة عند الخروج إلى الخارج.

أعراض جانبية شائعة (التي تظهر لدى أقل من 1 من بين 10 مستعملين):

- تجفاف
- فرط شديد بضغط الدم
- إنخفاض الوزن
- سكتة، قصور دماغي أو حالة أخرى لا يكون فيها تدفق كافٍ للدم إلى الدماغ
- نوع لطفح يؤثر على اليدين وراحتي القدمين (متلازمة اليد والقدم)
- آلام في الفم (إلتهاب الفم)
- جفاف الفم
- إلتهاب الرئتين
- ذيفان في الدم - إختلاط لتلوث
- إنفلوإنزا
- إلتهاب في المثانة البولية
- إلتهاب في الجيوب الأنفية
- إلتهاب في الحنجرة/في صندوق الصوت (larynx)
- إلتهاب في الجريبات، بالأخص جريبات الشعر
- تلوث قيجي على الجلد ("دمل")
- تلوث فطري
- إلتهاب في الكلية
- فقدان سوائل الجسم (تجفاف)
- قلق
- إرتجاج
- نعاس، الميل للنوم
- إغماء

- الشعور بعدم الثبات
- إرتفاع الضغط داخل العين (جلوكوما)
- سعال دموي
- إلتهاب في نسيج الرئتين
- صعوبة في البلع
- إمساك
- إلتهاب بطانة المعدة (إلتهاب المعدة)
- نزف في الجهاز الهضمي
- حصى في المرارة
- آلام عند التبول
- فشل كلوي
- تكرار التبول والإلحاح في التبول
- سخونة
- رعاف
- جفاف في العينين
- تهيج في العينين (إلتهاب الملتحمة)
- تضرر الرؤية
- رؤية هالات (halo vision)
- رؤية وميض ضوئي (photopsia)
- خلل في قرنية العين (keratopathy)
- نوع من الإسهال (colitis)
- تساقط الشعر من الرأس والجسم (alopecia)
- تغيرات في حاسة التذوق.

أعراض جانبية غير شائعة (التي تظهر لدى أقل من 1 من بين 100 مستعمل):

- قصور القلب (حالة لا يستطيع فيها القلب ضخ الدم بشكل جيد، العلامات تشمل ضيق تنفس وإنتفاخ الكاحل)
- إلتهاب الزائدة الدودية (appendicitis)

- تلوث جرثومي
- إلتهاب الرتج (diverticula - جيوب بارزة صغيرة يمكنها أن تتشكل في الجهاز الهضمي)
- تلوثات جلدية جرثومية
- خُراج في جدار البطن
- سوء تغذية
- تقلص عضل لا إرادي (إختلاجات)
- سلسلة تقلصات عضلية سريعة ومتغيرة وإرتخاء (clonus)
- إنتفاخ في الدماغ
- تشوش عدسة العين
- إضطرابات في نظم القلب
- تناقص الأداء الوظيفي للقلب
- إضطرابات في وظائف الرئة
- إلتهاب رئتين ناتج عن إستنشاق مادة غريبة للرئتين
- إنسداد الأمعاء
- ثقب في المعى
- قلة السيطرة على حركية المعى
- لون غير سليم للبول
- إنعدام البول
- تضرر القدرة على الشفاء السليم
- إلتهاب البنكرياس (pancreatitis)
- حويصلات في الجلد.

أعراض جانبية شيعوها غير معروف (لا يمكن تقييم الشيعوع من المعلومات المتوفرة):

- تضخم وضعف جدار الوعاء الدموي أو تمزق في جدار الوعاء الدموي (أم الدم [أنورسما] وتسليخ الشريان).
- بقع مائلة للون الأحمر غير بارزة فوق الجلد، على شكل هدف أو دائرة في الجزء المركزي من الجسم، تترافق في أحيان متقاربة بحويصلات في المركز، تقشر للجلد، تقرحات في الفم، في الحنجرة، في الأنف، في الأعضاء التناسلية والعينين، حيث قد تسبقها سخونة وأعراض شبيهة بالإنفلوإنزا. قد تشكل حالات الطفح الجلدي هذه خطراً على الحياة (متلازمة ستيفنس - جونسون، إنحلال البشرة النخري السمي).
- رد فعل جلدي الذي يؤدي إلى نقاط أو بقع حمراء على الجلد، التي من شأنها أن تبدو مثل الهدف أو "عين الثور" مع مركز بلون أحمر داكن مُحاط بحلقات حمراء شاحبة أكثر (erythema multiforme).

أعراض جانبية التي من الجائز أن تُلاحظ في الفحوص المخبرية:

- بروتين أو دم في البول (لوحظ في فحص البول)
- تغيرات في نظم القلب (بالإمكان رؤيتها في التخطيط الكهربائي للقلب). يمكن لطبيبك أن يوصيك بالتوقف عن تناول كابريلسا، أو بتناول مقدار دوائي أخفض من كابريلسا
- وظائف غير سليمة للكبد والبنكرياس تبدو في فحص الدم. على الأغلب بدون أعراض (symptoms)، لكن من الجائز أن يطلب الطبيب مراقبة تلك القيم
- إنخفاض نسبة الكالسيوم في الدم. من الجائز أن يصف لك الطبيب علاج أو يغير العلاج الحالي الخاص بك بهورمونات الغدة الدرقية
- إنخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم
- إرتفاع نسبة الكالسيوم في الدم
- إرتفاع نسبة الجلوكوز (السكر) في الدم
- إنخفاض نسبة الصوديوم في الدم
- إنخفاض نشاط الغدة الدرقية
- إرتفاع نسبة خلايا الدم الحمراء في الدم.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، الرجاء توجه لطبيبك فوراً.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يجب تخزين المستحضر في مكان بارد دون 30 درجة مئوية.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز إلقاء أدوية في القمامة المنزلية أو في المجاري المنزلية. إسأل الصيدلي الخاص بك حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد بحاجة إليها. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمُرَكَّب الفعال أيضاً على:

Dibasic calcium phosphate dihydrate, microcrystalline cellulose, crospovidone, povidone, magnesium stearate, hypromellose 2910, macrogol 300 and titanium dioxide (E171).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوَى العبوة:

أقراص بيضاء، مستديرة، مطلية، معلّمة من جانب واحد بالكتابة - "Z100". تتوفر كابريلسا ضمن عبوة لويحة (بليستر) ذات 30 قرصاً.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه:

سانوفي - أفنتيس إسرائيل م.ض.، شارع بني چاؤون 10، ص.ب. 8090، نتانيا.

تم إعدادها في شباط 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 149 23 33769

لا تحتوي هذه النشرة على كافة المعلومات عن المستحضر. إذا توفر لديك أي سؤال أو لم تكن واثقاً من أمر ما الرجاء التوجه إلى الطبيب.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.