

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) **1986**

يسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

لانسو تيفع 30 ملغ

كيسولات مقاومة لحموضة المعدة

التريكية:

تحتوي كل كيسولة على:

Lansoprazole 30 mg

لانسوبرازول 30 ملغ

الحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسيبات الأرجية انظر البند 2 – "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 – "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة **بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.**

تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي. لقد وصف هذا الدواء لعلاج مرض عاك، لا تعطه للأخرين، قد يضرهم الدواء حتى لو بدأ لك أن مرضهم مشابه.

لاي غرض مخصص هذا الدواء؟

يقال الدواء إفراز الحمض في المعدة.

الدواء مخصص لـ:

- علاج قرحة المعدة وقرحة الاثني عشر.
- علاج ومنع معاودة التهاب المريء الارتعاعي (reflux esophagitis).
- العلاج بالدمج مع مضاد حيوي لإبادة جرثومة هيليكوباكتر بيلوري/الملوية البوابية (H.Pylori) المرتبطة بالقرح في الجهاز الهضمي.
- علاج ومنع القرحة في المعدة و/أو في الاثني عشر، التي يسببها العلاج بأدوية مضادة لالتهاب لاسيتروبيدية (NSAIDs).
- علاج مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) المصحوب بالأعراض.
- علاج متلازمة زولينجر-إليسون.
- **الفسيولة العلاجية**
- مثبطات مضخة البروتون (PPIs).

2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (لانسوبرازول)، أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 – "معلومات إضافية")، قد تشمل أعراض رد الفعل التحسسي على: طفح جلدي، مشاكل في التنفس و/أو البلع، انتفاخ الوجه، الشفتين، الحلق أو اللسان.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل البدء بالعلاج بالانسو تيفع (وخالته) أخبر طبيبك إذا:

- وجدت لديك مشاكل في الكبد (من المحتمل أن يلامن الطبيب الجرعة الدوائية).
- كنت تعاني من تخلل العظام أو تتناول أدوية كورتيكوستيروبيدية (والتي قد تزيد من خطر نشوء تخلل العظام). مثل أدوية من فصيلة مثبثات مضخة البروتون (PPIs) مثل لانسو تيفع، خاصة لفترة تزيد عن سنة و/أو بجرعات دوائية عالية، قد يزيد بعض الشيء من خطر حدوث كسور في العظام، والرسم أو العمود الفقري. يُحتمل أن يوصي الطبيب بإضافة فيتامين D (فيتامين دي) والكالسيوم.
- تطور لديك ذات مرة رد فعل جلدي بعد استعمال لانسو تيفع أو أدوية مشابهة مخصصة لتثبيط إفراز الحمض في المعدة.
- كان عليك إجراء فحص دم لمرموجرانين A (Chromogranin)، لأن لانسو تيفع قد يؤثر على نتائج الفحص.

- إذا كنت تستعمل لانسو تيفع لأكثر من ثلاثة أشهر، فقد تخفض مستويات المغنيزيوم في الدم. انخفاض مستويات المغنيزيوم المنخفضة: تشمل الأعراض الالارادية في العضلات، التوهان/الارتباك، الشدجات، الدوار، الارتعاج في وتيرة القلب. إذا لاحظت نشوء أحد هذه الأعراض، فيرجى إخبار طبيبك بأسرع وقت. مستويات المغنيزيوم المنخفضة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم. قد يقرر طبيبك إجراء فحوص دم منتظمة من أجل تتابع مستويات المغنيزيوم في دمك.
- قد يؤثر لانسو تيفع على نجاعة امتصاص فيتامين B12 خاصة عند الاستعمال المطول. عليك الاتصال بالطبيب المعالج إذا لاحظت نشوء أحد الأعراض التالية، التي قد تشير إلى مستويات منخفضة من فيتامين B12:
 - شعور شديد أو اندام الطاقة
 - إحساس بالخز والتعبيل
 - الألم أو احمرار في اللسان، تقرّحات في الفم
 - ضعف العضلات
 - اضطرابات في الرؤية
 - مشاكل في الذاكرة، ارتباك، اكتئاب
- كنت تعاني من أعراض جديّة أو إذا تفاقت الأعراض.

تحذيرات إضافية:

قد يرسك الطبيب إلى فحص التنظير الداخلي لاستيضاح سبب الأعراض التي تعاني منها. يستطيع هذا الفحص أيضاً أن ينفى أسباباً أكثر خطورة لأعراض (مثل سرطان المعدة).

يُحتمل أن الطبيب قد وصف لك سوياً مع لانسو تيفع أدوية إضافية لعلاج حالتك، مثل مضاد حيوي لعلاج جرثومة هيليكوباكتر بيلوري (الملوية البوابية) أو أدوية مضادة لالتهاب. يجب قراءة نشرة هذه الأدوية أيضاً بإمعان.

إذا نشأ لديك إسهال أثناء العلاج، فوجه فوراً إلى الطبيب، لأن استعمال لانسو تيفع قد يزيد بعض الشيء من خطر نشوء إسهال ثلوثي. يقل لانسو تيفع الحموضة الطبيعية في المعدة، والتي تساعد عادة على إبادة الجراثيم، الأمر الذي قد يؤدي إلى ثلوثات في المعدة. انظر أيضاً البند 4 – "الأعراض الجانبية".

إذا نشأ طفح جلدي، خاصة في المناطق المعرضة للشمس، فيجب مراجعة الطبيب بأسرع وقت ممكن، لأن الطبيب قد يوصي بإيقاف العلاج بالدواء. كذلك، يجب إخبار الطبيب أيضاً إذا كنت تعاني من أعراض أخرى، مثل الألم المفصل (قد تكون هذه الأعراض مرتبطة بالتهلك الجلدي لمرض الثنية).

تم التلبيغ عن ردود فعل جلدية خطيرة مرتبطة بالعلاج بالانسويزازول بما في ذلك متلازمة ستيفنسون-جونسون، وتقرن الأنسجة المتوتمة البشروية التسممي، ورد الفعل الدوائي مع كثرة اليوزينيات التسممي، الحزازية (DRESS). توقف عن استعمال لانسو تيفع ووجه فوراً لتلقي العلاج الطبي إذا لاحظت نشوء أحد الأعراض الموصوفة في الأعراض الجانبية في البند 4. تتناول أدوية من فصيلة مثبثات مضخة البروتون (PPIs) مثل لانسو تيفع، خاصة لفترة تزيد عن سنة و/أو بجرعات دوائية عالية، قد يزيد بعض الشيء من خطر حدوث كسور في العظام، والرسم أو العمود الفقري. أخبر طبيبك إذا وجد لديك تخلل العظام (انخفاض الكفاءة العظمية) أو إذا أخبرك طبيبك أنك معرض لخطر الإصابة بتخلل العظام (على سبيل المثال، إذا كنت تستعمل الستيرويدات).

عند استعمال لانسو تيفع، قد ينشأ التهاب في الكليتين. الأعراض عبارة عن – وانخفاض في حجم البول، دم في البول، ردود فعل الحساسية المفرطة التي تتمثل بالحُمى، التورم الجلدي وتصبّب المفاصل. يجب إبلاغ الطبيب عن هذه الأعراض.

قد يخفي استعمال الدواء أعراضاً لأمراض أخرى. إذا لم يتحسن وضعك بعد أسبوعين، فيجب مراجعة الطبيب.

الاستعمال لدى الأولاد

لا يوصي باستعمال الدواء لدى الأولاد لعدم توفر معلومات كافية حول استعمال الدواء لدى الأولاد. لا يجوز إعطاء الدواء للأطفال الذين عمرهم أقل من سنة. انظر أيضاً "كيفية الاستعمال" في البند 3.

الفحوص والمتابعة

- يجب استشارة الطبيب بالنسبة للحاجة إلى إجراء فحوص دم لمستوى المغنيزيوم في الدم (قبل العلاج وخالته)، لأن الدواء قد يؤدي إلى خفض مستوى المغنيزيوم. انظر أيضاً البند 4 – "الأعراض الجانبية".
- إذا كنت تتلقى العلاج بالانسو تيفع لفترة مطولة (تزيد عن سنة)، فقد يُجري الطبيب متابعة لمؤسك ويفحص ضرورة الاستمرار بالعلاج.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الان، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك خاصة، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل الأدوية التالية (القائمة الواردة فيما يلي تشير إلى المواد الفعالة في الأدوية. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تستعمل أحد هذه الأدوية، فاستشر رجاءً الطبيب أو الصيدلي):

- أدوية من فصيلة مثبثات HIV بروتياز، مثل أتازانافير وتيليفينايفير (أدوية مضادة لفيروس HIV) وميتوريكسات
- كيتوكونازول، إيتراكونازول، ريفاميسين (لعلاج التلوثات)
- ديجوكسين (لعلاج مشاكل القلب)
- أوفارين (دواء مضاد لتخثر الدم)
- ثيوفيلين (لعلاج الربو)
- تاروفيموس (لمنع رفض الغرسة – العضو المزروع)
- فلووكسامين (لعلاج الاكتئاب أو المشاكل النفسية الأخرى)
- مضادات الحموضة (المستعملة مثلًا للحرقه) أو سكر الفات. يجب تناول لانسو تيفع بعد تناول هذه الأدوية بأدوية على الأقل
- سادة قد تسبب انخفاضاً في مستويات المغنيزيوم في الدم، مثل مدرات البول
- نبتة العرن (تسمى أيضاً St. John's wort)

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء قبل الطعام بـ 30 دقيقة على الأقل.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً، فتنبين أنك حامل، فتخطين للحمل أو مرضعاً، فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

- لا تتوفر معلومات كافية حول استعمال هذا الدواء في الحمل ولذلك لا يوصي باستعماله إذا كنت حاملاً.
- ليس معلوماً ما إذا كان الدواء ينتقل إلى حليب الأم. لا يوصي باستعمال الدواء في فترة الإرضاع.

المساقاة واستعمال المكائنت

قد يسبب استعمال هذا الدواء أعراضاً جانبية، مثل دوار، ميل إلى النوم، تعب، فيرتيجو (إحساس بالدوخة)، صداع أو اضطرابات في الرؤية، مما قد يخل بالقدرة على المساقاة وتشغيل المكائنت. لا يجوز المساقاة أو تشغيل المكائنت إذا كنت تشعر بهذه الأعراض. يجب توخي الحذر عند القيام بأي نشاط يستلزم اليقظة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي لانسو تيفع على السكر (سوكروز). إذا أخبرك طبيبك بأن لديك عدم تحمل (حساسية) لسكريات معينة، فاستشر طبيبك قبل استعمال هذا الدواء. انظر أيضاً البند 6 – "معلومات إضافية".

تحتوي كل كيسولة من لانسو تيفع 30 ملغ على ما يقارب 120.03 ملغ من السوكروز.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر وفقاً وما توفا تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج المستحضر.

سبب تحديد الجرعة اليومية ومدّة العلاج من قبل الطبيب بحسب الهدف من العلاج، وضرك واستجابتك للعلاج.

إذا كنت تتناول لانسو تيفع مرة واحدة في اليوم، فيوصى قد غياب تعليمات أخرى من الطبيب بتناول الكيسولة كل صباح قبل وجبة الفطور.

إذا كنت تتناول لانسو تيفع مرتين في اليوم، فيوصى بتناول جرعة واحدة في الصباح قبل وجبة الفطور وجرعة ثانية في المساء.

يجب الحرص على استعمال هذا الدواء في أوقات منتظمة، كما خذ من قبل الطبيب المعالج.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها

كيفية الاستعمال

يجب تناول الدواء قبل الطعام بـ 30 دقيقة على الأقل. يجب بلع الكيسولة مع كأس من الماء.

لا يجوز مضغ أو هرس الكيسولة والحببات الموجودة داخلها من أجل عدم الإضرار بطلاء الحبيبات المجرورية لفعالية الدواء.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخبر صر منك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول جرعة فور تذكرك، لكن إذا اقترب موعد الجرعة القادمة فيجب تحطخي الجرعة المنسية وتناول الجرعة القادمة في موعد العادي. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة تعويضاً عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. يظهر التخفيف في الأعراض عادة قبل الشفاء النهائي. حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن استعمال الدواء قبل الموعد الذي حدده الطبيب، قد تعود الأعراض.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال لانسو تيفع إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض مستعملين. لا تتلقأ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب إيقاف العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى إذا ظهرت الأعراض الجانبية الخطيرة التالية (تؤثر على شخص 1 كحد أقصى من بين 1,000 شخص):

- ودمة وعائية و/أو رد فعل تحسسي. قد تشمل الأعراض على: انتفاخ الديدن، الرجلين، الكاحلين؛ انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، البهوعم و/أو الحلق، صعوبة في البلع، ضيق التنفس و/أو صعوبات في التنفس؛ طفح جلدي بارز ومثير للحكة (أورتيكاريا/شرى)، حمى أو انخفاض ضغط الدم.
- حويصلات، تقرن الجلد أو نزيف دموي من الجلد حول الشفتين، العدنين، الفم، الألف والأعضاء التناسلية. قد تكون لدى المريض أيضاً أعراض شبيهة بالانفلونزا وحمى مرتفعة. قد تكون هذه علامات لمتلازمة ستيفنسون-جونسون.

طفح جلدي خطير مصحوب بالحويصلات والذي قد يسبب تقرن الجلد واكتشاف الطبقات الداخلية. يمكن أن يكون هذا العرض علامة على تقرن الأنسجة المتوتمة البشروية التسممي (toxic epidermal necrolysis) أو متلازمة DRESS.

أعراض مثل اصفرار الجلد و/أو بياض العينين، التعب، الحمى. قد تكون هذه الأعراض نتيجة لالتهاب في الكبد أو لتغيرات في وظائف الكبد.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية (تؤثر على شخص 1 كحد أقصى من بين 1,000 شخص):

إسهال مطول من غير تحسن. انظر أيضاً البند 2 – "تحذيرات إضافية".

ألم شديد في البطن قد يشع إلى الظهر ويسبب غثياً وتقيؤات. قد يكون ذلك علامة على التهاب في البنكرياس. صعوبات في التبول أو دم في البول. قد تدل هذه الأعراض على مشاكل في الكليتين أو تغيرات في وظيفة الكليتين.

انخفاض في مستويات المغنيزيوم في الدم خاصة إذا تم استعمال الدواء لأكثر من 3 أشهر. قد يتمثل ذلك بأعراض مثل: التعب، التقلصات اللاإرادية في العضلات، التوهان/الارتباك، الاختلاجات، الدوار، التزايد في وتيرة القلب (و مشاكل النظم الأخرى). قد تسبب مستويات المغنيزيوم المنخفضة أيضاً انخفاضاً في مستويات البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم. انظر أيضاً البند 2 – "الفحوص والمتابعة". قد يقرر الطبيب إجراء فحوص دم منتظمة من أجل تتابع مستويات المغنيزيوم في الدم.

إذا ظهرت كدمات بسهولة. قد يكون هذا العرض نتيجة لمشكلة في الدم. يُحتمل أن يحيلك الطبيب إلى إجراء فحص للدم.

إذا كنت تعاني من ثلوث أو من علامات قد تشير إلى وجود ثلوث، مثل: الحمى والتدهور الخطير في وضك

العام، الحمى المصحوبة بعلامات ثلوث موضعي مثل الألم في الفم، في البهوعم وفي الحلق أو المشاكل في الجهاز البولي. قد تشير هذه الأعراض إلى انخفاض في تعداد خلايا الدم البيضاء وفي مقاومة الجسم للثلوثات. يستطيع الطبيب أن يفحص من خلال فحص الدم ما إذا كان هناك نقص في خلايا الدم البيضاء (ندرة المحييات).

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100):

- صداع، دوار، تعب، شعور عام سيئ
- إسهال، إمساك، الإم في البطن، غثيان، تقيؤات، غازات
- جفاف أو ألم في الفم أو الحلق
- سلائل (بوليب) في المعدة
- حكة، طفح جلدي، شرى
- تغيرات في وظائف الكبد (تشاهد في فحوص الدم، مثلًا في ارتفاع إنزيمات الكبد)

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1,000):

- آلام في العضلات أو في المفاصل
- احتباس السوائل الذي قد يسبب انتفاخ الزراعين و/أو الرجلين (الوذمة)
- كسور في العظام، والرسم أو في العمود الفقري (خاصة عند استعمال جرعة دوائية عالية و/أو الاستعمال لفترة طويلة، انظر أيضاً البند 2 – "تحذيرات خاصة")
- تغيرات في العد الدموي (مثل: قلة الصفائح، كثرة اليوزينيات، قلة الكريات البيضاء)

أعراض جانبية نادرة (تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10,000):

- حمى
- تملق، نعاس، ارتباك، رؤية أو سماع أشياء غير موجودة في الواقع (هلوسات)
- ردود فعل جلدية، مثل: اندام الإحساس (خدر)، إحساس بالتنميل، اللذع أو الوخر، كدمات، نقاط حمراء أو بنفسجية قد تشير للحكة، حويصلات
- صعوبات في النوم (أرق)
- مشاكل في الرؤية، فيرتيجو (إحساس بالدوخة)
- تغيرات في حسنة الذوق، فقدان الشهية، التهاب في اللسان
- تعرّج متزايد
- حساسية متزايدة للشمس
- تساقط الشعر
- تملق (مدل)
- ارتجاع

فقر الدم (يمكن أن يتمثل بشحوب، تعب، دوار، إغماء) اضطرابات كلوية (التهاب، تغيرات في التبول، دم في البول)

التهاب البنكرياس

التهاب في الكبد أو يرقان (قد يتمثل باصفرار الجلد أو العينين)

انتفاخ في الشدبين لدى الرجال، مشاكل في الانتصاب (ضعف جنسي)

ثلوث فطري (مثل ذلك الذي قد يؤثر على المريء) ودمة وعائية

أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر عند أقل من مستعمل 1 من بين 10,000):

- ردود الفعل التحسسية المفرطة الخطيرة بما في ذلك الصدمة التيفية (قد تشمل الأعراض على: حمى، طفح جلدي، انتفاخ، هبوط ضغط الدم)
- التهاب في الفم (مستومايتيس)
- التهاب في الأمعاء (التهاب القولون)
- تغيرات في قيم الفحوص مثل: انخفاض مستويات الصوديوم (نقص الصوديوم في الدم)، تشمل الأعراض على: غثيان، تقيؤات، صداع، نعاس وتعب، ارتباك، ضعف العضلات أو تشنجات، عصبية، نوبات سريعة وغيبوبة. قد يُجري الطبيب فحوص دم لتتبع مستويات الصوديوم في الدم
- ارتفاع مستويات الكوليسترول والجليسيريدات الثلاثية
- ردود فعل جلدية خطيرة جدًا قد تشمل الاحمرار، الحويصلات، الانتفاخ الخطير، انفصال الجلد
- انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (مثل: ندرة المحييات، قلة الكريات الشاملة)
- التهاب القولون الكرواجيني

أعراض جانبية مدى شوبوعا غير معروف (أعراض لم يتم تحديدها مدى شوبوعا بعد):

- طفح جلدي، مصحوب أحياناً بالألم المفاصل
- الشكل البشري لمرض الثنية أو طفح مرتبط بالثنية
- هلوسات جنسية
- انخفاض في مستويات المغنيزيوم، الكالسيوم والبوتاسيوم

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأولاد:

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج بأي عرض جانبي وأي دواء إضافي يعطى للولد. انظر أعلاه الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية، التي تم تسهيلها.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التلبيغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التلبيغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التلبيغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (<http://www.health.gov.il>) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتلبيغ عن أعراض جانبية، عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! إذا نشأ الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز التخلص بالدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّنة على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يجب التخزين في درجة حرارة دون 25°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على: Sugar spheres (sucrose, corn starch), hypromellose, methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer, povidone, sodium lauryl sulphate, sodium starch glycolate, talc, triethyl citrate, titanium dioxide, trisodium phosphate.

تركيبه الكيسولة: Gelatin, titanium dioxide, printing black ink (shellac, propylene glycol, strong ammonia solution, potassium hydroxide, and black iron oxide).

كيفية الدواء وما هو محتوى العبوة:

كيسولة معتمة بيضاء اللون. العدد 1 والحرف L مطبوعان على غطاء الكيسولة والعدد 30 مطبوع على جسم الكيسولة. تحتوي العبوة على 28 كيسولة مقاومة لحموضة المعدة في عبوة شرايط.

اسم صاحب الامتياز والمصنّع وعنوانه:

تيفع إسرائيلي مرض، شارع دفورا هالينبنا 124، تل أبيب 6944020.

تم تحرير النشرة في حزيران/يونيو 2024.

رغم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 174-29-36849-99

من أجل التبسيط ولتسهيل الفهارة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

LANSO-TEVA PIL MW0624