

רזלקס מבוגרים

רזלקס ילדים

חוקן רקטלי

חומר פעיל:

כל בקבוקון חוקן רקטלי מכיל:

רזלקס מבוגרים: 6.75 גרם גליצרין (Glycerin 6.75 g).

רזלקס ילדים: 2.25 גרם גליצרין (Glycerin 2.25 g).

חומרים בלתי פעילים בתכשיר – ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מילי מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" המופיעות בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עלייך לפנות אל הרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר תקופה קצרה של טיפול.

1. למה מיועדת התרופה?

תרופה זו מכילה גליצרין, אשר מקל על פינוי הצואה. ההשפעה מושגת על ידי התרופה מתקבלת בזכות יכולתו של הגליצרין לרכך את הצואה ולהמריץ את תנועתו המעיית. התרופה זו נועדה לטיפול בעצירות.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (גליצרין) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6 "מידע נוסף").
- אתה סובל מדימום רקטלי ו/או אנאלי או מכל בעיה אחרת כגון דלקת של שחורים או hemorrhagic rectocolitis.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

יש לשוחח עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה אם: הצורך במשלשל נובע משינוי בלתי צפוי בדפוסי המעיית (תדירות ואופי הפינויים) שנמשך יותר משבועיים (עצירות קשה).

- קיימת אנמיה בלתי מוסברת (ירידה בכדוריות הדם האדומות או ירידה ברמות ההמוגלובין בדם).
- קיימת ירידה לא מוסברת במשקל.
- קיימת עלייה בחום הגוף.
- קיימת היסטוריה משפחתית של סרטן המעי הגס או מחלות מעיים דלקתיות.

אין להשתמש בחומרים משלשלים אם אתה חווה כאבי בטן, בחילות או הקאות.

שימוש בילדים

השימוש בילדים מתחת לגיל שנתיים בהנחיית הרופא המטפל בלבד ובהתאם למינון שייקבע על-ידו.

יש לנקוט משנה זהירות בעת שימוש בתרופה זו לתקופות ממושכות, מכיוון שהדבר עלול להוביל לתלות ואולי אף לצורך להעלות את המינון בהדרגה (התמכרות), או לבעיות אחרות. שימוש יתר או לתקופה ממושכת עלול לגרום לשלשול ולאובדן נוזלים ובמקרים חמורים אף לנזק למעיית.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון, הנקה ופוריות

אם אתה בהריון או מיניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת להיכנס להריון, שאלו בעצת הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה זו. ניתן להשתמש בגליצרין בפי הטבעת במהלך ההריון או בתקופה שלאחר הלידה.

נהיגה ושימוש במכוונת

תרופה זו אינה משפיעה על היכולת לנהוג או להפעיל מכוונת.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

רזלקס מבוגרים:

בבקבוקון אחד למבוגרים, 1-2 פעמים ביממה. אם לא התפנית מצואה שבועיים האחרונים (עצירות חמורה), הרופא עשוי לייעץ לך להשתמש ב-2 מנות ב-24 שעות.

אין להשתמש לתקופה ממושכת.

רזלקס ילדים (מעל גיל שנתיים):

בבקבוקון אחד לילדים, 1-2 פעמים ביממה. אם הילד לא התפנה מצואה שבועיים האחרונים (עצירות

חמורה), הרופא עשוי לייעץ להשתמש ב-2 מנות ב-24 שעות. אין להשתמש לתקופה ממושכת.

השימוש בילדים מתחת לגיל שנתיים בהנחיית הרופא המטפל בלבד ובהתאם למינון שייקבע על-ידו.

אין לעבור על המנה המומלצת. אין לבלוע!

הוראות שימוש:

רזלקס ניתן לשימוש בכל שעה ביום.

1. החזק את צוואר הבקבוקון וסובב את הפקק כדי לשבור את החותם.
2. הרם את המכסה; אין להחזיק את הבקבוקון הסחית בשום נקודה מאחר שהדבר עלול לגרום למוצר לדלוף החוצה לאחר פתיחתו.
3. שמן את הצינורית עם טיפה מן התמיסה.
4. הנכס את הצינורית לתוך פי הטבעת וסחוט את הבקבוקון.
5. הוצא את הצינורית מפי הטבעת, תוך המשך לחיצה על הבקבוקון הסחית, והשלך לפח.

אם השתמשת בטעות במינון גבוה יותר

במקרה של מנת יתר או שימוש לא נכון בתרופה או אם בטעות ילד בלע מן התרופה, יש ליצור קשר עם הרופא באופן מיידי או לגשת לחדר המיון של בית החולים הקרוב והבא ארזות התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש ברזלקס מבוגרים וברזלקס ילדים עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. יש לדווח לרופא אם אתה מבחין באדמומיות, עקצוץ או כאב (גירוי) ברקטום.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה לאחר תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-25°C.
- אין לזרוק תרופות באסלה או בפח הבית. שאל את הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאינך משתמש בהן יותר. כך תוכל לסייע בשמירה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Mauve fluid extract, chamomile fluid extract, wheat starch, purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

הבקבוקונים מכילים נוזל צמיג בגוון צהוב עד חום.

גדלי אריזה מאושרים:

רזלקס מבוגרים משווקת באריזות של 6 בקבוקונים של 9 גרם. כל בקבוקון מהווה מנה בודדת.
רזלקס ילדים משווקת באריזות של 6 בקבוקונים של 3 גרם. כל בקבוקון מהווה מנה בודדת.

שם בעל הרישום והיבואן:

רר רוקחות בע"מ, רחוב גשר העץ 31, פארק תעשיות עמק חפר, ישראל.

מספרי הרישום בפנקס התרופות הממלכתי במשרד

הבריאות:

רזלקס מבוגרים: 158-37-34394-00

רזלקס ילדים: 158-38-34408-00

נערך ביולי 2024.

לשם הפטנטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה והמידע בעלון מיועדים לבני שני המינים.

RAZP3209/16-02