

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"ז – 1986

התרופה משווקת על-פי מרשם רפואי בלבד

נוֹקָלָה תְּמִיסָה לְהַזְּרָקָה

תמיסה להזרקה בעט מזרק מוכן לשימוש

מפוליזומב (Mepolizumab) 100 מ"ג/מיל

כל עט מזרק מוכן לשימוש של 1 מ"ל מכיל 100 מ"ג מפוליזומב (Mepolizumab).

לרישמת החומרם הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העalon עד סוף בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה בעבר. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה משמשת לטיפול:

← בחולים מבוגרים עם **אסטמה אוזינופילית חמורה** שאינה מגיבה לטיפולים אחרים, בשילוב עם תרופות נוספות.

← בחולים מבוגרים עם **דלקת כרונית חמורה בעורות האף המלווה בפוליפים אפיים** (Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps [CRSwNP]), שעבורם טיפול בקורטיקוסטרואידים וניתוח בעשר השנים האחרונות לא מאפשרים שליטה מספקת במחלת. התרופה ניתנת בשילוב עם קורטיקוסטרואידים תוך-אפיים.

← בחולים מבוגרים עם **דלקת כליה דם אלרגית וגרנולומוטית** – מחלת צ'ירג-שטרואס (Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis [EGPA]).

← בחולים מבוגרים עם **تسمונת היפר-אוזינופילית** (HES) שאינה בשלת בצוואר מספקת, ללא סיבה משנה שאינה המטולוגית. התרופה ניתנת בשילוב עם תרופות נוספות.

קובץת רפואייטית

נוגדן חד-שבטי, תרופות למחלות חסימתיות בדרכי הנשימה.

נוֹקָלָה תְּמִיסָה לְהַזְּרָקָה מכילה את החומר הפעיל **מפוליזומב**, נוגדן חד-שבטי, סוג של חלבון המתווכן להזנות חומר מטרה ספציפי בגוף.

מפוליזומב, החומר הפעיל בנוקלה תמייסה להזרקה, חוסם חלבון הנקרא אינטראולוקין-5. על-ידי חסימת פעילותו של חלבון זה, מפוליזומב מגביל את הייצור של אוזינופילים במח העצם ומוריד את מספר האוזינופילים בזרם הדם ובリアות.

• חלק מהאנשים עם אסטמה חמורה יש יותר מדי אוזינופילים (סוג של תא דם לבן) בדם ובリアות. מצב זה נקרא **אסטמה אוזינופילית** – סוג האסטמה שנוקלה תמייסה להזרקה יכולה לטפל בו.

אם אתה מטופל כבר בתרופות כגון משאפים במינון גבוה אבל האסטמה שלך אינה בשלת היטב, נוקלה תמייסה להזרקה יכולה להפחית את מספר התקפי האסטמה.

אם אתה נוטל תרופות הנקרואקטו-קורטיקוסטרואידים דרך הפה, נוקלה תמייסה להזרקה עשויה לסייע גם בהפחחתת המינון היומי הנדרש לצורכי שליטה באסטמה שלך.

• **דלקת כרונית חמורה בעורות האף המלווה בפוליפים אפיים** (CRSwNP) היא מצב שבו לאנשים יש יותר מדי אוזינופילים (סוג של תא דם לבן) בדם וברקמה שמצויה את האף והסינוסים. מצב זה עלול לגרום לתסמינים כגון כאב סתום, אובדן ריח וצמיחה רכה דמוית גלי בתוך האף

(נקראת פוליפים אפיים).

נוקלה תמיישה להזרקה מורידה את מספר האוזינופילים בדם ויכולת להקטין את גודל הפוליפים, להקל על הגודש באף ולסייע במניעת ניתוח של הפוליפים האפיים.

נוקלה תמיישה להזרקה יכולה גם לסייע להפחית את הצורך בקורטיקוסטרואידים דרך הפה לשיליטה בתסמים שלך.

• **דלקת כל דם אלרגית וגרנולומטוטית (EGPA)** היא מצב שבו לאנשים יש יותר מדי אוזינופילים (סוג של תא דם לבן) בדם וברקמות ויש דלקת של כל הדם. מצב זה משפיע בעיקר על הריאות והסינוסים אך לעתים משפיע על אחרים כגון העור, הלב והכבדות.

נוקלה תמיישה להזרקה יכולה לסייע בשיליטה ובubicוב של התלקחות התסמיניות האלו של דלקת כל דם אלרגית וגרנולומטוטית. תרופה זו יכולה גם לסייע לרופא שלך להקטין את המנה היומית של קורטיקוסטרואידים דרך הפה הנדרשת כדי לשנות בתסמים שלך.

• **תסמונת היפר-אוזינופילית (HES)** היא מצב שבו יש מספר גבוה של אוזינופילים (סוג של תא דם לבן) בדם. תאים אלו יכולים להזיק לאיברים בגוף, בפרט לב, לריאות, לעצבים ולעור.

נוקלה תמיישה להזרקה מסייעת להקטין את התסמיניות ולמנוע התלקחות. אם אתה נוטל קורטיקוסטרואידים דרך הפה, נוקלה תמיישה להזרקה עשויה גם לסייע בהפחחת המין היומי הנדרש לצורך שליטה בתסמיין/התלקחות התסמונת היפר-אוזינופילית.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

• אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (מפוליזומב) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6).

← **בדוק עם הרופא אם אתה חושב שזה חל עלייך.**

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
שוחח עם הרופא שלך לפני השימוש בנוקלה תמיישה להזרקה.

החרפה באסתמה

ישנים אנשים אשר חוות תופעות לוואי הקשורות לאסתמה, או שהאסתמה שלהם עלולה להחמיר, במהלך הטיפול בנוקלה תמיישה להזרקה.

← **ספר לרופא או לאחות אם האסתמה שלך אינה בשלתך, או מחמירה, לאחר תחילת הטיפול בנוקלה תמיישה להזרקה.**

תגובהות אלרגיות ותגובהות באזורי ההזרקה

תרופות מסווג זה (מגדנים חד-שבטיים) עלולות לגרום לתגובהות אלרגיות חמורות בעת ההזרקה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

אם יתכן שחוויות תגובה דומה לכל סוג של זריקה או תרופה,

← **ספר עלך לרופא לפני קבלת נוקלה תמיישה להזרקה.**

ziehominim_hengarmim_ullid_i_tevil

נוקלה תמיישה להזרקה עלולה להחמיר את העמידות שלך בפני ziehominim_hengarmim_ullid_i_tevil. אם כבר יש לך ziehominim_hengarmim_ullid_i_tevil, יש לטפל בו לפני תחילת הטיפול בנוקלה תמיישה להזרקה.

אם אתה מתגורר באזור בו ziehominim_hengarmim_ullid_i_tevil או אם אתה נושא לאזור זהה:

← **בדוק עם הרופא אם אתה חושב שאחד מהם עשוי לחול עלייך.**

ילדים ומתבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לשימוש **ילדים או במתבגרים מתחת לגיל 18**.

אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, אם לוקח לאחרונה או אם אתה מתחיל לקחת תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

תרופות אחרות לטיפול באסתמה, בלבד קרונית חמורה בעשרות אף המלווה בפוליפים אפיים,

בדלקת כל' דם אלרגית וגרנוולומטוטית או בתסমונת היפר-אוזינופילית.
אל תפסיק באופן פתאומי נטילת תרופות אחרות שלך לטיפול באסתמה, בדלקת כרונית חמורה בעורות האף המלאה בפוליפים אפיים, בדלקת כל' דם אלרגית וגרנוולומטוטית או בתסומנות היפר-אוזינופילית, בעת תחילת הטיפול בנטול נזקלה תמיישה להזרקה. יש להפסיק נטילת תרופות אלו (במיוחד תרופות הנקראות קורטיקוסטרואידים דרך הפה) אך ורק על-פ' הנחיה הרופא שלך, באופן הדרגת', תחת השגחה ישירה של הרופא שלך ובתלוות בתגובהך לנזקלה תמיישה להזרקה.

הריון והנקה
אם את בהריון, אם את חושבת שיתכן שאתה בהריון או אם את מתכנתת להרות, **התיעצ' עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.**
לא ידוע אם המרכיבים של נזקלה תמיישה להזרקה יכולים לעבור לחלב אם. **אם את מניקה, עלייך להיעזר ברופא לפני השימוש בנזקלה תמיישה להזרקה.**

נήיגה ושימוש במכונות
לא סביר שתופעות הלוואי האפשריות של נזקלה תמיישה להזרקה יופיעו על יכולתך לנוהג או להשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה נזקלה תמיישה להזרקה מכילה נתרן.
התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל מנה של 100 מ"ג, ולכן נחשבת במהותה נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להורות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.
nezkela tamisa la-zorkha nitnata be-zorkha matchta le-ur (subcutaneous injection) – zorkha tatt-urorit.

האחות או הרופא יחליטו אם אתה יכול להזריק לעצמך או שהמטפל שלך יכול להזריק לך.
במידת הצורך, הם יספקו הדרכה להרות לך או למטפל שלך את הדרך הנכונה לשימוש בנזקלה תמיישה להזרקה.

המינון המקבול בדרך כלל הוא:

- **טיפול באסתמה אוזינופילית חמורה – 100 מ"ג, זריקה תת-עורית אחת בכל 4 שבועות.**
- **טיפול בדלקת כרונית חמורה בעורות האף המלאה בפוליפים אפיים (CRSwNP) – 100 מ"ג, זריקה תת-עורית אחת בכל 4 שבועות.**
- **טיפול בדלקת כל' דם אלרגית וגרנוולומטוטית (EGPA) – 300 מ"ג (3 זריקות תת-עוריות של 100 מ"ג), בפעם אחת כל 4 שבועות.**

אתרי ההזרקה צריכים להיות למרחק של 5 ס"מ לפחות זה מזה.
טיפול בתסומנות היפר-אוזינופילית (HES) – 300 מ"ג (3 זריקות תת-עוריות של 100 מ"ג), בפעם אחת כל 4 שבועות.

אתרי ההזרקה צריכים להיות למרחק של 5 ס"מ לפחות זה מזה.
אין לעبور על המנה המומלצת.

הוראות ההזרקה בעט המזרק המוכן לשימוש נמצאות בסוף עליון זה.

אם השתמשת בנזקלה תמיישה להזרקה יותר ממה שאתה צריך

אם אתה חושב שהזרקת יתר או מדי נזקלה תמיישה להזרקה, צור קשר עם הרופא והתיעץ עמו.
אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעלך מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם פספסת מנה של נזקלה תמיישה להזרקה

אם פספסת מנה של נוקלה תמיisha להזרקה, עליך או על המטפל שלך להזיריק את המנה הבאה של נוקלה תמיisha להזרקה ברגע שנצרכתם.

אם לא שמת לב שפספסת מנה עד שכבר הגיע הזמן למנה הבאה שלך, אז פשוט הזרק רק את המנה הבאה כמתוכנן. אם איןך בטוח מה לעשות, התיעץ עם הרופא, הרוקח או האחות.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא. אין להפסיק הזרקות של נוקלה תמיisha להזרקה אלא אם הרופא ייעץ על כן. הפסקת או עצירת הטיפול בגין תמיisha להזרקה עלולות לגרום לתסמינים ולהתקפים של המחלה שלך לחזור.

אם תסמנני המחלה שלך מחייבים במהלך קבלת זריקות של נוקלה תמיisha להזרקה ← פנה לרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זמין להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בגיןה תמיisha להזרקה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מ一封 אחת מהן. תופעות הלואוי של נוקלה תמיisha להזרקה הן בדרך כלל קלות עד בינויות אך עלולות לעתים להיות חמורות.

תגובהות אלרגיות

חלק מהאנשים עלולים לסבול מתגובהות אלרגיות או דמיות אלרגיה. תגובה אלרגית יכולה להיות שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מכל 10 אנשים). הן בדרך כלל מופיעות תוך דקות עד שעות לאחר הזרקה, אך לעיתים תסמנים יכולם להופיע עד למספר ימים לאחר יותר.

התסמינים יכולים לכלול:

- לחץ בחזה, שיעול, קושי בנשימה
- התעלפות, סחרורת, תחושת סחרור (עקב ירידת לחץ דם)
- נפיחות של העפעפים, הפנים, השפתיים, הלשון או הפה
- חרפת
- פריחה

← יש לפנות מיד לעזרה רפואי אם אתה חושב שייתכן כי הנר סובל מתגובה אלרגית.

אם יתכן שכוחית תגובה דומה לכל סוג של זריקה או תרופה:

← יש לספר על כן לרופא לפני שאתה מקבל בגיןה תמיisha להזרקה.

תופעות לוואי נוספת

**תופעות לוואי שכיחות מאוד
עלולות להופיע ביותר מ- 1 מכל 10 אנשים:**

- כאב ראש

תופעות לוואי שכיחות

עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים:

- זיהום בחזה – התסמינים עלולים לכלול שיעול וחום (טמפרטורת גוף גבוהה)
- זיהום בדרכי השתן (דם בשתן, כאב בעת מתן שתן ועלייה בתכיפות מתן שתן, חום, כאב בגב התחתון)
- כאב בבטן העליונה (כאב בקיבה או חוסר נוחות בחלק העליון של הקיבה)

- חום (טמפרטורת גוף גבוהה)
- אקזמה – כתמים אדומים ומגרדים על העור
- תגבות במקום ההזרקה (כאב, אדומות, נפיחות, גרד ותחושת שריפה של העור באזור הקרב במקום ההזרקה)
- כאב גב
- כאב פרקים (arthralgia) (כאב גרון)
- דלקת הלוע (כאב גרון)
- גודש באף (אף סתום)

תופעות לוואי שאין שכיחות

עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 100 אנשים**:

- שלבקת חגורת (herpes zoster, shingles)

תופעות לוואי נדירות

עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 1,000 אנשים**:

- TAGBOVOT ALERGIOT CHMOROT (אנפילקזיס)

← פנה מיד לרופא או לאחות, אם אתה מפתח תסמין כלשהו מתרסינים אלה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמלה או כאשר אתה **סובל** מתופעת לוואי
שלא צינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא, הרוקח או האחות.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האخرון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקדר (בין 2°C ל-8°C).
- אין להקפיא.
- יש לאחסן באריזה המקורי כדי להגן מפני אור.
- במידה הצורך, ניתן להוציא מהמקדר ולשמור באריזה שלא נפתחה עד 7 ימים, בטמפרטורת החדר (עד 30°C), מוגן מפני אור ולא יאוחר מעתירך התפוגה של התכשיר. יש להשליך אם נותר מחוץ למקרר יותר מ-7 ימים.
- לשימוש בתוך 8 שעות מפתיחה אריזת הקרטון. יש להשליך אם לא נעשה שימוש בתוך 8 שעות.
- אין להשליך תרופה לביב או לפסולת הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. עצדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- **נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:**

Sucrose, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, polysorbate 80, EDTA disodium dihydrate, water for injection.

- **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה**

נוקלה תמיישה להזרקה משוקקת בעט מזרק מוקן לשימוש חד-פעמי המכיל 1 מ"ל תמיישה שקופה

עד מבה"קה, חסרת צבע עד בעלת גוון צהוב בהיר עד חום בהיר.
כל אריזה מכילה 1 עט מזרק מוכן לשימוש או 3 עטי מזרק מוכנים לשימוש.
יתכן ולא כל גודלי האריזות ישווקו.

- **בעל הרישום:** גלקסוסומיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.
- **היצרן:** גלקסו אופריאנס אנגליה בע"מ, ברנרד קאסל, אנגליה.
- מסמך רישום התרכופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 168-36652-06-168.
- נערך בספטמבר 2024.

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרכופה מיועדת לבני שני המינים.

7. הוראות שלב אחר שלב להזרקה בעט המזרק המוכן לשימוש

הזרק פעם ב-4 שבועות.

עקוב אחר ההוראות שלහן כיצד להשתמש בעט המזרק המוכן לשימוש.
אי-מיילי אחר ההוראות אלו עלול להשפיע על תפקודו התקין של עט המזרק המוכן לשימוש.
עליך גם לעבור הדרכה כיצד להשתמש בעט המזרק המוכן לשימוש.
ኖקלה תמיישה להזרקה בעט מזרק מוכן לשימוש מיועדת לשימוש **תת-עורית בלבד**.

כיצד לאחסן את נוקלה תמיישה להזרקה




- יש לאחסן במקדר (בין 2°C ל-8°C) לפני השימוש.
- אין להקפייא.
- יש לשמור באירועת הקרטון כדי להגן מפני אור.
- יש להרחק מהישג ידים וטווח ראייתם של ילדים.
- במידה הצורך, ניתן להוציא מהמקדר ולשמור באירועה שלא נפתחה עד 7 ימים, בטמפרטורת החדר (עד 30°C), מוגן מפני אור ולא יותר מ-7 ימים.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 30°C.
- לשימוש בתוך 8 שעות מפתיחת אריזת הקרטון. יש להשליך אם לא נעשה שימוש בתוך 8 שעות.

לפני השימוש בנוקלה תמיישה להזרקה

עת המזרק המוכן לשימוש מיועד לשימוש חד-פעמי ויש להשליכו לאחר מכון.


- אין לחלוק את נוקלה תמיישה להזרקה בעט מזרק מוכן לשימוש שלך עם אדם אחר.
- אין לנער את העט.
- אין להשתמש בעט אם נפל על משטח קשה.
- אל תשתמש בעט אם הוא נראה פגום.
- אל תסיר את מכסה המחת עד ממש לפני ההזרקה שלך.

הכר את חלקו עט המזרק המוכן לשימוש

התקן	לא לפני השימוש	לא לאחר השימוש
	 <p>מבחן (אינדיקטור) צורה (ניתן לראותו כאשר הזרקה הושלמה)</p>	 <p>תਊית מעзор חלון בדיקה (התרופה בפנים) מגן מacht זהב (המחט בפנים) מכסה מacht שקוּף</p>
1. הכין את מה שאתה צריך		
	<p>מצא משטח נוח, מואר היטב ונקי. ודא שיש בהישג ידך:</p> <ul style="list-style-type: none"> • נוקלה תמייה להזרקה בעט מזרק מוכן לשימוש • מטלית אלכוהול (לא כלולה באריזה) • פד גזזה או צמר גפן (לא כלול באריזה) <p>אל תבצע את ההזרקה אם אין לך כל האביזרים הרשומים מעלה.</p>	
2. הוציא את עט המזרק המוכן לשימוש		
		
	<p>הוציא את אריזת הקרטון מהמקרר. בדוק שאטמי הביטחון אינם שבורים.</p> <ul style="list-style-type: none"> • הוציא את המגש מתוך אריזת הקרטון. • קלף את היכסי מהמגש. • אחוז במרקץ העט ובזהירות הוציא אותו מהמגש. <p>הניח את העט על משטח נקי ושטוח, בטמפרטורת החדר, הרחק מאור שימוש ישיר והרחק מהישג ידם של ילדים.</p> <p>אל תשתמש בעט אם אטם הביטחון על אריזת הקרטון שבור. אל תסיר את מכסה המחט בשלב זה.</p>	
3. בדוק והמתן 30 דקות לפני השימוש		
		

- בדוק את תאריך התפוגה שעיל תווית העט.
- הסתכל בחולון הבדיקה כדי לבדוק שהנוזל צלול (נקוי מעכירות או חלקיקים) וחסר צבע או בעל גוון צהוב בהיר עד חום בהיר.
- זה נכון לראות בוועת אוויר אחת או יותר.
- המtan 30 דקות (ולא יותר מ-8 שעות) לפני השימוש.
- אל תשמש אם תאריך התפוגה חלוף.
- אל תחמס את העט במיקרוגל, במים חמימים, או באור שמש ישיר.
- אל תזריק אם התמיסה נראהיה עכורה, בצבעו שונה, או אם יש בה חלקיקים.
- אל תשמש בעט אם חלפו יותר מ-8 שעות מפתיחת אריזת הקרטון.
- אל תסיר את מכסה המחת במהלך שלב זה.


4. בחר את אזור ההזרקה



- אתה יכול להזריק נוקלה Tamishe להזרקה בירך או בבטן שלך.
- אם מישחו אחר מזריק לך, הוא יכול להזריק גם בזרוע העליונה שלך.
- אם נחוצה לך יותר מזריקה אחת כדי להשלים מנה מלאה שנרשמה עבורה, שמור על מרחק של 5 ס"מ לפחות בין כל אחד מאזוריו ההזרקה.

אל תזריק במקום העור פצע, רגש, אדום או קשה.
אל תזריק במרחק קטן מ-5 ס"מ מהטבור.

5. נקה את אזור ההזרקה



- רחץ את ידיך עם סבון ומים.
- נקה את אזור ההזרקה על-ידי ניגוב העור במלילת אלכוהול ואפשר לעור להתיבש באויר.

הזרק


6. הסר את מכסה המחת השקוּף



- הסר את מכסה המחט השקוף מהעט על-ידי משיכת ישירה חזקה.
- אל תדאג אם תראה טיפת נוזל בקצה המחט, זה תקין.
- הזרק מיד לאחר שהסרת את מכסה המחט ולא מעבר ל-5 דקוטר מרגע שהסרת את מכסה המחט.

אל תיגע במגן המחט הצהוב באצבעותיך. זה עלול להפעיל את העט מוקדם מדי ועלול לגרום לפציעה מהמחט.
לאחר ההסרה, **אל** תכסה את העט בחזרה עם מכסה המחט, כיוון שזה עלול להתחיל בעותת את ההזרקה.


7. התחל את ההזרקה שלך



- אחיז בעט באופן צזה שחלון הבדיקה שלו פונה כלפיו, כך שתוכל לראותו אותו, ומגן המחט הצהוב פונה כלפי מטה.
- מיקם את העט ישר מעל אזור ההזרקה כך שמאן המחט הצהוב שטוח על-פני העור שלך, כפי שניתן לראות בציור מעלה.
- להתחילה הזרקה, דחוף את העט כל הדרך מטה והמשך להחזיק אותו כלפי מטה כנגד העור שלך. מגן המחט הצהוב יחליק מעלה לתוך העט.
- אתה אמור לשמוע את צליל ה"קליק" הראשון שמסמן את תחילת ההזרקה שלך.
- המחוון (אינדיקטורי) הצהוב ינוע למטה דרך חלון הבדיקה בזמן שאתה מקבל את המנה שלך.

אל תרים את העט מהעור שלך בשלב זה, כיון שאז"תך ולא תקבל את המנה המלאה של התרפיה. "יתכן שההזרקה תימשך 15 שניות עד להשלמה.
אל תשתמש בעט אם מגן המחט הצהוב אינו מחליק מעלה כפי שהוא. השלים אותו (ראה שלב 9), והתחל שוב עם עט חדש.

8. החזק את העט במקומו כדי להשלים את הזריקה



- המשך להחזיק את העט כלפי מטה עד שאתה שומע את ה"קיליק" השני, והמעצור והמחזון (אינדיקטור) הצהוב מפסיקים לנעו וממלאים את חלון הבדיקה.
 - המשך להחזיק את העט במקומו וספור עד 5. לאחר מכן הרם את העט מהעור שלך.
 - אם לא שמעת את ה"קיליק" השני:
 - בדוק אם חלון הבדיקה מלא במחוזן (אינדיקטור) הצהוב.
 - אם איןך בטוח, החזק את העט כלפי מטה במשך 15 שניות נוספת על מנת לוודא שההזרקה הושלמה.
 אל תרים את העט עד אשר אתה בטוח שהשלמת את ההזרקה שלך.
 - יתכן שתבחין בטייפה קתינה של דם באזורי ההזרקה. זה תקין. במידה הצורך, לחץ כדור צמר גפן או גaza באזורי למשך כמה רגעים.
- אל תשפשף את אזור ההזרקה.**

השלך

9. השלך את העט המשומש

- השלך את העט המשומש ואת מכסה המחת בהתאם להנחיות. במידה הצורך, בקש מהרופא או הרוקח הסבר.
- **הרחק את העטים המשומשים ומכווי המחת מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים.**

סימני המסחר הינם בבעלות או בזכיונות של קבוצת החברות של GSK.
©2024 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.