

هكسাকাپرون أقراص

التركيب

يحتوي كل قرص على: حمض ترانيكساميك 500 ملغ

(Tranexamic Acid 500 mg)

لمعلومات حول المواد غير الفعالة في المستحضر - أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للآخرين. هو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج الأنزفة.

الفصيلة العلاجية

يزيد من تخثر الدم - مضاد حلّ الفيبرين.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة (حمض ترانيكساميك) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).
- وُجدت لديك مشاكل خطيرة في الكلى (قصور كلوي).
- وُجد لديك مرض إنصمامي - خثاري نشط (فرط تخثر الدم).
- وُجدت لديك سابقة لخثار وريدي أو شرياني.
- وُجدت لديك سابقة لإختلاجات.
- كنت معرضاً لخطورة حدوث نزف مفرط نتيجة إضطراب في التخثر يسمى consumption coagulopathy.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ هكسাকাپرون إحك للطبيب إذا:

- وُجد لديك دم في البول، جراء إرتفاع في خطورة إنسداد المسالك البولية.
- وُجد لديك ذات مرة نزف خارج عن السيطرة.
- وُجد لديك تخثر منتشر داخل الأوعية الدموية (DIC)، مرض يبدأ فيه الدم بالتخثر في كافة الجسم.
- كنت تتناول، يومياً ولفترة زمنية طويلة، دواء لعلاج مرض وراثي يسمى وذمة تحسسية وراثية (angioneurotic oedema - HANO). إذا كان الأمر كذلك، فمن الجائز أن تحتاج إلى إجراء فحوص عينيّن وفحوص دم منتظمة لفحص الأداء الوظيفي للكبد.
- لديك طمث غير منتظم.
- حدث لك في الماضي حادث إنصمامي - خثاري (thromboembolic event).
- عانى أحد أفراد عائلتك من مرض إنصمامي - خثاري (فرط تخثر - thrombophilia).
- لديك مرض كلوي.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية حالة للفيبرين (تساعد على إذابة الخثرات الدموية)، مثل ستريپتوكيناز، لأن حمض ترانيكساميك (المادة الفعالة في الدواء هكسাকাپرون) يمنع عمل هذه الأدوية.
- أقراص منع الحمل - قد تزيد من خطورة تشكل خثرات دموية.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إذا كنت تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

السياقة وإستعمال الماكنات

للدواء تأثير ضئيل أو لا تأثير له على القدرة على السياقة. مع ذلك، يمكن أن يظهر إضطراب في الرؤية بعد تناول حمض ترانيكساميك (المادة الفعالة في الدواء).

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في القرص وبالتالي يعتبر خالٍ من الصوديوم.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

السحق/الشطّر/المضغ

بالإمكان شطّر القرص في خط الشطر.

لا تتوفر معلومات بخصوص السحق أو المضغ.

يجب دائماً تناول الدواء مع كأس من الماء.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

إن تناول مقدار دوائي مفرط من حمض ترانيكساميك قد يسبب إسهال، غثيان، تقيؤ، دوار أو دوخة عند النهوض إلى وضعية الوقوف.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المخصص، فلا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. تناول المقدار الدوائي التالي كما هو مخطط.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال هكساكابترون قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية من الجائز ألا تعاني أياً منها.

توقف عن تناول الدواء وتوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية نادرة (أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل 1 من بين 1,000):

- خثرة دموية في الرجل أو في الرئتين، الأعراض المحتملة هي:
 - ألم، إنتفاخ أو إحمرار في الرجل
 - صعوبة في التنفس أو ضيق تنفس
 - ألم في الصدر، الذي قد يتفاقم أثناء التنفس

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل 1 من بين 10,000):

رد فعل تحسسي، الأعراض المحتملة هي: إنتفاخ الحنجرة أو اللسان؛ صعوبة في التنفس أو ضيق تنفس؛ صعوبة في البلع، ضغط في الحنجرة أو بحة؛ صفير، سعال أو تنفس صاخب؛ طفح منتفخ، بارز أو حاك

توقف عن تناول الدواء وتوجه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية نادرة (أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل 1 من بين 1,000):

- حكة، إحمرار أو إنتفاخ في الجلد
- مشاكل في الرؤية، خاصة في رؤية الألوان
- خثرة دموية في العين. قد يسبب هذا الأمر نزف في العين أو فقدان الرؤية

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل 1 من بين 10,000):

- خثرة دموية في الأوعية الدموية (حالة تُسمى خثار - thrombosis)

• غثيان، تقيؤ، إسهال - تكون هذه الأعراض عادة طفيفة وتزول سريعاً جداً، لكن إذا إستمرت، إحك لطبيبك أو للصيدلي عن ذلك.

أعراض جانبية شيعوها غير معروف (لا يمكن تحديد الشيعوع من المعلومات المتوفرة):

إختلاجات، خاصة في حالات إساءة الإستعمال

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية، في العلبة الأصلية للحماية من الضوء.

• لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, magnesium stearate, methylcellulose, talc, colloidal silicon dioxide.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

قرص أبيض، مستدير ومسطح، ذو أطراف مائلة، في جانب واحد خط للشطر وفي الجانب الثاني مطبوع "TEVA".

تحتوي كل علبة على 20 أو 30 قرصاً معبأ ضمن لويحات (بليستر).

من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

إسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه

تيفع إسرائيل م.ض.

شارع دفوراً هنقيته 124، تل أبيب 6944020

تم إعداد هذه النشرة في أيار 2024.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 016.35.24864

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.