

עלון לצרcn לפי תקנות הרוקחים (תקנירט) התשמ"א- 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

רמותיב 250 רמותיב 500

טבליות מצופות

החומר הפעיל:

כל טבליה של **רמותיב 250** מכילה: 250 מ"ג תמצית יבשה של צמח ההיפריקום (St. John's wort).
כל טבליה של **רמותיב 500** מכילה: 500 מ"ג תמצית יבשה של צמח ההיפריקום (St. John's wort).

התמצית המיחודה, הנקרעת Ze117, מופקת באמצעות תהליך מצוי יהודי מגן בפטנט.

התמצית בטבליה של **רמותיב 250** מכילה (בין יתר המרכיבים) 0.5 מ"ג היפריצין.

התמצית בטבליה של **רמותיב 500** מכילה (בין יתר המרכיבים) 1 מ"ג היפריצין.

התמצית עשויה להכיל כמות מזערית של היפרפורין.

רשימת המרכיבים הבוטלי פיעלים ראה סעיף 6. ראה גם 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה' בסעיף 2.

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה בעבר. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי
דומה.

1. מה מיועדת התרופה?

רמותיב מקל על תסמיינים של דיכאון קל עד בינוני, המלווה בחרדה, מצבי מתח, אי שקט פנימי, מצב רוח ירודים,
מצב רוח משתנים, קשיי הידרמות או קושי לשון למשך כל הלילה.

קבוצה רפואייתית:

וגד דיכאון טבעי ממוקור צמחי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכיל התכשיר (לרשימת המרכיבים הבוטלי פיעלים, ראה סעיף 6).
- אם אתה נוטל תרופה נגד דיכאון (מכל סוג) או כל תרופה אחרת עם פעילות סרוטונינרגית.
- אם אתה סובל או סבלת בעבר מרגישות לאור, כולל אור שמש.
- ילדים מתחת לגיל 6.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- תרופות נוגדות דכוון מעילות את הסיכון להתנהגות ומחשובות אובדן. במידה ומחניים בשינויים התנהגותיים (החמרת דכוון, מחשבות אובדן וכוכ), יש לפנות מיד לרופא.
- אין להשתמש בתרופה זו לתקופה ממושכת מבלי להיוועץ ברופא.
- אם אתה עומד לעבר אבחון או טיפול פוטודינמי (באמצעות אור), או אם אתה עומד לעבר ניתוח, יש להודיע לרופא המטפל ו/או למරדים שאתה נוטל תרופה זו. יש להפסיק לקחת רמותיב לפחות 5 ימים לפני ניתוחים. ניתן לקחת שוב רק לאחר התיעצות עם הרופא המטפל.
- במהלך הטיפול ברמותיב, יש להגן על העור והעיניים מחשיפה לשמש. לעיתים נדרש, במיוחד באנשים בעלי עור בהיר, יתכונו תופעות לוואי בעיניים או בעור (למשל אודם הדומה לכוכית שמש) לאחר נטילת רמותיב וחשיפה לשמש. במקרה זה - יש להפסיק את הטיפול ולהימנע מחשיפה לשמש (או לקרינת UV אחרת) כשבועיים.
- במהלך הטיפול יש להימנע מביקור בסולרים או במכוני שיזוף.
- אם אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני Nutzung התרופה.

לפני הטיפול ברמותיב ספר לרופא: אם אתה סובל ממחלות אחרות, או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכלבי, הכלויות/מערכת השתן.

תగובות בין תרופה וטיפול: אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת, כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במיוחד ישליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח את התרופות הבאות (יש לציין כי הרשיימה שלhlen מציינת את החומרים הפעילים בתרופות. אם אין בטוח האם אתה משתמש באחת מהתרופות הללו אנא התייעץ עם הרופא או הרוקח):

- תרופות נגד דיכאון ותרופות סרוטונינרגיות כגון: אמיטריפטילין, פלאוקסטין, בוספiron, טריפטנים ועוד)

שימוש בתרופה ומזון: רצוי ליטול את התרופה עם ארוחה או אחרת.

הריון והנקה: השימוש בתרופה אינו מומלץ בזמן הריון והנקה. אם את בהריון, מנסה להיכנס להריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא.

היגיה ושימוש במכונות: השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי כגון סחרחוות. אם אתה חש בסחרחוות או בתופעות העולות להשפעה על הניגיה או הפעלת מכונות - עלייך לנ��וט זהירות בהיגיה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות.

שימוש בילדים: אין להשתמש בתרופה בילדים מתחת לגיל 6. תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים מתחת לגיל 12.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה: טבליות רמותיב 250 מכילות לקتوز. אם אתה רגיש ללקتوز יש לידע את הרופא לפניו נטילת תרופה זו (ראה סעיף 6). כל טבליית רמותיב מכילה פחות מ-23 מ"ג נטרן וכן יכול להיחשב כמעט נטולת נטרן. כל טבליית רמותיב מכילה כ-120 מ"ג פחמיות והיא מותרת לחולי סוכרת.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מינון בהעדך הוראה אחרת מרופeo:

רמותיב 250: טבליה אחת פעמיים ביום (בבוקר ובערב). רמותיב 500: טבליה אחת פעם ביום (בבוקר או בערב).

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קבועים קבועים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל. יש לצפות שהשפעת התרופה תחל תוך 14 יום.

אין ללווע או לכתוש את הטבליה! אין להצטוף את הטבליה מאחר ואין קוו ח齊ה. יש לבלווע את הטבליה עם מעט מים. רצוי ליטול את התרופה עם ארוחה או אחרת.

אם נטלה בטעות מינון גבואה יותר: אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעל יד מן התרופה, פנה מיד לחדר מין של בית-חולמים והבא אריזת התרופה איתך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהוא ממלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעוצות עם רופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברמותיב עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אם תופעות הלואין אין חולפות או שהן מתרידות או שהן חמירות, יש להתייעץ עם הרופא. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואין. יתכן ולא תסבול אף אחת מהן.

יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא בהופע אודם בעור, רגשות העיניים והעור לשמש (כמו כוויות שם), photosensitivity (נדיר). ראה גם 'אזורות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה'.

תופעות לוואי נוספת:

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-10-1 מטופלים מתוך 100): בעיות מערכת העיכול (כגון כאב בטן), כאב ראש, הזעה, חולשה.

תופעות לוואי שאין שכיחות (מופיעות בפחות מ-1 מתוך 100 מטופלים): סחרחוות, עייפות, אי שקט, פריחה.

תופעות לוואי נדירות (מופיעות ב-1 מתוך 10,000 מטופלים): רגשות העיניים והעור לשמש.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה): מאניה, יובש בפה.

במקרה אחד בו נתקה מנת יתר משמעותית דוח על פרכוסים ובלבול.

אם הופעה תופעת לואי, אם אחת מתופעות הלואי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לואי שלא הזכרה בעלון זה, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לואי, או ע"י כניסה לكيישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנוע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן באזינה המקורי מתחת ל- 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, הטבליות מכללות גם את החומרים הבלטי פיעלים הבאים:

- כל טבליה של רמותיב 250 מכילה:

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, macrogol 6000, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica, macrogol 400, macrogol 20000, propylene glycol, hypromellose, iron oxide red (E172), titanium dioxide (E171).

כל טבליה של רמותיב 250 מכילה כ- 120 מ"ג לקטוז.

- כל טבליה של רמותיב 500 מכילה:

Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, macrogol 6000, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica, macrogol 20000, stearic acid, hypromellose, iron oxide red (E172), titanium dioxide (E171).

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה?

רמותיב 250: טבליות עגולות בצלב ורוד. 60 טבליות באזינת מגשיות.

רמותיב 500: טבליות מאורכות בצלב ורוד. 30 טבליות באזינת מגשיות.

בעל הרישום: מעבדות רפואי בע"מ, ת.ד. 405, ירושלים 9100301

היצרן: מקס זלר סונה AG, שויץ.

מספר רשום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

רמותיב 250 : 130 71 30720

רמותיב 500 : 141 28 31607

נערך בספטמבר 2024.

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון ذכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.