

**نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986**

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

<b>جابابنتين تيفغ</b>	<b>جابابنتين تيفغ</b>
<b>300 ملغ</b>	<b>400 ملغ</b>
<b>كبسولات</b>	<b>كبسولات</b>
التركيبة	التركيبة
تحتوي كلْ كبسولة على:	تحتوي كلْ كبسولة على:
جابابنتين 300 ملغ	جابابنتين 400 ملغ
Gabapentin 300 mg	Gabapentin 400 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسيبات الأرجية انظر البند 2 تحت "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" و البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة **بإمعان حتّى نهايتها قبل استعمالك للدواء**. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وصّف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للأخرين. قد يضرّهم الدواء حتّى لو بدا لك أنّ حالتهم الطّبيّة مشابهة.

**هذا الدواء مخصّص لعلاج الصرع لدى البالغين والمراهقين الذين سنهم فوق 12 عامًا. هذا الدواء مخصّص لعلاج ألم الاعتلال العصبي لدى البالغين من سن 18 عامًا فما فوق.**

**1. لأيّ غرض مخصّص هذا الدواء؟**

الصرع:

لعلاج إضافي للنوبات الجزئية المصحوبة أو غير المصحوبة بتعميم ثانوي لدى البالغين والمراهقين (من سن الـ 12 فما فوق) المصابين بالصرع.

سيصف لك الطبيب جابابنتين تيفغ للمساهمة في علاج الصرع لديك عندما لا ينتج العلاج الحالي الذي تتلقاه السيطرة التامة على وضعك.

**ألام الاعتلال العصبي:**

لعلاج ألام الاعتلال العصبي في الاعتلال العصبي السكري أو الاعتلال العصبي التالي للهربس (neuralgia) لدى البالغين.

سيصف لك الطبيب جابابنتين تيفغ لعلاج ألم الاعتلال العصبي (ألم مزمن ينجم عن ضرر عصبي) بعد الإصابة بالهربس النطاقي أو نتيجة للسكري لدى البالغين.

قد توصف أحاسيس ألام بأنها:

إحساس بالحرق، إحساس بالأخ، ألم خفاق، ألم فجائي، إحساس بالطنع، ألم حدّذ، تقصّصات، إحساس بالوخز، انعدام الإحساس (خدر)، الإحساس "بالدبابيس والإبر" وما شابه ذلك.

**الفصيلة العلاجية:** مضادّ للاختلاجات.

**2. قبل استعمال الدواء**

**لا يجوز استعمال الدواء إذا:**

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعّالة (جابابنتين) أو لأيّ من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء. انظر البند 6.

**تحذيرات خاصة تتعلّق باستعمال الدواء**

**قبل العلاج بجابابنتين تيفغ، أخبر الطبيب إذا:**

- كنت حاملاً أو مرضعاً. انظري "الحمل، الإرضاع والخصوبة" تحت البند 2.
- كنت تعاني من مشاكل في الكليتين. يُحتمل أن يغير الطبيب البرنامج العلاجي.
- كنت تخضع للعلاج بالديال الدموي (لتردد الفضلات في أعقاب قصور الكليتين). أخبر الطبيب إذا نشأ لديك ألم **و/أو** ضعف في العضلات.
- نشأت لديك علامات مثل ألام متواصلة في البطن، غثيان وتقيؤات. توجه فوراً إلى الطبيب لأن هذه قد تكون أعراضاً لالتهاب البنكرياس الحاد.
- كنت تعاني من اضطراب من عدّة أنواع من الاختلاجات التي تشمل النوبات من نوع "الغيبية" ("absence").
- وُجدت لديك اضطرابات في الجهاز العصبي، اضطرابات في التنفّس، أو إذا كان عمرك فوق الـ 65. قد يصف لك الطبيب نظام تجريب مختلفاً.
- تمّ التبليغ عن حالات من الاعتماد على جابابنتين ومعاقرته في الدراسات التي أجريت بعد التسويق. أخبر الطبيب إذا كان لديك ماضٍ من الاعتماد أو المعاقره.
- نشأت أفكار انتحارية أو أفكار للإضرار بالفسف لدى عدد قليل من المرضى الذين عولجوا بأدوية مضادة للصرع مثل جابابنتين. توجه فوراً إلى الطبيب إذا وُجدت لديك أفكار كهذه.

**معلومات هامة عن ردود فعل خطيرة محتملة**

ينشأ رد فعل تحسسي أو رد فعل جلدي خطير لدى عدد قليل من المرضى الذين يتلقون العلاج بجابابنتين، وقد يتطور هذان إلى مشكلة أكثر خطورة إذا لم يتمّ علاجهما. يجب عليك أن تعرف الأعراض لكي تستطيع أن تميّزها خلال فترة العلاج بجابابنتين تيفغ. اقرأ وصف هذه الأعراض في البند 4: "الأعراض الجانبية" تحت "يجب التوجّه فوراً إلى الطبيب إذا نشأ لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية بعد تناول الدواء لأنّها قد تكون خطيرة".

توجّه فوراً إلى الطبيب في حالات ضعف العضلات، الحساسية في العضلات أو الألم في العضلات وخاصةً إذا شعرت بالترامن مع ذلك بأنك مريض أو أنّ حرارتك مرتفعة. قد تكون هذه علامات على انحلال غير سويّ للعسل قد يشكّل خطرًا على الحياة ويسبّب مشاكل في الكليتين. بالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن يطرأ تغيير على لون البول وتكون هناك تغيرات في نتائج فحص الدم (ارتفاع في مستويات كرياتين فسوفوكيناز في الدم).

**الأدوية الأخرى وجابابنتين تيفغ**

**إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.**

- خاصةً إذا كنت تستعمل الأن أو استعملت مؤخرًا:
- أدوية للاختلاجات، للاضطرابات النوم، للاكتئاب، للقلق أو لأي مشاكل عصبية أو نفسية.
- أدوية من فصيلة الأفيونيات مثل المورفين - قد تزيد هذه من تأثير جابابنتين تيفغ.
- بالإضافة إلى ذلك، قد يسبب دمج جابابنتين تيفغ مع الأفيونيات ميلا إلى النوم، تعبًا (تهدئة)، انخفاضًا في وتيرة التنفّس أو موتًا.
- قد يسبب تناول جابابنتين تيفغ بالترامن مع مضادات الحموضة التي تحتوي على الألومنيوم والمنغنيزيوم انخفاضًا في امتصاص جابابنتين تيفغ من المعدة. لذلك يوصى بتناول جابابنتين تيفغ بعد ساعتين على الأقل من تناول مضادات الحموضة.

من غير المتوقع أن يؤثر جابابنتين تيفغ على فعالية الأدوية الأخرى المضادة للصرع أو حبوب منع الحمل.

قد يؤثر جابابنتين تيفغ على نتائج فحوص مخبرية معيّنة. إذا تعيّن عليك إعطاء فحص بول، فأخبر الطبيب أو الطاقم الطبي عن الأدوية التي تستعملها.

**استعمال الدواء والطعام**

يُستعمل الدواء مع الطعام أو بدونه.

**الحمل، الإرضاع والخصوبة**

يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، إذا كنت تظنين أنك قد تكونين حاملاً أو إذا كنت تحططين للحمل.

**الحمل**

يمكن استعمال جابابنتين تيفغ خلال الثلث الأول من الحمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. إذا كنت تحططين لإحداث حمل أو إذا كنت حاملا أو تظنين أنك حامل، فتحدّثي إلى طبيبك فوراً.

إذا حملت وأنت مصابة بالصرع، فمن المهم ألا تتوقفي عن استعمال الدواء دون استشارة طبيبك أولاً، لأن هذا الشيء قد يفاقم مرضك. تقام الصرع لديك من شأنه أن يشكّل خطراً عليك وعلى طفلك الذي لم يولد بعد.

في دراسة استقصت معطيات من نساء في دول شمال أوروبا من تناولن جابابنتين في 3 أشهر من الحمل، لم يكن هناك تزايد في خطر نشوء عيوب خلقية أو مشاكل في تطور الأداء الوظيفي الدماغي (اضطرابات في التنفّس العصبي). مع ذلك، كان هناك تزايد في خطر الوزن المنخفض عند الولادة والولادة المبكرة لدى الأطفال الرضع الذين أنجبتهن نساء استعملن جابابنتين في فترة الحمل.

عند استعماله في فترة الحمل، قد يؤدي جابابنتين تيفغ إلى نشوء أعراض الانسحاب (الطام) لدى الأطفال الرضع الذين ولدوا للثو. قد يتزايد هذا الخطر عند استعمال جابابنتين سوياً مع مسكّنات الألام الأفيونية (أدوية لعلاج الألم الشديد).

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا حملت خلال فترة العلاج بالدواء، إذا كنت تظنين أنك قد تكونين حاملاً أو كنت تحططين للحمل خلال فترة استعمال الدواء.

لا يجوز إيقاف العلاج بهذا الدواء بشكل فجائي لأنّ ذلك قد يؤدي إلى ظهور الاختلاجات من جديد، والتي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة عليك وعلى طفلك.

**الإرضاع**

ينتقل جابابنتين تيفغ عبر حليب الأم. بما أن تأثيره على الطفل الرضيع غير معلوم، فيوصى بعدم الإرضاع خلال فترة استعمال جابابنتين تيفغ.

**الخصوبة**

في الدراسات التي أجريت على الحيوانات لم يكن هناك تأثير على الخصوبة.

**السياقة واستعمال الماكات**

استعمال هذا الدواء قد يسبب الدوار، النعاس والتعب.

يجب عليك الامتناع عن السياقة، تشغيل الماكات أو القيام بنشاطات أخرى من شأنها أن تكون خطيرة، حتى تعرف كيف يؤثر الدواء عليك وعلى قدرتك على تنفيذ هذه الأعمال.

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

يحتوي الدواء جابابنتين تيفغ بجرعة 300 ملغ على صينغ أصفر رقم 6 (FD&C Yellow 6 / Sunset Yellow FCF)، والذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.

**3. كيف ستستعمل الدواء؟**

يجب استعمال المستحضر دوماً وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددها الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية المتبّعة هي:

يجب استعمال هذا الدواء في أوقات منتظمة، كما حدّد من قبل الطبيب المعالج. سيتمّ عادةً إعطاء الجرعة الدوائية، التي سيحددها لك الطبيب، بشكل تدريجيّ. تتراوح الجرعة الدوائية الابتدائية بين 300 ملغ إلى 900 ملغ في اليوم. بعد ذلك قد يأمرك الطبيب برفع الجرعة الدوائية، إلى أن تصل إلى جرعة دوائية يومية قصوى من

3600 ملغ، مقسّمة إلى 3 جرعات منفردة، يعني مرّة واحدة في الصباح، مرّة واحدة في الظهر ومرّة واحدة في المساء.

هذا الدواء مخصّص لعلاج الصرع لدى البالغين، المراهقين والأولاد الذين عمرهم أكثر من 12 عامًا.

هذا الدواء مخصّص لعلاج ألم الاعتلال العصبي لدى البالغين من سن 18 عامًا فما فوق.

**إذا كنت تعاني من مشاكل في الكليتين أو كنت تخضع للعلاج بالديال الدموي**

قد يصف لك الطبيب جرعة دوائية و/أو نظام تجريب مختلفين.

**إذا كان عمرك أكثر من 65 عامًا**

عليك تناول جرعة جابابنتين تيفغ الدوائية المتبّعة إلا إذا كنت تعاني من مشاكل في الكليتين. قد يصف لك الطبيب جرعة دوائية و/أو نظام تجريب مختلفين إذا كنت تعاني من مشاكل في الكليتين.

إذا كان لديك انطباع بأن تأثير الدواء أقوى أو أضعف من اللازم، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو الصيدلي.

**يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

يجب دانهاً بلع الكبسولة بأكملها مع الكثير من الماء.

لا يجوز فتح الكبسولة ونثر محتواها! لأنه لم يتمّ فحص تأثير أشكال الإعطاء هذه. يوصى بتناول جابابنتين تيفغ بعد ساعتين على الأقل من تناول مضادات الحموضة.

يجب الاستمرار في استعمال جابابنتين تيفغ إلى أن يرشدك الطبيب إلى التوقّف عن ذلك. **إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم**

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

قد يسبب تناول جرعة دوائية مفرطة ازدياد الأعراض الجانبية بما في ذلك فقدان الوعي، الدوار، الرؤية المزدوجة، الكلام (النطق) غير الواضح، النعاس والإسهال.

**إذا نسبت تناول الدواء**

إذا نسبت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب فيجب تناول جرعة فور تدنّرك إلا إذا كان موعد الجرعة التالية. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة بأيّ حال من الأحوال للتعرض عن الجرعة المنسية. يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

حتّى لو طرأ تحسّن على حالتك الصحيّة، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا تتوقّف عن استعمال الدواء إلا بموجب أمر من الطبيب. إذا كان عليك إيقاف العلاج فيجب فعل ذلك بشكل تدريجي طوال أسبوع على الأقل. إذا توقّفت عن استعمال الدواء بشكل فجائي أو قبل تلقّي إرشاد إلى فعل ذلك من الطبيب فيزداد خطر حدوث الاختلاجات.

**لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكّد من الجرعة في كلّ مرّة تتناول فيها دواء.** ضع النظرات الطّبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

**4. الأعراض الجانبية**

مثل أيّ دواء، قد يؤدي استعمال جابابنتين تيفغ إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلقّ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أيّ واحد منها. **يجب التوجّه فوراً إلى الطبيب إذا نشأ لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية بعد تناول الدواء لأنّها قد تكون خطيرة:**

- ردّ فعل تحسسيّ خطير في الجلد يتطلّب علاجًا فوراً، انتفاخ الشفتين والوجه، طفح جلدي واحمرار و/أو تساقط الشعر (قد تكون هذه أعراضاً لردّ فعل تحسسيّ خطير).
- ألم متواصل في البطن، غثيان وتقيؤ - لأنّ هذه قد تكون أعراضاً لالتهاب البنكرياس الحادّ.
- مشاكل في التنفّس، وإذا كانت خطيرة فقد تحتاج إلى علاج طارئ لكي تستمرّ في التنفّس بشكل عاديّ.
- قد يسبّب جابابنتين تيفغ ردّ فعل تحسسيّاً خطيراً أو يشكّل خطرًا على الحياة ومن شأنه أن يؤثر على الجلد أو على أجزاء أخرى من الجسم، مثل الكبد أو خلايا الدم. قد يظهر الطفح، أو لا يظهر، كجزء من ردّ الفعل هذا. من المحتمل أن تضطرّ إلى الرقود في المستشفى أو التوقّف عن استعمال جابابنتين تيفغ نتيجة لردّ الفعل هذا. راجع الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من أحد الأعراض التالية:
  - طفح جلديّ
  - شرى
  - حمّى
  - تورم لا يتلاشى في الغدد
  - انتفاخ الشفتين واللسان
  - اصفرار الجلد أو بياض العينين
  - ظهور كدمات شاذة أو نزيف دمويّ شاذّ
  - تعب أو ضعف شديداً
  - ألم غير متوقّع في العضلات
  - تورّلات متواترة
- قد تكون هذه الأعراض علامات أوّلية على ردّ فعل خطير. يجب أن يقوم طبيب بفحصك ويتأخّذ قرار بشأن ما إذا كنت تستطيع أن تستمرّ في استعمال الدواء.

- إذا كنت تخضع للعلاج بالديال الدموي، فأخبر الطبيب إذا نشأ لديك ألم و/أو ضعف في العضلات.

**أعراض جانبية إضافية:**

**أعراض جانبية شائعة جدًّا (تظهر لدى أكثر من شخص 1 من كلّ 10 أشخاص):**

- تورّث فيروسي
- شعور بالنعاس، دوار، انعدام التنسيق الحركيّ
- شعور بالتعب، حمّى

**أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من كلّ 10 أشخاص):**

- التهاب الزنتين، تلوّثات في المسالك التنفسية، تلوّثات في المسالك البولية، التهاب الأذنين أو تلوّثات من نوع آخر
- تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء
- قيهم (أنوريكسيا)، زيادة في الشهية
- غضب تجاه الآخرين، ارتباك، تعيّرات في المزاج، اكتئاب، قلق، عصبية، صعوبة في التفكير
- اختلاجات، حركات لا إرادية، صعوبات في الكلام (النطق)، فقدان الذاكرة، ارتعاش، صعوبات في النوم، صداع، جلد حسّاس، انعدام الإحساس (خدر)، صعوبات في التنسيق الحركيّ، حركات غير عادية للعينين، تزايد أو تضاول أو انعدام المنعكسات
- رؤية مشوشة، رؤية مزدوجة
- دوار (فيرتيجو)
- ضغط دم مرتفع، تورّد (احمرار الوجه) أو توسّع الأوعية الدموية
- صعوبات في التنفّس، التهاب القصبات، ألم في الحلق، سعال، جفاف في الأنف
- تقيؤ، غثيان، مشاكل في الأسنان، التهاب اللثة، إسهال، ألم في البطن، عسر الهضم، إسهك، جفاف في الفم أو الحلق، غازات
- انتفاخ الوجه، كدمات، طفح جلديّ، حكة، حبّ الشباب
- ألم في المفاصل، ألم في العضلات، ألم في الظهر، تشنّجات
- ضعف جنسي لدى الرجال
- انتفاخ في الرجلين والذراعين، صعوبات في المشي، ضعف، ألم، شعور بالمرض، أعراض شبيهة بالإنفلونزا
- انخفاض في كثية خلايا الدم البيضاء، ارتفاع الوزن
- إصابة عارضة، كسر، خشن

**أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من كل 100 شخص):**

- عدم الهدوء (حالة من التمللم المزمن والحركات غير المقصودة والعدمية الهديف)
- ردّ فعل تحسسيّ مثل الشرى
- انخفاض في الحركة
- نبض سريع
- صعوبة في البلع
- انتفاخ قد يشمل الوجه، الجسم والأطراف
- نتائج شاذة في فحوص الدم تشير إلى وجود مشاكل في الكبد
- مشاكل نفسية
- سقطات
- ارتفاع في مستوى الجلوكوز في الدم (يُشاهد غالبًا لدى متلقي العلاج المصابين بالسكري)

**أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من كلّ 1.000 شخص):**

- انخفاض في مستويات الجلوكوز في الدم (يُشاهد غالبًا لدى متلقي العلاج المصابين بالسكري)
- فقدان الوعي
- صعوبة في التنفّس، أنفاس ضحلة (تنبيب تنفسي)
- أعراض جانبية تمّ التبليغ عنها بعد تسويق الدواء ومدى شيوعها غير معروف:**
- انخفاض في مستوى الصفائح الدموية
- أفكار انتحارية
- هلوسات

حركات جسمانية شاذة مثل اللتواء، حركات لا إرادية وتصلّب

طنين في الأذنين

مجموعة من الأعراض الجانبية التي قد تشتمل على غدد ليفماوية منتفخة، حمّى، طفح جلدي والتهاب في الكبد، والتي تظهر سويةً

- اصفرار الجلد وبياض العينين (يرقان)، التهاب الكبد
- قصور كلوي حاد، سلس البول
- تضخم نسيج الثدي، تضخم الثديين
- الأعراض الجانبية الناتجة عن إيقاف فجانبي للعلاج بجابابنتين تيفغ (قلق، صعوبات في النوم، غثيان، ألم متوقّ، ألم في الصدر
- انحلال الألياف العضلية (انحلال اليربيدات)
- تغير في نتائج فحص الدم (ارتفاع في مستويات كرياتين فسوفوكيناز)
- مشاكل في الأداء الوظيفي الجنسي بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى الإثباع، تأخير القذف
- مستوى منخفض للصوديوم في الدم
- تأق (رد فعل تحسسي خطير ويشكّل خطرًا على الحياة، يشتمل على صعوبات في التنفّس، انتفاخ الشفتين، الحلق واللسان، وضعف دم منخفض مما يستلزم علاجًا طارئًا)
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تقافم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.**
- بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لزيارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov) والذي يوجّه إلى الاستمارة المتّصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

**5. كيف يجب تخزين الدواء؟**

يجب تخزين الدواء في مكان جافّ فيما دون 25°C.

- أمنع التسمّم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

**6. معلومات إضافية**

**يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعّالة أيضًا على:**

جابابنتين تيفغ 300 ملغ:

Talc, pregelatinized starch, FD&C red 3, FD&C yellow 6, titanium dioxide, gelatin, printing ink.

جابابنتين تيفغ 400 ملغ:

Talc, pregelatinized starch, red iron oxide, yellow iron oxide, black iron oxide, titanium dioxide, gelatin, printing ink.

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:**

**جابابنتين تيفغ 300 ملغ:** كبسولة جيلاتين صلبة، برتقالية اللون، مليئة بمسحوق لونه أبيض-كريمي يحتوي على كتل صغيرة. مطبوع على جسم الكبسولة وعلى غطائها: 93 و-39.

**جابابنتين تيفغ 400 ملغ:** كبسولة جيلاتين صلبة، بنية اللون، مليئة بمسحوق لونه أبيض-كريمي يحتوي على كتل صغيرة. مطبوع على جسم الكبسولة وعلى غطائها: 93 و-40.

يعبأ الدواء في شرائط (بليستر) في عبوة تحتوي على 100 كبسولة.

**اسم المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه:**

تيفغ إسرائيل م.ض.، شارع دُفوره هاتيفيه 124، تل أبيب 6944020

تمّ تحرير النشرة في تموز/يوليوز 2024 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

**رقم تسجيل الدواين في سجل الأدوية السريرية في وزارة الصحة:**

جابابنتين تيفغ 300 ملغ: 29956-46-119

جابابنتين تيفغ 400 ملغ: 29937-47-119

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

GABA 300 mg 400 mg PIL MW0724

**teva**