

עלון לצרכן לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

לנליידומיד טبع 2.5 מ"ג**לנליידומיד טבע 5 מ"ג****לנליידומיד טבע 7.5 מ"ג****לנליידומיד טבע 10 מ"ג****לנליידומיד טבע 15 מ"ג****לנליידומיד טבע 20 מ"ג****לנליידומיד טבע 25 מ"ג****כמוסות קשיחות****הרכב:**

כל כמוסה קשיחה של לנליידומיד טבע 2.5 מ"ג מכילה:

לנליידומיד 2.5 מ"ג (כהידרוכלוריד הידרט)

Lenalidomide 2.5 mg (as hydrochloride hydrate)

כל כמוסה קשיחה של לנליידומיד טבע 5 מ"ג מכילה:

לנליידומיד 5 מ"ג (כהידרוכלוריד הידרט)

Lenalidomide 5 mg (as hydrochloride hydrate)

כל כמוסה קשיחה של לנליידומיד טבע 7.5 מ"ג מכילה:

לנליידומיד 7.5 מ"ג (כהידרוכלוריד הידרט)

Lenalidomide 7.5 mg (as hydrochloride hydrate)

כל כמוסה קשיחה של לנליידומיד טבע 10 מ"ג מכילה:

לנליידומיד 10 מ"ג (כהידרוכלוריד הידרט)

Lenalidomide 10 mg (as hydrochloride hydrate)

כל כמוסה קשיחה של לנליידומיד טבע 15 מ"ג מכילה:

לנליידומיד 15 מ"ג (כהידרוכלוריד הידרט)

Lenalidomide 15 mg (as hydrochloride hydrate)

כל כמוסה קשיחה של לנליידומיד טבע 20 מ"ג מכילה:

לנליידומיד 20 מ"ג (כהידרוכלוריד הידרט)

Lenalidomide 20 mg (as hydrochloride hydrate)

כל כמוסה קשיחה של לנליידומיד טבע 25 מ"ג מכילה:

לנליידומיד 25 מ"ג (כהידרוכלוריד הידרט)

Lenalidomide 25 mg (as hydrochloride hydrate)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוספת".

קרא בעיון את העlion עד סוף בטרם תשתמש בתרופה. עליון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלהך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בנוסף לעלון, לתכשיר לנילידומידطبع קיימת חוברת מידע לטיפול. חוברת זו מכילה מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול לנילידומידطبع ולפעול על פיו. החוברת מתמקדת בסיכון למונחים בעבר. יש לעיין בחוברת לטיפול ובעלון לצריך לפני השימוש בתכשיר. יש לשמר את החוברת לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

לנילידומידطبع משמשת לטיפול בחולים בוגרים עבורי:

- מיאלומה נפוצה
- סינדרום מיילודיספלסטי (MDS) Myelodysplastic Syndromes
- לימפומת תא מעתפת Mantle Cell Lymphoma (MCL)
- לימפומה פוליקולרית Follicular lymphoma

לנילידומידطبع 7.5 מ"ג אינה מותאמת לטיפול בסינדרום מיילודיספלסטי.

קבוצה רפואייתית: התרופה שייכת לקבוצת תרופות המשפיעות על פעילותה של המערכת החיסונית.

כיצד לנילידומידطبع פועלת

לנילידומידطبع פועלת באמצעות השפעה על המערכת החיסונית של הגוף ותקיפה ישירה של הסרטן. קיימות מספר דרכי פעולה שונות:

- על ידי עצירת התפתחות תא הסרטן
- על ידי עצירת גידילת כלי דם הסרטן
- על ידי גירוי חלק מהמערכת החיסונית לתקיפת תא הסרטן

מיאלומה נפוצה

מיאלומה נפוצה היא סוג של סרטן המשפיע על תא דם לבן מסוים, הנקרא תא פלאזה. תאים אלה מותאפסים במח העצמות ומתחלקים, וכך יוצרים מכלל שליטה. מצב זה יכול לפגוע בעצמות ובכליות. מיאלומה נפוצה בדרך כלל לא ניתן לריפוי. עם זאת, ניתן להפחית או להעלים את הסימנים והסתמנים במשך זמן מה באופן ניכר. מקרה זה נקרא "תגובה".

מיאלומה נפוצה שאובחנה לאחרונה - בחולים שעבורו השתלת מוח עצם
לנילידומידطبع משמשת לטיפול אחר שטוטופלים התואוששו באופן מספק לאחר השתלת מה עצם.

מיאלומה נפוצה בלתי מטופלת - בחולים שאינם יכולים לעורו השתלת מוח עצם

לנילידומידطبع נלקחת עם תרופות אחרות:

- תרופה אנטי-דלקטיבית בשם "דקסאמטازון"
- תרופה כימותרפיה הקרואיה "ברוטזומיב"
- תרופה כימותרפיה הקרואיה "מלפאלן"
- תרופה המדכאת את מערכת החיסון הקרואיה "פרדניזון"

את התרופות האחרות תיטול בתחילת הטיפול ולאחר מכן תמשיך את הטיפול עם לנילידומידطبع לבדה.

אם אתה בן 75 שנים ומעלה או שאתה סובל מביעיות כלירות ברמה מותונה עד חמורה, על הרופא

לבחון היבט את מצבך טרם התחלת הטיפול.

מיאלומה נפוצה בלתי מטופלת - בחולים המועמדים להשתלת מה עצם

מיאלומה נפוצה (MM) היא סרטן של מוח העצם.

לנליידומיד טبع משלחת לטיפול בחולים עם מיאלומה נפוצה.

לנליידומיד טבע נלקחת עם תרופות אחרות:

- תרופה אנטי-דלקטיבית בשם "דקסאמתאזון"
- תרופה כימותרפית הקרואה "בורטזומיב"

מיאלומה נפוצה - בחולים שהיילו טיפול בעבר

לנליידומיד טבע נלקחת ביחד עם תרופה אנטי-דלקטיבית בשם "דקסאמתאזון".

לנליידומיד טבע יכולת לעצור החמרה של הסימנים והתסמינים של מיאלומה נפוצה. כמו כן, לנליידומיד הראה עיכוב בהישנות מיאלומה נפוצה לאחר טיפול.

סינדרום מיאלודיספלסטי (MDS)

סינדרום מיאלודיספלסטי הוא אוסף של מחלות דם ומה עצם רבות וסוגות. תאי הדם הופכים ללא תקין ולא מתפקדים כראוי. מטופלים יכולים לחוות מגוון סימנים ותסמינים כולל ספירה נמוכה של תאי דם אדומים (אנמיה), צורך בעירוי דם ולהיות בסיכון ליזיון.

לנליידומיד טبع משלחת לטיפול בחולים בוגרים שאובחנו כבעלי סינדרום מיאלודיספלסטי כאשר כל הדברים הבאים חלים (לנליידומיד טبع 7.5 מ"ג אינה מותאמת לטיפול בסינדרום מיאלודיספלסטי):

- אתה זקוק לעירוי דם קבועים לטיפול ברמות נמוכות של כדוריות דם אדומות ("אנמיה תלואה בעירוי")
- יש לך חריגה של תאים במח העצם הנקרואת "מחיקה מבודדת 5% ציטוגנטית". פירוש הדבר ש גופך אינו מייצר מספיק תאי דם בריאות
- טיפולים אחרים ששימושו בעבר, אינם מתאימים או אינם עובדים מספיק טוב

לנליידומיד טבע יכולה להעלות את מספר תאי הדם האדומים התקינים המיוצרים על ידי הגוף על ידי הפקחת מספר התאים הלא תקנים:

- הדבר יכול להוביל לירידה במספר עירוי הדם שידרשו. יתכן כי לא יידרש כלל טיפול במתן מננות דם.

ליימפומת תאי המעתפת (MCL)

ליימפומת תאי המעתפת היא סרטן בחלק מהמערכת החיסונית (רקמת הלימפה). הסרטן משפיע על סוג של תאי דם לבן הנקראים בי-ליימפוציטים או תא-ב. ליימפומת תאי המעתפת היא מחלת בה תא-ב גדלים ללא בקרה ומctrברים בריקמת הלימפה, מה עצם או דם.

לנליידומיד טבע משלחת לטיפול בחולים בוגרים שתופלו בעבר בתרופות אחרות.

ליימפומה פוליקולרית (FL)

ליימפומה פוליקולרית היא סרטן שמפתחה באופן איטי ופגע בתאי ליימפוציטים ב. מטופל עם ליימפומה פוליקולרית מפתח כמויות גדולות מדי של תאי ליימפוציטים ב' שעולים להצבר בדם, מה עצם, בקשרי הלימפה ובתחול.

לנליידומיד טבע יחד עם עוד תרופה בשם ריטוקסימאב משמשים לטיפול בחולים עם ליימפומה פוליקולרית שתופלו בעבר.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לנליידומיד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 - " מידע נוספים").
- את בהירין, חושבת שאתה יכול להיות בהירין או מתכונת להרות. **לנליידומיד טבע צפואה להיות מסוכנת לעובר** (ראי סעיף 2 - "הירין, הנקה ופוריות - מידע עבור גברים ונשים").
- את בגיל הפוריות, אלא אם כן את נוקטת בכל האמצעים הנדרשים למניעת הירין (אנא ראי סעיף "hirion, הנקה ופוריות - מידע עבור גברים ונשים").

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בנליידומיד טבע, ספר לרופא אם:

- סבלת בעבר מקריש דם - יש לך סיכון מוגבר לפתח קרישי דם בוורידים ובעורקים במהלך הטיפול.
- אתה חש איזשהו סימן לדיזיומות כגון שיעול או חום.
- אתה סובל או סבלת בעבר מ眩ה ויראל, בפרט מדלקת נגיפית של הכלב מסוג B (הפטיטיס B), שלבקת חוגרת, VIIH. אם אתה בספק, התיעץ עם הרופא. הטיפול בנליידומיד טבע עשוי לגרום לווירוס להיות פעיל שוב בחולמים נשאים של הנגיף ולהוביל להישנות של החיים. הרופא יבחן האם אי פעם חלה בדלקת נגיפית של הכלב מסוג B.
- אתה סובל מליקוי בתפקודו הכלילי - יתכן שהרופא יצטרך להתאים עבורך את המינון של לנליידומיד טבע.
- עברת התקף לב, היה לך בעבר קריש דם או אם אתה מעשן, סובל מלחץ דם גבוה או מרמות כולסטרול גבהות.
- סבלת מתגoba אלרגית בעת Nutzung תליידומיד (תרופה נוספת המשמשת לטיפול במיאלומה נפוצה) כגון פריחה, גירוד, נפיחות, סחרחוות או קושי נשימה.
- חווית בעבר אחד או יותר מהתסמים הבאים: פריחה מופשטת, עור אדום, חום גבוה, תסמינים דמיי שפעת, עליה ברמות אנדמיי הכלב, בעיות בדם (אוזינופיליה), קשריות למפה מוגדלות - אלו הם סימנים של תגובה עורית חמורה הנקרהת תגובה לתרופה עם אוזינופיליה ותסמים מערכתיים - "DRESS" (ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי").

אם אחד מהמצבים לעיל מתאים לך, ספר על כך לרופא לפני תחילת הטיפול.

בכל עת במהלך הטיפול או לאחריו, ספר לרופא מיד אם:

- אתה חווה טשטוש בראייה, איבוד ראייה או ראייה כפויה, קושי בדיבור, חולשה בידים או ברגליים, שינוי באופן ההליכה או בעיות בשווי המשקל, חוסר תחושה מתמשך, ירידת בתוחשיות או איבוד תחושתיות, איבוד זיכרון או בלבול. כל אלו עשויים להיות תסמינים להפרעה חמורה במוח שעשויה אף להיות קטלנית. ההפרעה קרוייה "לייקואנטצפלופתיה מתקדמת מולטיופקאלית (PML)". אם חווית תסמינים אלו לפני הטיפול בנליידומיד טבע, ספר לרופא על כל שינוי בתסמינים אלו.
- אתה חווה קוצר נשימה, עיפות, סחרחוות, כאבים בחזה, דופק לב מהיר או נפיחות ברגליים או הקרטולים. אלה עלולים להיות תסמינים של מצב חמור המכונה יתר לחץ דם ריאתי (ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי").

ילדים ומתבגרים

לנליידומיד טבע אינה מומלצת לשימוש ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

בדיקות ומעקב

לפni ובמהלך הטיפול לנליידומיד טבעי יהיה עליך לבצע בדיקות דם שגרתיות, משום שהתרופה עלולה לגרום לירידה במספר תאי הדם אשר מסיעים להילחם ב細胞ים (כדוריות דם לבנות) וועזרים בתהילה קריישת הדם (טסיות הדם).

הרופא יבקש מך לבצע בדיקות דם תקופתיות:

- לפני הטיפול
- כל שבוע במהלך 8 השבועות הראשונים של הטיפול
- לאחר מכן לפחות פעמי בחודש

יתכן שתתברר בדיקה לשם הערכת בעיות לב-ריאות לפni ובמהלך הטיפול עם לנליידומיד טבעי.

חולים עם סינדרום מיאלואיד-СПЛЕСТИ (MDS) הנוטלים לנליידומיד טבעי

אם יש לך סינדרום מיאלואיד-СПЛЕСТИ, יש לך יותר סיכוי לחלה במצב מתקדם יותר הנקרא לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML). בנוסף, לא ידוע כיצד לנליידומיד משפייע על הסיכוי שתתקבל לוקמיה מיאלואידית חריפה. הרופא שלך עשוי לבצע לך בדיקות כדי לבדוק אם ישנים סימנים שעשוים לחזות טוב יותר את הסבירות שתתקבל לוקמיה מיאלואידית חריפה במהלך הטיפול בלבד לנליידומיד טבעי.

במטופלים עם לימפומת תאי מעטפת (MCL) הנוטלים לנליידומיד טבעי

הרופא יבקש מך לבצע בדיקות דם:

- לפני הטיפול
- כל שבוע במהלך 8 השבועות הראשונים (2 מחזוריים) של הטיפול
- לאחר מכן כל שבועיים במהלך 3-4 (ראה סעיף 3 - "מחזורי הטיפול" למידע נוסף)
- לאחר מכן כל תחילת מחזור טיפול
- לפחות פעמי בחודש

במטופלים עם לימפומה פוליקולרית (FL) הנוטלים לנליידומיד טבעי

הרופא יבקש מך לבצע בדיקות דם:

- לפני הטיפול
- כל שבוע במהלך 3 השבועות הראשונים (מחזור ראשון) של הטיפול
- כל שבועיים במהלך המבחן השני עד למחזור הרביעי (ראה סעיף 3 - "מחזורי הטיפול" למידע נוסף)
- לאחר מכן כל תחילת מחזור טיפול
- לפחות פעמי בחודש

הרופא עשוי לבדוק אם יש לך כמות כוללת גבוהה של גידולים בכל הגוף, כולל במוח עצמו. זה עשוי להוביל למצבי הגידולים מתפרקים וגורמים לרמות כימיקלים חריגות בדם שעלול להוביל לאיספיקת כליות (מצב זה נקרא "Syndrome Lysis Tumour").

הרופא עשוי לעקוב אחר שינויים בעורך, דוגמת נגעים אדומיים או פריחה.

הרופא עשוי להתאים את המנה של לנליידומיד טבעי או להפסיק את הטיפול בהתאם לתוצאות בדיקות הדם ומצבר הכללי. אם אתה מאובחן לראשונה כחולה במיאלומאה נפוצה, הרופא יכול להעיר את הטיפול בעורך בהתאם על גילך ועל מצבים אחרים שאתה חווה כבר עתה.

עבור בדיקות ומעקב הנוגעים לשימוש בגיל הפוריות (עבור גברים ונשים) אנא ראו את המידע במסגרת בראש העלוון, וכן את המידע המופיע תחת סעיף "הירון, הנקה ופוריות".

תרומות דם

אין לתרום דם במהלך הטיפול בלבד בלבד טבע, ולפחות 7 ימים לאחר סיום הטיפול.

קשישים ומטופלים בעלי ירידה בתפקוד הכליתי

אם אתה בן 75 שנים ומעלה או שאתה סובל מבעיה כליתית ברמה מתונה עד חמורה, על הרופא לבחון היבט את מצבך טרם התחלת הטיפול.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לךחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות מסוימות המשמשות למניעת הירין, כגון גלולות למניעת הירין, לאחר שהן עלולות לא לעבוד.
- תרופות מסוימות המשמשות לטיפול בעיות לב - כגוןDigoxin - מומלץ לבצע ניטור (מעקב) תקופתי של רמותDigoxin בدم במהלך הטיפול עם לנילידומיד טבע.
- תרופות מסוימות המשמשות לדילול הדם - כגון אראפארין - מומלץ לבצע ניטור (מעקב) הדוק של רמות אראפארין בדם במהלך טיפול משולב עםDKSAמתАЗון.
- תרופות מקבצת האריתרופאיין (טיפול באנמיה) או תרופות נוספות שעולות להעלות את הסיכון לפקקת בכלי-הדם, כגון טיפול הורמוני חלווי.
- תרופות מקבצת סטטינים - קיים סיכון מוגבר לראבדומיליזה כאשר סטטינים ניתלים עם לנילידומיד. מומלץ לבצע ניטור (מעקב) תקופתי במיוחד במהלך השבועות הראשוניים של הטיפול.

שימוש בתרופה וழון

ניתן ליטול את התרופה עם או ללא אוכל.

הירין, הנקה ופוריות - מידע עבור גברים ונשים

הרופא ירשום אותך לתוכנית ניהול סיכונים/תוכנית למניעת הירין (RMP/PPP). מטרת התוכנית לסייע לרופא לעדכן בונגעו לסיכונים הכרוכים הטיפול בלבד טבע ולודא שאתה מודע לאמצעי זהירות שצורך לנקט בהם לפני, במהלך ולאחר הטיפול.

מידע עבור נשים הנוטלות לנילידומיד טבע

- אין להשתמש בלבד טבע אם אתה בהירין, כיוון שהתרופה צפיה לפגוע בעובר.
- אל תינסוי להירין במהלך הטיפול בלבד טבע. על-כן אם אתה איש בגיל הפוריות, את חייבות לךוט באמצעות יעלים למניעת הירין (ראה סעיף "מניעת הירין").
- אם הרית במהלך הטיפול בלבד טבע, עלייך להפסיק את הטיפול ולהודיע לרופא מיד.

מידע עבור גברים הנוטלים לנילידומיד טבע

- אם בת זוגך נכנסה להירין במהלך התקופה בה נטלת בלבד טבע, עלייך להודיע לרופא באופן מיידי. מומלץ לברך זוגך לפנות ליעוץ רפואי בהקדם האפשרי.
- עלייך להשתמש באמצעות יעלים למניעת הירין (ראה סעיף "מניעת הירין").

הנקה

אין להניך במהלך הטיפול בלבד טבע ובמהלך הפסיקות טיפול, כיוון שלא ידוע אם בלבד טבע לחלב אם.

מניעת הירון

מידע עבור נשים הנוטלות לנליידומיד טבע

לפני תחילת הטיפול בתכשיר, שאלי את הרופא אודות יכולתך להיכנס להירון, גם במקרה בו את חושבת שתסיכוי שתצליח להיכנס להירון נמוך.

אם את יכולה להיכנס להירון:

- עליך לעמוד בבדיקות הירון תחת פיקוחו של הרופא (לפני כל טיפול, לפחות פעמיים באביבה שבועות במהלך הטיפול ולפחות 4 שבועות לאחר סיום הטיפול), למעט במקרה בו ביצעת הליך אשר מונע מעבר של הביצות דרך החצוצרות אל עבר הרחם (tubal sterilisation).

בנוסף -

- יש להשתמש בשיטות ייעילות למניעת הירון לפחות 4 שבועות לפני תחילת הטיפול, במהלך הטיפול, ובמשך לפחות 4 שבועות לאחר סיום הטיפול. הרופא יעץ לך לגבי אמצעי מניעה מתאימים.

מידע עבור גברים הנוטלים לנליידומיד טבע

לnellydomide עובר לנוזל הזרע. אם בת זוגר בהירון או יכולה להיכנס להירון, היא לא משתמשת בשיטות ייעילות למניעת הירון, אתה חייב להשתמש בקונדום במהלך הטיפול, ולפחות 7 ימים לאחר סיום הטיפול, אפילו אם עברת ניתוח לשם עיקור (זקטומיה).

אין לתרום זרע במהלך הטיפול בלבד לנליידומיד טבע ובמהלך 7 ימים לאחר סיום הטיפול.

נהיגה ושימוש במכונות

אין לנויג או להפעיל מכונות אם אתה חש סחרחוורת, עייפות, ישנוויות, יש לך רופתו או טשטוש ראייה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחחות מ- 23 מ"ג נתרן בכל כמוסה ולפיכך נחשבת בטולת נתן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוגע למיןון ואופן הטיפול בתכשיר.

מינון:

המיןון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

- כאשר לנליידומיד טבע ניתנת לטיפול במיאലומה נפוצה בחולים שאינם יכולים לעמוד השתקת מה עצם, בחולים שמוסעים להשתקת מה עצם או בחולים שקיבלו טיפולים אחרים לפני, היא ניתנת עם תרופות אחרות (ראו סעיף 1 - "למה מיועדת התרופה?")
- כאשר לנליידומיד טבע ניתנת לטיפול במיאലומה נפוצה בחולים שעבורו השתקת מה עצם או לטיפול בסינדרום מיאלודיספלסטי או למפרמת תא מעתפת, היא ניתנת בלבד.
- כאשר לנליידומיד טבע ניתנת לטיפול בלימפומה פוליקולרית, היא ניתנת עם תרופה אחרת המכילת חומר פעיל שנקרא ריטוקסימאב.

אם אתה לווקח לנליידומיד טבע בשילוב עם תרופות אחרות, עליך לעיין בעלונים המצורפים לתרופות אלה למידע נוסף על השימוש בהן ועל השפעותיהן.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא. חשוב לא לדלג על אף מנה.

מחזרי הטיפול:

תרופה זו נלקחת בימים מסוימים במשך 3 שבועות (21 ימים).

- כל 21 ימים נקראים "מחזר טיפול".
- בהתאם ליום המחזר, אתה טיפול אחת או יותר מהתרופות. עם זאת, בימים מסוימים אתה לא טיפול אף תרופה.
- לאחר השלמת כל מחזר של 21 יום, عليك להתחיל "מחזר חדש" חדש למשך 21 הימים הבאים.

או

- תרופה זו נלקחת בימים מסוימים במשך 4 שבועות (28 ימים).
- כל 28 ימים נקראים 'מחזר טיפול'.
- בהתאם ליום המחזר, אתה טיפול אחת או יותר מהתרופות. עם זאת, בימים מסוימים אתה לא טיפול אף תרופה.
- לאחר השלמת כל מחזר של 28 יום, عليك להתחיל 'מחזר חדש' חדש למשך 28 הימים הבאים.

כמה לנילידומיד טבע לטול:

לפני התחלת הטיפול הרופא ינחה אותך:


- כמה לנילידומיד טבע עלייך ליטול.
- כמה תריפות אחרות عليك ליטול בשילוב עם לנילידומיד טבע, אם בכלל.
- באילו ימים במחזר הטיפול לך取ת כל תרופה.

צורת הנטילה:

- יש לבלווע את התרופות בשולםון (רצוי עם מים).
- אין לשבור, לפתח או ללעוס את התרופות. אם אבקה מcomesת לנילידומיד טבע שברה באהה ב מגע עם העור, عليك לשטוף את העור היטב ומיד במים וסבון.
- הוצאות הרפואיות, המטפלים ובני המשפחה צריכים ללבוש כפפות חד פעמיות ב מגע עם המגשיות או התרופות. לאחר מכן יש להסיר את התרופות כדי למנוע חשיפה לעור, ולהניע אותן בתוך שקית פלסטיק שכיננת לאטימה ולהשליכן בהתאם לדרישות המקומיות. לאחר מכן יש לשטוף ידיים היטב עם מים וסבון. נשים בהריון או שחוחשות שהן יכולות להיות בהריון צריכה להימנע מגע עם המגשיות או התרופות.
- ניתן ליטול את התרופות בערך באותו הזמן בימים שנקבעו.
- יש ליטול את התרופפה בערך באותו הזמן בימים שנקבעו.

להסרת הcomesה מהמגשיות:

- לחץ רק בצד אחד של הcomesה על מנת לדחוף אותה החוצה דרך רדייד האלומיניום.
- אל תפעיל לחץ במרכז הcomesה מאחר שהדבר עלול לגרום לההישבר.



marsh הטיפול:

לנליידומיד טבע נלקחת במחזרי טיפול, כל מחזר לטיפול גמישר 21 או 28 ים (ראה סעיף "מחזרי הטיפול"). עליך להמשיך את מחזרי הטיפול עד אשר הרופא ינחה אותך להפסיק.

כתיישה/חציה/לעיסה

אין לפתח, ללווע או לשבור את הכמוסה הקשיחה.

אם אבקה מכמוסה שבורה באה מגע עם העור, שטוף מיד את העור היטב במים וסבון.

אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטיעות בלבד לצד מן התרפיה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרפיה איתך.

אם שכחת ליטול את התרפיה

אם שכחת ליטול תרפיה זו בזמן הקבוע

- וחלפו פחות מ-12 שעות: יש ליטול את הכמוסה מיד.

- וחלפו יותר מ-12 שעות: אין ליטול את הכמוסה. יש ליטול את הכמוסה הבאה במועד הרגיל למועדרת.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

השלם את הטיפול במלואו כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרפיה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעע שאתה נוטל את התרפיה. הרכב משקפיים אם אתה דקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרפיה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרפיה, השימוש בלנליידומיד טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

הפסק לנקחת את לנליידומיד טבע ונפה לרופא מיד אם אתה מביח באחת מהתופעות החמורות הבאות - יתכן שתזדקק לטיפול רפואי דחוף:

- סרפתת, פריחה, נפיחות בעיניים, בפה או בעיניים, קשי נשימה או גירוד, אשר עשויים להיות תסמינים של תגובה אלרגית חמורות הנקראות אנגיואדמא (angioedema) ותגובה אנפיפילקטית.
- תגובה אלרגית חמורה העוללה להתחילה כפריחה באוזור אחד אך להתרפש בלilioי אובדן נרחב של העור בכל הגוף (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון /או נמק רעל שלא אףידרמייס).
- פריחה מפותשת, חום גוף גבוה, עליה ברמות אণמי כבד, בעיות במערכת הדם (אוזינופיליה), קשריות למפה מוגדלות ומעורבות של איברי גוף אחרים (תגובה לתרפיה עם אוזינופיליה ותסמינים מערכתיים ידועה גם כ- DRESS או תסמונת רגישות יתר לתרפיה). (ראה סעיף 2 - "ازהרונות מיוחדים הנוגעים לשימוש בתרפיה").

דוחות מייד לרופא אם אתה חווית אחד מתופעות הלואן החמורות הבאות:

- חום, צמרמוורות, כאבי גרון, שיעול, כיבים בפה או כל תסמן אחר של זיהום, כולל זיהום במערכת הדם (ספסיס)

- דימום או חבלה בהיעדר פציעה
- כאבים בחזה או ברגליים
- קוצר נשימה
- כאבי עצמות, חולשת שרירים, בלבול או עייפות העשויים להיות בגל רמה גבוהה של סידן בדם.

לנילידומיד טبع עלולה להוירד את מספר תאי הדם הלבנים הנלחמים בזיהומיים וכן את מספר תאי הדם המסייעים בקרישת הדם (טסיות הדם), דבר העולם להוביל להפרעות דימום, כגון דימום מהאף וחברות. לנילידומיד טבע גם עלולה לגרום לקרישי דם בוירדים (פקקט/טרומבוזה).

תופעות לוואי נוספת

חשוב לציין שמספר קטן של מטופלים עשוי לפתח סוגים נוספים של סרטן, וכך גם עלול לגדול עם השימוש בנילידומיד טבע. אך הרופא יעקוב בקדנות אחר מצבו לגבי סוג הסרטן החדש במהלך טיפול לנילידומיד טבע.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) - תופעות שימושיות ביותר משתמש אחד מעשרה:

- ירידה במספר תאי הדם האדומים, דבר שעלול להוביל لأنמיה שגורמת לעייפות ולחולשה
- פריחה, גירוד
- התכווצויות שרירים, חולשת שרירים, כאבי שרירים, כאבי עצמות, כאבי מפרקים, כאבי גב, כאבים בגפיים
- נפיחות כללית הכלולת נפיחות של הידיים והרגליים
- חולשה, עייפות
- חום ותסמיינים דמווי שפעת הכלולים חום, כאבי שרירים, כאבי ראש, כאב אוזניים שיעול וצמרמות
- חוסר תחושה, תחושת עקצוץ או צריבה בעור, כאבים בידיים או ברגליים, סחרחות, רעד
- ירידה בתיאבון, הפרעות בתחושת הטעם
- עלייה בכאב, גודל הגידול או אדמומיות סביב הגידול
- ירידה במשקן
- עצירות, שלשולים, בחילות, הקאות, כאבי בטן, צרבת רמות נמוכות של אשלגן או סידן /או נתרן בדם
- בלוטת התריס מתפקדת פחות ממה שהיא אמורה להיות כאב ברגל (אשר עלול להיות תסמין של פקקט/טרומבוזה), כאב בחזה או קוצר נשימה (אשר עלולים להיות תסמינים של קרישי דם בריאות, מצב הנקרא "תסחיף ריאתי")
- זיהומיים מכל הסוגים, כולל זיהום בסינוסים שמסביב לאף, זיהום בריאות ודרכי הנשימה העליונות
- קוצר נשימה
- ראייה מעורפלת
- עכירות בעין (קטרקט)
- בעיות בכליות, הכלולים כלוות שאין עובדות רפואי או שאין מסוגלות לשומר על תפקוד תקין
- תוצאות לא תקין של בדיקת כבד
- עלייה בתוצאות בדיקת הכלב
- שינויים בערכי חלבון בדם העולמים לגרום להתקפות העורקים (וסוקוליטיס)

- עלייה ברמת הסוכר בدم (סוכרת)
- ירידת ברמת הסוכר בדם
- כאבי ראש
- דימום מהאף
- יובש בעור
- דיכאון, שינויים במצב הרוח, קשיי שינה
- שיעול
- נפילה בלחץ דם
- תחושת אי-נוחות בגוף, הרגשה רעה
- פה כאב ומודלק, יובש בפה
- התיבשות

תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שימושיות ב-10-1 משתמש מתוך 100:

- הרס כדריות דם אדומות (אנמיה המוליטית)
- סוגים מסוימים של גידול בעור
- דימום מהחניכיים, מהקיבה או מהמעיים
- עלייה בלחץ הדם, קצב פעימות לב (דופק) איטי, מהיר או בלתי סדי
- עלייה בכמות חומר הנוצר כתוצאה מפרק רגיל וחריג של תא דם אדום
- עלייה בסוג חלבון המעיד על דלקת בגוף
- פיגמנטציה יתרה של העור, שינוי צבע של העור כתוצאה מדימום מתחתיו, בדרך כלל נגרם על ידי חבורות, נפיחות בעור מלאה בדם, חבורות
- עלייה בחומצה אורית בדם
- התפרצויות בעור, אדומות בעור, עור סדק, עור מתקלף, סרפת
- הזעה מוגברת, הזעת לילה
- קשיים בבליעה, כאב גרון, קשיים באיכות הקול או בשינויים קוליים
- נזלת
- ייצור שתן בכמות מרובה או פחתה מהרגיל או חוסר שליטה במתן שתן
- דם בשtan
- קוצר נשימה, בעיקר במצב שכיבה (עלול להיות תסמין של אי ספיקת לב).
- קושי בהשגת זקופה
- שבץ, עילפון, ורטיגו (בעיה באוזן הפנימית שמובילה לתחשוה שהcoil מסתובב), אובדן הכרה זמני
- כאבים בחזה המתפשטים לזרועות, לצוואר, ללסת, לגב או לבטן, תחושה של הזעה וקשיי נשימה, בחילות או הקאות, אשר עשויים להיות תסמינים של התקף לב (אוTEM שריר הלב)
- חולשת שרירים, חוסר אנרגיה
- כאבי צוואר, כאבי חזזה
- צמרמורת
- נפיחות במפרקים
- האטה או חסימה של זרימת מרה מהכבד
- רמות נמוכות של פוסfat או מגנזיום בדם
- קושי בדיבור
- פגיעה בכבד
- شيء משקל לקי, קושי בתנועה

- חירשות, אלצללים/צפוצופים באוזניים (טינטוו)
- כאבי עצבים, תחושה לא נורמלית לא נעימה במיעוד למגע
- עודף ברזל בגוף
- צמא
- בלבול
- כאבי שיניים
- נפילה שלוללה לגרום לפצעה

תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon) - תופעות שמאופיינות ב-10-1 מעתמשים מתוך 1,000:

- דימום תוך גולגולתי
- בעיות במחזור הדם
- אובדן ראייה
- אובדן החשק/הדחף המיני (לייביד)
- מתן כמות גדולה של שתן המלווה בכאבי עצמות ובחולשה אשר עלולים להיות תסמינים של ליקוי קליתי (تسمונת פאנקוני – Fanconi syndrome)
- הצהבהה של העור, הרקמות הריריות או העיניים (צבות), צואה בעלת צבע חיוור, שתן בצלע כהה, גרד בעור, פריחה, כאב או נפיחות בבטן - אלו עלולים להיות תסמינים של פגיעה בכבד (אי ספיקת כבד)
- כאבי בטן, נפיחות או שלשול שלולאים להיות תסמינים של דלקת המעי הגס (המכונה קוליטיס caecitis)
- נזק לתאים בклיה (نمך של אבובית הכליה (renal necrosis tubular))
- שינוי צבע העור, רגשות לאור המשמש
- תסמונת תמס/פירוק הגוף (tumour lysis syndrome) - סיבוכים מטבוליים (בחילוף החומרים) שלולאים להתרחש במהלך הטיפול בסרטן ולעיתים אףלו ללא טיפול. סיבוכים אלו נגרמים עקב תוצר הפירוק של תא סרטן מתים ועלולים לכלול: שינוי בהרכבת הכימי בدم, רמות גבוהות של אשלגן, זרחן, חומצת-שתן ורמות נמוכות של סיון המובילות לשינויים בתפקוד הכליאות, בקצב הלב (דופק), לפרקטיים ולעתים למוות.
- עליה בלחץ הדם בכלי הדם המספקים דם לריאות (יתר לחץ דם ריאתי)

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- כאב פתאומי או מתון אך מחריר בבטן העלונה /או בגין אשר נמשך מספר ימים, יתכן שימוש בבחילות, הקאות, חום ודופק מהיר. תסמינים אלו עלולים להצביע על דלקת בלבלב.
- צפוצופים בעת נשימה, קווצר נשימה או שיעול יבש, העולאים להיות תסמינים הנגזרים כתוצאה מדלקת ברקמת הריאה.
- נצפו מקרים נדירים של פירוק שריר (כאבי שרירים, חולשה או התנפחות) היכולים לגרום לביעות כליה (רבdomיוליזיס), בח黠ם כאשר לנליידomid נלקח עם סטטין (סוג של תרופה להורדת כולסטרול).
- מצב המשפייע על העור הנגרם מדלקת של כלי דם זעירים, בלויי כאב במפרקים וחום (ואסקוליטיס לויוקוציטוקולסטוי).
- פירוק של דופן הקיבה או המעי. הדבר עלול לגרום לדיזוזים חמורים. פנה לרופא אם אתה חש בכך בבטן חמוץ, חום, בחילות, הקאות, דם בצוואר או שינוים בהרגלי המעיים (ציאות).
- דיזוזים נגיפים, כולל הרופס זוסטר (שלבקת חוגרת, מחלת ויראלית הגורמת לפריחה עורית כאבת עם שלפוחיות) והישנות של דלקת כבד נגיפית מסוג B (היכולה לגרום להצהבת העור והעיניים, שתן בצלע חום כהה, כאב באזן ימני של הבطن, חום, תחושת בחילה או בחילה).

- דוחית איבר מושתל (כגון קליה, לב).

אם הופעה תופעת לוויאי, אם אחת מתופעות הלוויאי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוויאי שלא הזכרה בעлон, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוויאי:

ניתן לדוח על תופעות לוויאי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוויאי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקורי לדוח על תופעות לוויאי או על ידי כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

יש לאחסן מתחת ל- -25°C .
 יש להחזיר לבית המרקחת את כל הנקודות שנותרו ללא שימוש.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

תכולת הנקודות:

Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, talc, silica colloidal anhydrous.

גוף הנקודות:

Gelatin, titanium dioxide (E 171), yellow iron oxide (E172) (Lenalidomide Teva 2.5 mg, 7.5 mg, 10 mg and 20 mg), indigotine (E132) (Lenalidomide Teva 2.5 mg, 10 mg, 15 mg and 20 mg).

די להדפסה:

Shellac, propylene glycol, black iron oxide (E172), potassium hydroxide, concentrated ammonia solution.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

לנליידומיד טבע 2.5 מ"ג: כמוסה קשיחה אוטומה עם גוף לבן ומכסה יירוק. סימון "2.5" מודפס בצלב שחור על גוף הנקודה.

לנליידומיד טבע 5 מ"ג: כמוסה קשיחה אוטומה בצלב לבן. סימון "5" מודפס בצלב שחור על גוף הנקודה.

לנליידומיד טבע 7.5 מ"ג: כמוסה קשיחה אוטומה עם גוף לבן ומכסה בצלב שנהב. סימון "7.5" מודפס בצלב שחור על גוף הנקודה.

לנליידומיד טבע 10 מ"ג: כמוסה קשיחה אוטומה עם גוף בצלב שנהב ומכסה יירוק. סימון "10" מודפס בצלב שחור על גוף הנקודה.

לנליידומיד טבע 15 מ"ג: כמוסה קשיחה אוטומה עם גוף לבן ומכסה כחול. סימון "15" מודפס בצבע שחור על גוף הכמוסה.

לנליידומיד טבע 20 מ"ג: כמוסה קשיחה אוטומה עם גוף כחול ומכסה ירוק. סימון "20" מודפס בצבע שחור על גוף הכמוסה.

לנליידומיד טבע 25 מ"ג: כמוסה קשיחה אוטומה בצבע לבן. סימון "25" מודפס בצבע שחור על גוף הכמוסה.

כל אריזה של לנליידומיד טבע 2.5 מ"ג, 5 מ"ג, 7.5 מ"ג, 15 מ"ג, 20 מ"ג ו-25 מ"ג מכילה 7 או 21 כמוסות קשיחות.

כל אריזה של לנליידומיד טבע 10 מ"ג מכילה 7, 21 או 42 כמוסות קשיחות.

"תיכון של גגלי האריזות משווים".

שם בעל הרישום והיצרן כתובתו:

טבע ישראל בע"מ,
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

נערך בספטמבר 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

161.79.35877	לנליידומיד טבע 2.5 מ"ג:
161.80.35500	לנליידומיד טבע 5 מ"ג:
161.81.35501	לנליידומיד טבע 7.5 מ"ג:
161.82.35502	לנליידומיד טבע 10 מ"ג:
161.83.35503	לנליידומיד טבע 15 מ"ג:
161.84.35504	לנליידומיד טבע 20 מ"ג:
161.85.35505	לנליידומיד טבע 25 מ"ג:

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.