

نشرة المستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986
يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

نوكسافيل 100 ملغ أقراص مقاومة-في المعدة

كل قرص يحتوي على:
پوساكونازول 100 ملغ
Posaconazole 100 mg

للمزيد من المعلومات عن جزء من مركبات الدواء. انظر أيضاً للبند 2.6 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن نوكسافيل. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
- وصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تتعطه لآخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى لو بدا لك أن وضعهم الصحي مماثل لوضعك.
- نوكسافيل أقراص مخصصة للاستعمال لدى البالغين (الذين يبلغون 18 سنة وما فوق).

1. لأي غرض مخصص نوكسافيل؟

يُستخدم نوكسافيل لمنع وعلاج أنواع مختلفة من حالات العدوى الفطرية.

يُستخدم نوكسافيل لعلاج الأنواع التالية من حالات العدوى الفطرية لدى البالغين، عندما لم تعمل أدوية أخرى مضادة للفطريات أو أداك احتجت للتوقف عن تناولها:

- حالات عدوى الناجمة عن فطريات من عائلة الرشاشية (*Aspergillus*)، ومقاومة للعلاج بأمفوتيريسين B أو إيتراكونازول أو عندما لا يكون باستطاعة المُتعالج تلقي هذه الأدوية؛
- حالات عدوى الناجمة عن فطريات من عائلة الميلاراوية (*Fusarium*) ومقاومة للعلاج بأمفوتيريسين B أو عندما لا يكون باستطاعة المُتعالج تلقي هذا الدواء؛
- حالات عدوى الناجمة عن فطريات التي تسبب أوضاع التي تُدعى "داء الفطريات الاصطباغية" و"ورم فطري" ومقاومة للعلاج بaitraconazole أو عندما لا يمكن باستطاعة المُتعالج تلقي هذا الدواء؛
- حالات عدوى الناجمة عن فطريات التي تُدعى "الكريوانية" (*Coccidioides*)، ومقاومة للعلاج بأمفوتيريسين B، إيتراكونازول أو فلوكونازول أو عندما لا يمكن باستطاعة المُتعالج تلقي هذه الأدوية.
- عدوى فطرية تُدعى داء الفطريات الغنمية (*Zygomycosis*)، لدى مُتعالجين مع عدم تحمل لعلاج بديل أو أن لديهم مرض لا يستجيب لعلاج بديل.

يمكن استعمال هذا الدواء أيضاً لمنع حالات عدوى فطرية لدى بالغين الموجودين باختطار (احتمال خطر) مرتفع للإصابة بعدوى فطرية، مثل:

- مُتعالجون ذوي جهاز مناعة ضعيف نتيجةً لعلاجات كيماوية لعلاج "لوكيميا الخلايا النقوية الحادة" (AML) أو "متلازمة خلل التنسج القوي" (MDS)
- مُتعالجون الذين يتلقون جرعة عالية من "أدوية لكتبت جهاز المناعة" بعد "زرع خلايا جذعية مكونة للدم" (HSCT).

الفصيلة العلاجية:

- ينتمي پوساكونازول لفصيلة أدوية التي تُدعى "مضادات الفطريات".
- هذا الدواء يعمل عن طريق قتل أو وقف نمو أنواع معينة من الفطريات، القادرة على التسبب بحالات عدوى.

2. قبل تناول نوكسافيل **2.1 لا تتناول نوكسافيل إذا:**

- | | | |
|---|---|---|
| كنت أرجياً (حساساً) لپوساكونازول أو لأي واحد من المركبات الأخرى في هذا الدواء (مفصلة في البند 6). | كنت تتناول: تيرفينادين، أستيميزول، سيساپريد، بيموزيد، هالوفانترين، كينيدين، أي دواء الذي يحتوي على "قلويدات من نوع إرجوت" مثل إرجوتامين أو ديبيدرولارجوتامين، أو دواء من عائلة الستاتينات مثل سيمفاستاتين، أتورفالستاتين أو لوفاستاتين. | بدأت بتناول فينيتوكلакс (venetoclax) أو يتم رفع جرعة الفينيتوكلакс الخاصة بك ببطء لعلاج ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن (CLL – chronic lymphocytic leukaemia). |
|---|---|---|

لا يجوز تناول نوكسافيل، إذا كان أحد الأمور المسجلة أعلاه ينطبق عليك. إذا لم تكن متأكداً، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول نوكسافيل.

لمعلومات إضافية، انظر في الأسفل للبند 2.3 "التدخلات/التفاعلات بين الأدوية"، بما في ذلك معلومات عن أدوية أخرى، التي قد يكون لها تفاعل مع نوكسافيل.

2.2 تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال نوكسافيل قبل العلاج بنوكسافيل، أخبر طبيبك إذا:

- كان لديك ذات مرة رد فعل تحسسي لدواء آخر مضاد للفطريات مثل كيتوكونازول، فلوكونازول، إتراكونازول أو فوريكونازول.
- كان لديك في الحاضر أو كان لديك في أي وقت مضى مشاكل في الكبد. من المحتمل أن تحتاج لإجراء فحوصات دم خلال فترة تناول هذا الدواء.
- كنت تطور إسهالاً وخيناً أو تقيؤات، لأن هذه الأوضاع قد تحد من نجاعة هذا الدواء.
- كان لديك اضطراب في نظم القلب (كما يظهر في فحص مُحَاطَّ كَهْرِيَّة القلب) الذي يُدعى موجة QTC الطويلة.
- كان لديك ضعف في عضلة القلب أو قصور القلب
- كان لديك نظم قلب بطيء جداً
- كان لديك اضطراب في نظم القلب
- كان لديك أي مشكلة في مستويات البوتاسيوم، المغنيزيوم أو الكالسيوم في الدم
- كنت تتناول فينكريستين، فينبلاستين و"قلويدات من نوع فينكا" أخرى (أدوية التي تُشتمل لعلاج السرطان)
- كنت تتناول فينيتوكلakis (دواء يستعمل لعلاج السرطان).

يجب عليك الامتناع عن التعرض للشمس خلال فترة العلاج. من الضروري تغطية مناطق الجلد المعرضة للشمس بواسطة ملابس التي ستزودك بحماية، وكذلك استعمال كريم وقاية الذي يحتوي على عامل حماية مرتفع (SPF)، لأنه قد يحدث ارتفاع في حساسية الجلد لأشعة الشمس من نوع UV.

إذا كان أحد الأمور المسجلة أعلاه ينطبق عليك (أو أنك غير متأكد)، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول نوكسافيل.

إذا كنت تطور إسهالاً وخيناً أو تقيؤ خالٍ فترة تناول نوكسافيل، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي فوراً، لأن الأمر قد يؤدي لإيقاف الفعالية السليمة للدواء. انظر للبند 4 لمعلومات إضافية.

2.3 التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ أو أخذت في الأونة الأخيرة، أو من الممكن أن تأخذ أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي بذلك.

لا يجوز تناول نوكسافيل إذا كنت تتناول أي واحد من الأدوية التالية:

- تيرفينادين (يُستعمل لعلاج الحساسيات)
- أستيميزول (يُستعمل لعلاج الحساسيات)
- سيساپيريد (يُستعمل لعلاج المشاكل في المعدة)
- بيموزيد (يُستعمل لعلاج أعراض متلازمة توربت والمرض النفسي)
- هالوفانترین (يُستعمل لعلاج الملاريا)
- كينيدين (يُستعمل لعلاج نظم قلب غير سليم).

قد يرفع نوكسافيل مستويات هذه الأدوية في الدم وبذلك يؤدي لتغيرات وخيمة جداً في نظم القلب الخاص بك.
كل دواء يحتوي على "قلويدات من نوع إرجوث"، مثل: إرجوتامين أو ديهيدروارجوتامين، المستعملة لعلاج الشقيقة. قد يرفع نوكسافيل من كمية هذه الأدوية في الدم وبذلك يؤدي إلى انخفاض وخيم في جريان الدم إلى أصابع يديك أو أصابع قدميك وقد يسبب لها الضرر. دواء من عائلة الستاتينات، مثل: سيمفاستاتين، أو تورفاستاتين أو لوفاستاتين، المستعملة لعلاج المستويات المرتفعة من الكوليسترول. فينيتوكلakis، عندما يتم استعماله في بداية العلاج بنوع من السرطان، ابيضاض الدم الليمفافي المزمن (CLL).

لا يجوز تناول نوكسافيل إذا كان أحد الأمور المسجلة أعلاه ينطبق عليك. إذا لم تكن متأكداً، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

بالإضافة إلى الأدوية المفصلة في الأعلى، هناك أدوية إضافية التي تتطوّي على انتظار لمشاكل بنظم القلب، الذي قد يكون أعلى، عندما يتم تناولها مع نوكسافيل. الرجاء تأكّد بأنك تُخبر طبيبك عن كل الأدوية التي تتناولها (أدوية مع وصفة طبية وأدوية بدون وصفة طبية).

قد تزيد أدوية معينة من الاختطار (احتمال الخطر) لأعراض جانبية الناجمة عن نوكسافيل، بسبب زيادة كمية نوكسافيل في الدم.

- قد تقل الأدوية التالية من نجاعة نوكسافيل عن طريق خفض كمية نوكسافيل في الدم:
- ريفابوتين وريفامبيسين (تُستعمل لعلاج حالات عدوى معينة). إذا كنت تتناول ريفابوتين، ستحتاج لإجراء فحص دم والحد من عدة أعراض جانبية محتملة لريفابوتين.
 - فينيتيون، كاربامازيبين، فينوباربิตال أو بيريميدون (المُستعملة لعلاج أو لمنع نوبات صرع).
 - إيفاشيرنر وفوساميريناير التي تُستعمل لعلاج عدوى HIV.
 - فلوكوكاسيلين (مضاد حيوي الذي يستعمل ضد حالات عدوى جرثومية).

- قد يزيد نوكسافيل أيضًا من الاختطار لأعراض جانبية لأدوية معينة أخرى، عن طريق زيادة كمية هذه الأدوية في الدم. هذه الأدوية تشمل:
- فينكريستين، فينبلاستين و"فليودات من نوع فينكا" أخرى (تُستعمل لعلاج السرطان)
 - فينيتكلاكس (الذي يستعمل لعلاج السرطان)
 - سيكلوسيپورين (يُستعمل من بين أمور أخرى لمنع رفض الزرع)
 - تاكروليموس وسيروليموس (تُستعمل لمنع رفض الزرع)
 - ريفابوتين (يُستعمل لعلاج حالات عدوى معينة)
 - أدوية التي تُستعمل لعلاج آفة HIV التي تُدعى مثبطات البروتياز (بما في ذلك لوبيناير وأنازاناثير، المعطاة مع ريتوناير)
 - ميدازولام، تريازولام، أليبرازولام أو "بنزوديازيبينات" أخرى (تُستعمل للتهيئة أو لإرخاء العضلات)
 - ديليتازام، فيрапاميل، نيفيديبين، نيسولديبين أو "حاصرات قنوات كالسيوم" أخرى (تُستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع)
 - ديوجوكسين (يُستعمل لعلاج قصور القلب)
 - چلبيزيد أو أدوية أخرى من نوع "سولفونيل يوريا" (تُستعمل لعلاج مستوى مرتفع من السكر في الدم).
 - حمض ريتينويك مُمْرُوق بالكامل (All-trans retinoic acid - ATRA)، المسمى كذلك تريتيونين (يُستعمل لعلاج أنواع معينة من سرطان الدم).

إذا كان أحد الأمور المسجلة أعلاه ينطبق عليك (أو أنه غير متأكد)، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول نوكسافيل.

2.4 الحمل والإرضاع

- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تعتقدين بأنك حامل قبل أن تبدئي بتناول نوكسافيل.
- لا يجوز تناول نوكسافيل إذا كنت حاملاً، إلا إذا قيل لك ذلك من قبل طبيبك.
- إذا كنت امرأة التي من الممكن أن تحمل، عليك استعمال وسيلة ناجعة لمنع الحمل خلال فترة تناول هذا الدواء. إذا دخلت في حمل خلال فترة تناول نوكسافيل، اتصل بطبيبك فوراً.

لا يجوز الإرضاع خلال فترة تناول نوكسافيل. هذا لأن كميات صغيرة من نوكسافيل قد تنتقل لحليب الأم.

2.5 السيارة واستعمال الآلات

قد تشعر بالدوخة، بالغثاء أو قد يكون لديك تشوش في الرؤية خلال فترة تناول نوكسافيل. هذه الأعراض قد تؤثر على قدرتك على السيارة، تشغيل أدوات أو آلات. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض الجانبية، لا يجوز السيارة أو استعمال أي أدوات أو آلات، ويجب الاتصال بالطبيب.

2.6 معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملг) لكل قرص، مما يعني أنه يعتبر في الواقع "حالياً من الصوديوم".

3. كيف تستعمل نوكسافيل؟

لا يجوز التبديل بين تناول نوكسافيل أقراص ونوكسافيل معلق للبلع دون التحدث مع طبيبك أو الصيدلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم - نجاعة الدواء أو لاختطار متزايد لأعراض جانبية.

يجب دائمًا تناول نوكسافيل وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.

الجرعة ومدة العلاج تحدّدان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الاعتيادية بشكل عام هي:

300 ملغ (ثلاثة أقراص من 100 ملغ) مرتين في اليوم، في اليوم الأول من العلاج. بعد ذلك 300 ملغ (ثلاثة أقراص من 100 ملغ) مرة في اليوم.

مدة العلاج قد تكون متعلقة بنوع الدوسي الموجودة لديك وقد تكون ملائمة لك بشكل شخصي من قبل طبيبك. لا تقم بملائمة الجرعة لنفسك قبل أن تستشير طبيبك ولا تُغير نظام علاجك بنفسك، دون استشارة الطبيب المعالج.
لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تناول هذا الدواء:

- يجب بلع القرص بكامله مع القليل من الماء.
- لا يجوز سحق، مضغ، كسر أو إذابة القرص (هناك نقص بالمعلومات من الأبحاث السريرية فيما يتعلق بتأثير هذه الأفعال على امتصاص القرص).
- يمكن تناول الأقراص مع أو بدون طعام.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى مما كان ينبغي

إذا تناولت جرعة مفرطة من نوكسافيل أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول نوكسافيل

- إذا نسيت جرعة، حذها لحظة تذكرك.
- بالرغم من ذلك، إذا كاد يحين وقت جرعتك التالية، تخطي الجرعة المنسية وارجع إلى الجدول الزمني الاعتيادي للتناول.
- لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتغويض عن الجرعة المنسية.

عليك إتمام العلاج كما أوصي من قبل الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن في وضعك الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة طبيبك.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! يجب التتحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. يجب وضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

4. الأعراض الجانبية

كل أي دواء، قد يسبب استعمال نوكسافيل أعراضًا جانبيةً لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تعاني من أي واحد منها.

أعراض جانبية وخيمة

أخبر طبيبك أو الصيدلي فوراً إذا كنت تلاحظ أحد الأعراض الجانبية الوخيمة التالية - من الممكن أن تحتاج إلى علاج طبي طارئ:

- غثيان أو تقيؤ، إسهال
- علامات لمشاكل في الكبد، التي تشمل اصفرار الجلد أو بياض العينين، بول داكن بشكل شاذ أو بُراز فاتح بشكل شاذ، شعور بالغثيان دون سبب، مشاكل في المعدة، فقدان شهية أو تعب أو ضعف غير اعتيادي، ارتفاع إنزيمات الكبد الذي يظهر في فحوصات الدم رد فعل تحسسي

أعراض جانبية أخرى

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تلاحظ أي واحد من الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة: الأعراض التالية قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص

- تغير بمستوى الملح في دمك الذي يظهر في فحوصات الدم - العلامات لذلك تشمل شعور بارتباك أو ضعف أحاسيس شديدة في الجلد، مثل ادخار، نخر، حكة، تنمّل، وخر أو حرقان
- آلم رأس

مستويات منخفضة من البوتاسيوم - التي تظهر في فحوصات الدم

مستويات منخفضة من المغنيسيوم - التي تظهر في فحوصات الدم

ضغط دم مرتفع	•
فقدان شهية، ألم بطن أو انزعاج في المعدة، غازات، جفاف في الفم، تغيرات في حاسة الذوق لديك حرقة المعدة (الشعور بحرقة في الصدر التي ترتفع للأعلى باتجاه الحلق)	•
مستوى منخفض من "العديلات"، نوع من خلايا الدم البيضاء (قلة العديلات - neutropenia)، الذي يظهر في فحوصات الدم. الأمر الذي قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بحالات عدوى سخونة	•
شعور بالضعف، دوخة، تعب أو ائساد طفح جلدي حكة إمساك عدم راحة في فتحة الشرج	•

أعراض جانبية غير شائعة: الأعراض التالية قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص	•
فقر دم – علامات ذلك تشمل آلام رأس، شعور بتعب أو دوخة، ضيق تنفس أو مظهر شاحب ومستوى منخفض من الهيموجلوبين في نتائج فحوصات الدم	•
مستوى منخفض من الصفيحات (قلة الصفيحات - thrombocytopenia) الذي يظهر في فحوصات الدم – قد يؤدي الأمر إلى نزيف	•
مستوى منخفض من "الكريات البيضاء - leukocytes"، نوع من خلايا الدم البيضاء، (قلة الكريات البيض - leukopenia) الذي يظهر في فحوصات الدم – قد يجعلك ذلك أكثر عرضة للإصابة بحالات عدوى	•
مستوى مرتفع من "اليوزينيات"، نوع من خلايا الدم البيضاء، (كثرة اليوزينيات - eosinophilia) – قد يحدث إذا كان لديك التهاب التهاب الأوعية الدموية	•
مشاكل في نظم القلب	•
نوبات صرع (اختلالات)	•
ضرر عصبي (اعتلال عصبي - neuropathy)	•
نظم قلب غير سليم الذي يظهر بتسجيل القلب (فحص مخطّط كهربائيّة القلب)، خفقان قلب، نظم قلب بطيء أو سريع ضغط دم مرتفع أو منخفض	•
التهاب البنكرياس (pancreatitis) – الأمر قد يسبب ألم بطن وخيم	•
اضطراب في تزويد الأكسجين للطحال (احتشاء الطحال) – الأمر قد يسبب ألم بطن وخيم	•
مشاكل وخيمة في الكلى – علامات ذلك تشمل التبول بشكل أكثر أو أقل، بلون مختلف عن المعتاد	•
مستويات مرتفعة من الكرياتينين في الدم – يظهر في فحوصات الدم سعال، فوّاق	•
نزيف من الأنف	•
الم وخيم وحاد في الصدر عند الاستنشاق (الم حنبي - pleuritic pain)	•
انتفاخ الغدد اللمفاوية (تضخم العقد اللمفاية - lymphadenopathy)	•
شعور منخفض بالحساسية، خاصة على الجلد ارتجاف	•
مستويات مرتفعة أو منخفضة من السكر في الدم تشوش الرؤية، حساسية للضوء	•
تساقط الشعر (تغلبة - alopecia)	•
تقرحات في الفم	•
قشريرية (ارتجاف)، شعور عام غير جيد	•
ألم، ألم ظهر أو رقبة، ألم في الأذرع أو في الرجلين احتباس ماء (وذمة)	•
مشاكل في الدورة الشهرية (نزيف مهبلي شاذ)	•
عدم القدرة على النوم (أرق)	•
عدم القدرة على التكلّم بشكل كامل أو جزئي	•
انتفاخ الفم	•
أحلام شديدة، أو صعوبة في النوم	•

- مشكل تنسيق أو توازن
- التهاب في الأغشية المخاطية
- احتقان في الأنف
- صعوبة في التنفس
- عدم راحة في الصدر
- شعور بالانتفاخ
- غثيان خفيف حتى وخيم، تقيؤ، انقباضات وإسهال، الناتجة عادةً عن فيروس، ألم بطن تجشؤ
- شعور بالعصبية

اعراض جانبية نادرة: الأعراض التالية قد تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 شخص

- التهاب رئتين – العلامات لذلك تشمل شعور بضيق في التنفس وإنفاس بلغم له لون ضغط دم مرتفع في الأوعية الدموية الخاصة بالرئتين (فرط ضغط الدم الرئوي). الأمر قد يؤدي إلى ضرر وخيم للرئتين وللقلب
- مشاكل في الدم مثل تخثر دم غير طبيعي أو نزيف متواصل ردود فعل تحسسية وخيمة، بما في ذلك طفح منتشر مع حويصلات وتقشر الجلد
- مشاكل نفسية مثل سمع أصوات أو رؤية أشياء غير موجودة إغماء
- مشاكل في التفكير أو في التكلُّم، حرّكات نفسيّة، خاصة في البدينين، التي لا تستطيع السيطرة عليها
- سكتة دماغية – العلامات لذلك تشمل ألم، ضعف، اختلال، أو نزف في الأطراف
- فقدان جزء من مجال الرؤية (بقعة في مجال الرؤية) أو نقطة داكنة في مجال الرؤية
- قصور قلب أو نوبة قلبية الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف دقات القلب والموت، مشاكل في نظم القلب، مع موت مفاجئ
- جلطات دموية في الرجلين (حُثار في وريد عميق) – العلامات لذلك تشمل ألم شديد أو انتفاخ الرجلين
- جلطات دموية في الرئتين (انصمام رئوي) – العلامات لذلك تشمل شعور بضيق تنفس أو ألم عند التنفس
- نزيف داخل المعدة أو الأمعاء – العلامات لذلك تشمل تقيؤ دم أو دم في البراز
- انسداد الأمعاء (intestinal obstruction)، خاصة في "المعى اللاؤقي" ("ileum"). الانسداد يمنع محتوى أمعائك من الانتقال إلى الأمعاء السفلية. العلامات لذلك تشمل شعور بالانتفاخ، تقيؤ، إمساك وخيم، فقدان شهية، وتشنجات
- "متلازمة انحلال الدم البيريمي" عندما تتفكك خلايا الدم الحمراء (انحلال الدم)، التي قد تحدث مع أو بدون قصور كلوي
- "قلة الكريات الشاملة - pancytopenia"، مستوى منخفض من جميع خلايا الدم (خلايا دم حمراء، خلايا دم بيضاء وصفائحات)، الذي يظهر في فحوصات الدم
- يقع بنسجية كبيرة على الجلد (فرفرية قلة الصفيحات التخثرية)
- انتفاخ الوجه أو اللسان
- اكتئاب
- رؤيه مضاعفة
- ألم في الثدي
- أداء غير سليم للغدة الكظرية (الغدة فوق الكلوية). الأمر قد يؤدي إلى ضعف، تعب، فقدان شهية، تغير في لون الجلد
- أداء غير سليم للغدة النخامية. الأمر قد يؤدي إلى مستويات منخفضة من هرمونات معينة في الدم، التي تؤثر على وظيفة الأعضاء التناسلية لدى الرجل أو المرأة
- مشاكل سمع
- الدوستيرونية كاذبة (pseudoaldosteronism)، التي تسبب ضغط دم مرتفع مع مستوى منخفض من البوتاسيوم (يتم رؤيته في فحص الدم)

اعراض جانبية شيو عها غير معروف: لا يمكن تقدير شيو عها وفقاً للمعلومات الموجودة

- جزء من المُتعالجين يُلغوا أيضًا عن شعور بالارتباك بعد تناول نوكسافيل.
- احمرار الجلد

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة طبيبك.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه لنموذج الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية،

أو عن طريق الدخول للرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين نوكسافيل؟

- تجنب التسمم! هذا الدواء، مثل أي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ونظرهم، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقوّف دون أمر صريح من الطبيب.
- لا يجوز استعمال نوكسافيل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المذكور على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.
- شروط التخزين: يجب التخزين دون 30 درجة مئوية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الخطوات تساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

6.1 بالإضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على المركبات غير الفعالة التالية:

hypromellose acetate succinate; hydroxypropylcellulose; cellulose, microcrystalline; croscarmellose sodium; silica dental type; magnesium stearate, polyvinyl alcohol, macrogol/PEG 3350, titanium dioxide, talc, iron oxide yellow.

6.2 كيف تبدو أقراص نوكسافيل ومحتوى العبوة

نوكسافيل **100** ملغ أقراص مقاومة-في المعدة هي ذات طلاء أصفر وعلى شكل كبسولة، بطول 17.5 ملم، مع "100" مختوم على أحد جانبيها.

حجم العبوات: عبوة لويحة بداخل كرتون التي تحتوي على 24 أو 96 قرصاً.
قد لا تكون جميع أحجام العبوات مسوقة.

صاحب التسجيل والمستورد:

شركة ميرك شارب ودوهم (إسرائيل - 1996) م.ض، هشارون 34، هود-هشارون.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة

156-42-34550

تم التتفيق في آب 2024.

لتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.