

עלון לצרcn לפי תקנות הרוקחים (תקנירם) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

קייטרודה 100 מ"ג/מ"ל תמיסה מרוכצת להכנת תמיסה לעירוי תוך וריד

כל בקבוקן מכיל:
פمبرוליזומאב 100 מ"ג
Pembrolizumab 100 mg

לרשימה של החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 6.1 "מה קייטרודה מכילה".

קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם תשמש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על קייטרודה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא שלך או אל הרוקח.
- תרופה זו נרשמה לטיפול עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה כי מצבם הרפואי דומה לשין.

בנוסף לעalon, לתכשיר קייטרודה קיימים כרטיסים למתופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בקייטרודה ולפעול על פיו. יש לעיין בכרטיסים למתופל ובעalon לצרcn בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיסים לעין נוספת במידת הצורך.

1. למה מיועדת קייטרודה?

קייטרודה הינה תרופה מרשם המשמש לטיפול ב:

- سرطان עור מסווג מלנומה. ניתן להשתמש בקייטרודה במוגרים וילדים מגיל 12 ומעלה:
 - כאשר המלנומה שלך התפשטה או שאינן אפשרות להסירה על ידי ניתוח (מלנומה מתקדמת), **או**
 - עם מלנומה בשלב IIIB או בשלב III, כדי לסייע במניעת חזרה של מלנומה לאחר שהיא אובלותות לימפה שחיכלו סרטן הוורו בניתוח.
 - سرطان ריאות מסווג סרטן הריאה של תאים שאין-קטנים (NSCLC).
- ניתן להשתמש בקייטרודה בשילוב עם התרופות הכימותרפיות פטראקסד וקרבופלטין לטיפול הראשוני של כאשר סרטן הריאה שלך:
 - התפשט (NSCLC מתקדם) **ו**,
 - הינו מסווג סרטן ריאה הקריי "לא קשקש" ("non-squamous") **ו**,
 - LAGIDOL שלך אין גן לא תקין של "EGFR" או "ALK".
- ניתן להשתמש בקייטרודה בשילוב עם התרופות הכימותרפיות קרבופלטין ופקליטיקסל או פקליטיקסל מצומד-חלבן לטיפול הראשוני של כאשר סרטן הריאה שלך:
 - התפשט (NSCLC מתקדם) **ו**,
 - הינו מסווג הקריי "Κεκκσ" ("squamous").
- ניתן להשתמש בקייטרודה לבדה כאשר סרטן הריאה שלך:
 - התפשט (NSCLC המתקדם) **ו**,
 - הינו חיובי ל- "PD-L1" **ו**,
 - טיפול הראשוני שלך אם לא קיבלת כימותרפיה לטיפול ב- NSCLC המתקדם שלך ולגידול שלך אין גן לא תקין של "ALK" או "EGFR" **או**,

וא

- טיפול בכימותרפיה המכילה פלטינום לטיפול ב- NSCLC המתקדם שלך, והוא לא פעולה או אינה פעולה יותר, **ו**
- אם לגידול שלך יש גן לא תקין של "ALK" או "EGFR", קיבלת גם טיפול בתרופה מסווג מעכבר EGFR או ALK והוא לא פעולה או אינה פעולה יותר.
- ניתן להשתמש בקייטרודה לבדה במוגרים לטיפול בסרטן הריאה שלך:
 - כדי לסייע במניעת חזרה של סרטן הריאה שלך לאחר שהגידול/ים שלך הושרו בניתוח וטופלת בכימותרפיה המכילה פלטינום, **ו**

- יש לך סרטן ריאה של תאים שאינם-קטנים (NSCLC) בשלב II והגידולים שלך הינם בגודל 4 ס"מ או יותר, שלב II או שלב III.
- סרטן ראש וצואר ממקור תא קשקש (HNSCC):
 - ניתן להשתמש בקייטרודה בשילוב עם התרופות הכימותרפיות פלאורואורציל ופלטינום לטיפול הראשון שלך כאשר סרטן הראש וצואר שלך התפשט או חזר ואני ניתן להסרה על ידי ניתוח.
 - ניתן להשתמש בקייטרודה לבדה לטיפול הראשון שלך כאשר סרטן הראש וצואר שלך:
 - התפשט או חזר ואני ניתן להסרה על ידי ניתוח, ו-
 - הינו חיובי ל- "PD-L1".
 - ניתן להשתמש בקייטרודה לבדה כאשר סרטן הראש וצואר שלך:
 - התפשט או חזר ו-
 - קיבלת כימותרפיה המכליה פלטינום, והוא לא פעולה או אינה פועלת יותר.
- סרטן מסווג לימפומת הودג'קין קללאסית (HL):
 - במבוגרים כאשר:
 - ה- HL שלך חזר או
 - ניסית טיפול והוא לא עבד, או
 - בילדים כאשר:
 - ניסית טיפול והוא לא עבד, או
 - ה- HL שלך חזר לאחר שקיבלה 2 או יותר סוגים של טיפול.
- סרטן מסווג למפומה ראשונית של המיצר - (PMBCL) primary mediastinal B-cell lymphoma, במבוגרים וילדים כאשר:
 - ניסית טיפול והוא לא עבד או
 - ה- PMBCL שלך חזרה לאחר שקיבלה 2 או יותר סוגים של טיפול.
- סרטן שלפוחית השתן ודרכי השתן (urothelial cancer).
 - ניתן להשתמש בקייטרודה לבדה כאשר סרטן שלפוחית השתן או דרכי השתן שלך:
 - התפשט או שאין אפשרות להסירו על ידי ניתוח (סרטן מתקדם של דרכי השתן) ו-
 - איןך יכול לקבל כימותרפיה המכליה תרופה שנקראת ציספלטין, והגידול חיובי ל- "PD-L1", או
 - איןך יכול לקבל תרופה שנקראת ציספלטין או קרבופלטין (לא תלות ב "PD-L1"), או
 - המחלת התקדמה במהלך או לאחר שקיבלה כימותרפיה המכליה פלטינום.
 - ניתן להשתמש בקייטרודה לבדה אם הסרטן שלך לא התפשט לרקמה סמוכה שלפוחית השתן, אך נמצא בסיכון גבוה להתקשות (סרטן שלפוחית השתן שאיןחו חומר שריר [NMIBC] בסיכון גבוה) כאשר:
 - הגידול שלך הוא מסווג קרצינומה ממוקמת ("carcinoma in situ" CIS), וגם
 - ניסית טיפול ב- BCG (Bacillus Calmette-Guerin) אשר לא עבד, וגם
 - איןך כשיר או שבחרת שלא לעבור ניתוח לכרייתת שלפוחית השתן שלך.
- סרטן שמוגדים על ידי בדיקת מעבדה כגידול מזק של (MSI-H) microsatellite instability-high (dMMR) mismatch repair deficient. ניתן להשתמש בקייטרודה במבוגרים וילדים לטיפול ב:
 - סרטן שההתפשט או שאין אפשרות להסירו על ידי ניתוח (סרטן מתקדם), ו-
 - התקדם לאחר מתן טיפול סיסטמי, ואין עבורך אפשרויות טיפול מספקות, או
 - יש לך סרטן המעי הגס או החלחולת (רכותם), שהתקדם למרות טיפול בכימותרפיה עם פלאורופירימידין, אוקסאליפליטין, ואריניטוקאן.
- לא ידוע אם קיטרודה בטוחה ויעילה בילדים עם סרטני H-MSI של המוח או חוט השדרה (סרטנים של מערכת העצבים המרכזית).
 - סרטן המעי הגס או החלחולת. ניתן להשתמש בקייטרודה לטיפול ראשון כאשר הסרטן שלך:
 - התפשט או שלא ניתן להסירו בניתוח (סרטן מעי גס או החלחולת מתקדם), ו-
 - הודגם על ידי בדיקת מעבדה C- (H-MSI) microsatellite instability-high mismatch repair deficient או (dMMR).
- סרטן קיבה הרנקרה אנדוקרצינומה של הקיבה או של חיבור ושת-קיבה (GEJ). ניתן להשתמש בקייטרודה במבוגרים בשילוב עם התרופה טראסוטוזומאב יחד עם תרופות כימותרפיות מבוססות פלאורופירימידין ופלטינום לטיפול הראשון שלך כאשר סרטן הקיבה שלך:
 - חיובי ל- HER2, והגידול שלך הינו חיובי ל- "PD-L1", ו-
 - התפשט או שלא ניתן להסירו בניתוח (סרטן קיבה מתקדם).
- סרטן ושת או קרצינומה של חיבור ושת-קיבה (GEJ) מסווג מסויים. ניתן להשתמש בקייטרודה בשילוב עם תרופות כימותרפיות מבוססות פלטינום ופלאורופירימידין, כאשר:

- הסרטן שלך לא ניתן לריפוי על ידי ניתוח או על ידי טיפול משולב של כימותרפיה וקרינה.
- סרטן ושת הנקרא קרצינומה ממוקור תאי קשקש. ניתן להשתמש בקייטרודה כאשר:
 - הסרטן שלך חוזר או התפשט (סרטן ושת מתקדם), I
 - הגידול שלך הינו חיובי ל- "1-L1-PD" וקיבלה סוג אחד או יותר של טיפול והוא לא עבד או אינו עובד יותר.
 - סרטן צואר הרחם שהינו חיובי ל- "1-L1-PD".
- ניתן להשתמש בקייטרודה בשילוב עם תרופות כימותרפיות, בשילוב או ללא התרפיה בוואציזומאב, כאשר סרטן צואר הרחם שלך לא געלם (עיקש), חוזר, או התפשט (סרטן מתקדם של צואר הרחם)
- ניתן להשתמש בקייטרודה לבדה כאשר סרטן צואר הרחם שלך:
 - חזר או התפשט (סרטן מתקדם של צואר הרחם) I
 - קיבלת כימותרפיה שלא בעבה או שאינה עובדת יותר.
- סרטן של צינור המריה או כיס המריה הנקרא סרטן של דרכי המריה. ניתן להשתמש בקייטרודה בשילוב עם התרופות הכימותרפיות ג'מציטבין וציספלטין כאשר סרטן דרכי המריה שלך התפשט או אינו ניתן להסраה על ידי ניתוח.
- סרטן עור מסווג קרצינומה של תא מרקל (MCC) בילדים ובמבוגרים. ניתן להשתמש בקייטרודה לטיפול הסרטן עור זה אשר התפשט או חזר.
- סרטן כליה הנקרא קרצינומה של תא הכליה (RCC).
- ניתן להשתמש בקייטרודה בשילוב עם התרפיה אקסיטיניב לטיפול הראשון שלך כאשר סרטן הכליה שלך התפשט או שאין אפשרות להסרו על ידי ניתוח RCC מתקדם.
- ניתן להשתמש בקייטרודה בשילוב עם התרפיה לנוטריןיב לטיפול הראשון שלך כאשר סרטן הכליה שלך התפשט או שאין אפשרות להסרו על ידי ניתוח RCC מתקדם.
- ניתן להשתמש בקייטרודה לבדה אם הינך בסיכון ביןוני-גבוה או גבוה להישנות של סרטן הכליה (RCC) שלך לאחר ניתוח:

 - להסרת כל או חלק מהכליה שלך, או
 - להסרת כל או חלק מהכליה שלך וגם ניתן להסרת סרטן שהתפשט לאזורי אחרים בגוף (נגעים גורומיים).

- סרטן רחם מסווג קרצינומה מתקדמת או חוזרת של רירית הרחם.
- ניתן להשתמש בקייטרודה בשילוב עם התרפיה לנוטריןיב:
 - כאשר קיבלת כימותרפיה המכילה פלטינום, והיא אינה פועלת יותר, I
 - הסרטן שלך לא ניתן לריפוי על ידי ניתוח או קרינה.
- סרטן שבבדיקה נמצא כגידול עם עומס מוטציות גבוהה (H-TMB). ניתן להשתמש בקייטרודה במבוגרים וילדים לטיפול ב:
 - גידולים מוצקיים שהתפשלו או שאין אפשרות להסרים על ידי ניתוח (סרטן מתקדם), I
 - קיבלת טיפול נגד הסרטן, והוא לא פועל או לא פועל יותר, I
 - אין עבורך אפשרויות טיפול מספקות.
- לא ידוע אם קיטרודה בטוחה ויעילה בילדים עם סרטני H-TMB של המוח או חוט השדרה (סרטנים של מערכת העצבים המרכזית).
- סרטן עור מסווג קרצינומה עורית של תא קשקש (SCC). ניתן להשתמש בקייטרודה כאשר סרטן העור שלך:
 - חזר או התפשט, I
 - לא ניתן לריפוי על ידי ניתוח או קרינה.
- סרטן שד מסווג טרייפל-נטטיב (Triple-Negative Breast Cancer, TNBC).
- ניתן להשתמש בקייטרודה בשילוב עם תרופות כימותרפיות לטיפול לפני ניתוח ואז להמשיך בקייטרודה לבדה לטיפול אחרני ניתוח כאשר:
 - יש לך סרטן שד בשלב מוקדם, I
 - הינך בסיכון גבוה לחזרה של סרטן השד שלך.
- ניתן להשתמש בקייטרודה בשילוב עם תרופות כימותרפיות כאשר סרטן השד שלך:
 - חזר ולא ניתן להסרו על ידי ניתוח או התפשט, I
 - הינו חיובי ל- "PD-L1".

קבוצה רפואיית: אנטי נאופלסט, נוגדן חד-שבטי מואנש.

2. לפני השימוש בקייטרודה אין להשתמש בקייטרודה:

אם הינך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (פמברוליזומאב) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (לרשימה של המרכיבים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6).

2.1 אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בקיטרודה לפני הטיפול בקיטרודה, ספר לרופא שלך אם:

- יש לך בעיות במערכת החיסון כגון מחלת קrhohn, קוליטיס כיבית, או זאבת
- עברת השתלת איברים (לדוגמה כליה או כבד), או רקמה, כולל השתלת קרנית
- עברת או הינך מתכוון לבצע השתלת תא גזע מתרום (אלוגנאית)
- יש לך בעיות בריאות או נשימה
- יש לך בעיות בכבד
- קיבלת טיפול קרינתי לאחור החזה שלך
- יש לך מצב רפואי המשפע על מערכת העצבים שלך, כגון מייאסטניה גראביס (myasthenia gravis) או תסמונת גיליאן-ברה (Guillain-Barré syndrome)
- יש לך בעיות רפואיות אחרות כלשהן
- את בהריון או מתכוונת להיכנס להריון, מניקה או מתכוונת להניק (ראי סעיף 2.5 "הריון, הנקה ופוריות")

2.2 ילדים ומתבגרים

קיטרודה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 עברו מלנומה, למופמת הוודג'ין קלואסית (LCH), למופמה ראשונית של המיצר (PMBCL), קרצינומה של תא מרקל (MCC), סרטן H-MSI או dMMR, או סרטן H-TMB, מאחר ובתי חיות ויעילות השימוש בילדים הוכחה להטויות אלו.

2.3 בדיקות ועקב
במהלך הטיפול בקיטרודה, הרופא שלך יערך לך בדיקות דם כדי לבדוק אם יש לך תופעות לוואי.

2.4 תగובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם רפואי ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

2.5 הריון, הנקה ופוריות

- הריון**
 - פני שתתקבי בקיטרודה, ספר לרופא שלך אם הינך בהריון או מתכוונת להיכנס להריון.
 - קיטרודה עלולה לגרום בעובר שלך.
שים היכולות להרות:
 - הרופא שלך יורה לך לבצע בדיקת הריון לפני שתתחילה את הטיפול עם קיטרודה.
 - עליך להשתמש באמצעי מניעהיעיל למניעת הריון במהלך הטיפול עם קיטרודה ובמשך 4 חודשים לאחר המנה האחורה של קיטרודה. דבריו עם הרופא שלך בנוגע לאמצעים למניעת הריון בהם את יכולה להשתמש במהלך הזמן זהה.
 - ספר לרופא שלך מיד אם את חושבת שאתה בהריון או אם נכנסת להריון במהלך הטיפול בקיטרודה.
- הנקה**
 - פני שתתקבי בקיטרודה, ספר לרופא שלך אם את מניקה או מתכוונת להניק.
 - לא ידוע אם קיטרודה עוברת לחלב האם שלך.
 - אין להניק במהלך הטיפול בקיטרודה ובמשך 4 חודשים לאחר המנה האחורה של קיטרודה.

3. כיצד תשמש בקיטרודה?

תמיד יש להשתמש בקיטרודה לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא שלך או הרוקח אם אין לך בעיות במינון ואופן הטיפול בתכשיך.

המינון ובמשך הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

- קיטרודה ניתנת לך תור-וריידית על ידי הרופא שלך, באמצעות צינורית תור-וריידית במשך 30 דקות.
- קיטרודה ניתנת בדרך כלל כל 3 שבועות.
- הרופא שלך ייחלט כמה טיפולים אתה צריך.
- אין לעובר על המנה המומלצת.

אם הפסدت תורמים כלשהם, דבר עם הרופא שלך בהקדם האפשרי, כדי לקבוע עבורך תור חדש.

אם אתה מפסיק לקבל קיטרודה

הפסקת הטיפול שלך עלולה להפסיק את ייעילות התרפופה. אל תפסיק את הטיפול שלך בקיטרודה אלא אם התייעצת עם הרופא שלך.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרפופה, הייעץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרפופה, השימוש בקיטרודה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רישימת תופעות הללו. יתכן ולא תסבול מכך אחות מהן.

קיטרודה הינה תרפופה העשויה לטפל בסוגי סרטן מסויימים על ידי שפועל מערכת החיסון שלך. קיטרודה עלולה לגרום למערכת החיסון שלך לתקוף איברים ורקמות תקינים בכל אזור בגוף ולהשפיע על אופן פעולתם. בעיות אלו עלולות להופיע לחמורות או מסכנות חיים ועלולות להוביל למותות. יתרן ותוחווות יותר מבעה אחת, מביעות אלו, בו זמן. בעיות אלו עלולות להתרחש בכל זמן במהלך הטיפול או אף לאחר שהטיפול שלך הסתיים.

דבר או הפגש עם הרופא שלך מיד, אם אתה מפתח תסמינים כלשהם של הבעיות הבאות או שההסתומים הללו מחמירים:

- בעיות בריאה (דלקת ברקמת הריאה). תסמינים של דלקת ברקמת הריאה יכולים לכלול: קוצר נשימה; כאב בחזה; שיעול.
- בעיות במעיים (דלקת המעי הגס) עלולות לגרום לקרעים או חורים במעיים שלך. סימנים ותסמינים של דלקת המעי הגס יכולים לכלול:
שלשול (צואה רכה מהרגיל) או פעילות מעיים בתכיפות גבוהה מהרגיל; צואה בצבע שחור, דמוית זפת, דביקה, או דמיה או רירית; כאב חמוץ או רגשות חרומה באזורי הבطن.
- בעיות בכבד (דלקת כבד). סימנים ותסמינים של דלקת כבד יכולים לכלול:
הזהבה של העור שלך או של החלק הלבן בעיניהם; בחילה חרומה או הקאה; כאב מצד הימני של אזור הבطن; שתן כהה (בצבע תה); תחושת רעב פוחנה מהרגיל; דימום או הופעת חבותות בклות רeba יותר מהרגיל.
- בעיות בבלוטות הורמונליות (במיוחד בלוטת התריס, יותרת המות, יותרת הכליה והלבלב). סימנים ותסמינים לכך שהבלוטות ההורמונליות שלך אין פועלות כשרה יכולים לכלול:
דופק מהיר; עלייה או ירידה בממשק; העזה מגברת; עיפות קיזונית; תחושת רעב או צמא מגברת מהרגיל;
הטלת שתן לעתים קרובות יותר מהרגיל; נשירת שיער; תחושת קור; עצירות; התעבות הקול; כאבי שרירים;
תחושה של חולשה מרובה, סחרחות או התעלפות; כאבי ראש שאינם חולפים או כאב ראש לא רגיל; רגשות בעין לאו; בעיות בעין; שינויים בהתנהגות או במצב הרוח, כגון ירידה בחשך המני, רגונות או שכחה.
- סוכרת מסוג 1, כולל חמצת קטוטית סוכרתית (חומרה בدم שנוצרת בעקבות סוכרת), תסמינים עלולים לכלול תחושת רעב מגברת או צמאן יותר מהרגיל, צורך במנתן שתן לעתים יותר קרובות או ירידה בממשק, הרגשת עייפות או תחושת בחילה, כאב בטן, נשימה מהירה ועמוקה, בלבול, ישנות יותרת דופן, ריח מתוק לנשימה שלך, טעם מתוק או מתכתי בפה שלך, או ריח שונה לשתן או לזרעה שלך.
- בעיות בבלילה, כולל דלקת כליות וכשל כליתי. סימנים של בעיות בבלילה יכולים לכלול:
שינויים בכמות או מצבו של השתן שלך; נפיחות של הקרטולים שלך; איבוד תיאבן.
- בעיות בעור. סימנים של בעיות בעור יכולים לכלול:
פריחה; גרד; שלפוחיות, קילוף או פצעים בעור; פצעים או כיבים כאבים בפה שלך או באף, בגרון או באזורי איברי המין שלך; חום או תסמים דמוני שפעת; נפיחות בקשרי ליפפה.
- בעיות עלולות להופיע גם באיברים אחרים וברקמות אחרות. אלו לא כל הסימנים וההסתומים של בעיות במערכת החיסון שעלולות להופיע בעקבות שימוש בקיטרודה. פנה אל הרופא שלך באופן מיידי במקרה של תסמין חדש או תסמין שמחמיר אשר יכול לכלול:
 - קוצר נשימה, דופק לא סדר, הרגשת עייפות, נפיחות של הקרטולים, או כאב בחזה (דלקת שריר הלב)
 - בלבול, ישנות, חום, חולשת שרירים, בעיות שיוי משקל, בחילה, הקאה, נוקשות בצוואר, שינויים בהתנהגות או במצב הרוח, בעיות זיכרון, או פרוכסומים (דלקת מוח), כאב, התכווצות שרירים, חוסר תחושה, עקצוץ, או חוסר תחושה של הידיים או הרגליים, בעיות בלפלופחת השנתן או בעמי, כולל הצורך לתת שתן לעתים תכופות יותר, דליפת שתן, קושי במתן שתן, או עצירות (מיאלטייס, תהליין דלקתי לאורך חוט השדרה),
 - שינויים בחודות הראייה, שינויים בראייה, כאב בעין
 - כאבים חמורים או מתמשכים בשירים או במפרקם, חולשת שרירים חרומה

- ספירה נמוכה של כדוריות דם אדומות (אנמיה), הופעת חבורות נפיחות בקשרי לימפה, פריחה או גושים רגשיים בעור, שיעול
- **תגובהות לעירוי (טור-ורידי), שעילותות לעיטים להיות חמורות ומסכנות חיים.** סימנים ותסמינים של תגובהות לעירוי יכולים לכלול: צמרמות או רעד; קוצר נשימה או צפצופים; גוד או פריחה; הסמקה; סחרורת; חום; תחושת עילפון, כאב גב.

דחיה של איברים מושתלים או רקמה. אנשים שעברו השתלת איברים או רקמה עלולים להיות בעלי סיכון מגובר לדחיה האיבר או הרקמה המושתלים. על הרופא לומר לך על אלו סימנים ותסמינים עליהם לדווח, והוא יבצע מעקב, בהתאם לסוג השתלת האיבר או הרקמה שהיתה לך.

סיבוכים, כולל מחלת השתל נגד המאכון (GVHD), באנשים שעברו השתלת מוח עצם (תאי גזע) מתרומם (אלוגנאי). סיבוכים אלו עלולים להיות חמורים ולהוביל למות. סיבוכים אלו עלולים לקרות אם עברת השתלה לפני או אחרי טיפול בקייטרודה. הרופא שלך יבצע מעקב לzychוי הסימנים והתסמינים הבאים: פריחה בעור, דלקת כבד, כאב באזורי הבطن, ושלשול.

פניה מיידית לקבالت טיפול רפואי לשיעור במניעת החמרה של בעיות אלו. הרופא שלך יבודק אותך לגביה בעיות אלו בזמן הטיפול בקייטרודה. יתכן והרופא שלך יטפל ברם עם תרופות קורטי考וסטרואידיות או תחלפי הורמוניים. יתכן והרופא שלך ידחה או יפסיק לחלוין את הטיפול בקייטרודה, אם יש לך תופעות לוואי חמורות.

תופעות הלועאי הבאות דוחו עם קיטרודה לבדה:

תופעות לוואי שכיחות מאד (דוחו ביוטר מ- או שווה ל- 10% מהמתופלים) ספירה נמוכה של תאי דם אדומים, קצב לב לא סדר, רמות נמוכות של הורמון בלוטת התריס, רמות גבוהות של הורמון בלוטת התריס, עצירות, שלשול, בחילה, כאב באזורי הבطن, הקאה, חום, הרגשת עיפות או חולשה, כאב, מחלת דמוית שפעת, בעיות בכבד, עלייה של אנדמי הכבד בדם, זיהום בדרכי הנשימה העליונות, זיהום בריאות, זיהום בדרכי השתן, זיהומים אחרים, ירידת בתיאבון, ירידת ברמת הננתן בדם, ירידת במשקל, כאב גב, כאב בשירים, בעצם או במפרקים, כאב ראש, עקוץ, או חסור תחושה של הזරעות או הרגליים, שיעול, קוצר נשימה, דלקת ריאות, עלייה ברמת הקראטינין בדם, דם בשתן, פגיעה כליתית פתואמית, פריחה, שינוי צבע העור, גרד, התנפחות הזרעות או הרגליים, התנפחות הפנים, דימום, ותוצאות לא תקין של בדיקות מעבדה.

תופעות לוואי שכיחות (דוחו עד 1% עד פחות מ- 10% מהמתופלים) תופעות הקשורות למתן התרופה באינפוזיה (Infusion reactions), דלקת עורניים, דלקת של שריר הלב (מיוקרייטיס), דלקת קרום הלב, דלקת של בלוטת התריס, הצלברות של נזול מסביב לב, דלקת מפרקים, כאב בשירים, כאבים או רגשות, כאב צוואר, סחרורת, נזוי שינה, שינוי במצב נפשי, ירידת במספר תא הדם הלבנים (נויטרופילים) עם חום, זיהום בדם, קשיים בבלעה, כאב גרון, פצעים בפה או נפיחות ברירית הפה, האף, העיניים, הגרון, המעי או הנרתיק, תגובה אלרגית עם סימנים שלשולים לכלול צפצופים, קשיים בבלעה, פריחה או סרפדת, גרד, התנפחות, פצעים וכאים או כיבים בפה או באף, בגין או באזורי איברי המין ועליה זמןית בגודל של גידול או של התסמינים הקשורים לגידול.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (דוחו בפחות מ- 1% מהמתופלים) דלקת של חוט השדרה (מיאליטיס)

תופעות לוואי של קיטרודה כשניתנת לבדה אשר שכיחות יותר בילדים מאשר מבוגרים כוללות: חום, הקאה, כאב ראש, כאב באזורי הבطن, רמות נמוכות של תא הדם הלבנים, הטסיות או תא הדם האדומים (אנמיה).

תופעות הלועאי הבאות דוחו עם קיטרודה כאשר ניתנת בשילוב עם תרופות כימותרפיות:

תופעות לוואי שכיחות מאד (דוחו ביוטר מ- או שווה ל- 20% מהמתופלים) בחילה, עצירות, שלשול, הקאה, כאב באזורי הבطن, זיהומים בדרכי השתן, הרגשת עיפות, חום, ירידת במשקל, ירידת בתיאבון, כאב במפרק ובשריר, עקוץ, או חסור תחושה של הזרעות או הרגליים, כאב ראש, נזוי שינה, שיעול, קוצר נשימה, פריחה, נשירת שער, פצעים בפה או נפיחות ברירית הפה, האף, העיניים, הגרון, המעי או הנרתיק, לחץ דם גבוה, ותוצאות לא תקין של בדיקות מעבדה.

תופעות לוואי שכיחות מודג' (דווחו ביותר מ- 10% ופחות מ- 20 מהמטופלים)
רמות נמוכות של הורמון בלוטת התריס, קשיים בבלעה, זיהום בריאות, גרד.

תופעות לוואי שכיחות (דווחו ב- 1% עד 10% מהמטופלים)
כאב צואר, סחרחות.

תופעות הלואין הבאות דווחו עם קיטרודה כאשר ניתן בשילוב עם תרופות כימותרפיות ובואציזומאב:

תופעות לוואי שכיחות מודג' (דווחו ביותר מ- או שווה ל- 20% מהמטופלים)
ספירה נמוכה של תא דם אדומיים, ספירה נמוכה של תא דם לבנים, ספירה נמוכה של טסיות, רמות נמוכות של הורמון בלוטת התריס, בחילה, שלשול, עצירות, הקאה, הרגש עייפות או חולשה, זיהום בדרכי השטן, ירידה בתיאבון, כאב במפרק, עקצוץ, או חוסר תחושה של הידיים או הרגליים, נשירת שער, פריחה, לחץ דם גבוה, ותוצאות לא תקין של בדיקות מעבדה.

תופעות הלואין הבאות דווחו עם קיטרודה כאשר ניתן בשילוב עם אקסיטיניב:

תופעות לוואי שכיחות מודג' (דווחו ביותר מ- או שווה ל- 20% מהמטופלים)
רמות נמוכות של הורמון בלוטת התריס, שלשול, עצירות, הקאה, הרגש עייפות או חולשה, בעיות בכבד, ירידה בתיאבון, צרידות, שיעול, שלפוחיות או פריחה בכפות הידיים שלך ובכפות הרגליים שלך, פצעים בפה או נפיחות ברירית הפה, האף, העיניים, הגרון, המעי או הנרתיק, פריחה, לחץ דם גבוה, ותוצאות לא תקין של בדיקות מעבדה.

תופעות לוואי שכיחות (דווחו ב- 1% עד 10% מהמטופלים)
קצב לב לא סדיר.

תופעות הלואין הבאות דווחו עם קיטרודה כאשר ניתן בשילוב עם לנוטיניב:

תופעות לוואי שכיחות מודג' (דווחו ביותר מ- או שווה ל- 20% מהמטופלים)
רמות נמוכות של הורמון בלוטת התריס, שלשול, פצעים בפה, בחילה, כאב באזור הבطن, הקאה, עצירות, הרגש עייפות, בעיות בכבד, זיהום בדרכי השטן, ירידה בתיאבון, ירידה במשקל, כאב במפרק ובשריר, כאב ראש, חלבון בשתן שלך, בעיות בcliffe, צרידות, פריחה, שלפוחיות או פריחה בכפות הידיים שלך ובכפות הרגליים שלך, לחץ דם גבוה, דימום, ותוצאות לא תקין של בדיקות מעבדה.

תופעות לוואי שכיחות (דווחו ב- 1% עד 10% מהמטופלים)
סימנים לבעה בלב, הכוללים כאב או לחץ בחזה, כאב בזרועות, בגב, בצוואר או בלסת שלך, קוצר נשימה, קצב לב מהיר או לא סדיר, שיעול, גוון כחלחל בשפטים או באצבעות, והרגשה של עייפות רבה.

תופעות לוואי הבאות דווחו עם שכיחות שנייה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעו):

ירידה ביכולת של הלבלב לייצר אנזימי עיכול, אשר עלולה לכלול שלשול עם צואה רכה ושותנית, ירידה במשקל, מחלת עצם מטבולית, ומחסור ביוטמינים או במינרלים, כאב באזור הימני העליון של הבطن, נפיחות של הכלב או של הטחול, הרגש עייפות, גרד, או הצהבהה של העור או של החלק הלבן בעיניים.

אלו אין כל תופעות הלואין האפשריות של קיטרודה. למידע נוסף, שאל את הרופא שלך או הרוקח. ספר לרופא שלך אם יש לך תופעת לוואי כלשהי המטרידה אותך או שאינה חולפת. אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מטופעת הלואין מחייבה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה בעלון זה, עליך להתייעץ עם הרופא שלך.

דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

- מנע הרעליה! תרופה זו, וכל תרופה אחרת, יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מרופא!
- אין להשתמש בקייטרודה לאחר תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתויחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:**
יש לאחסן את הבקבוקונים בקירור ב- 2°C עד 8°C בקרטון המקורי, על מנת להגן מאוור. אין להקפיא. אין לנער.
- אין להשילך תרופות לביב או לפחות אשפה ביתית. שאל את הרוקח איך להשילך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, קיטרודה מכילה גם:

Water for injection, sucrose, L-histidine, polysorbate 80.

כיצד נראה KEYTRUDA ומה תוכן האריזה

קייטרודה הינה תמייסה צולולה עד מעט בהתקת, חסרת צבע עד מעט צהובה.

קייטרודה משווקת בקרטון המכיל בקבוק אחד של 100 mg/4 mL (25 mg/mL) לשימוש חד-פעמי.

בעל הרישום והיבואן

חברת מרכז שארפ' ודוחם (ישראל - 1996) בע"מ, החרש 34, הוד-השרון.

נערך בספטמבר 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 154.38.34448

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נושא בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Instructions for healthcare professionals

Preparation and Administration

Preparation for Intravenous Infusion

- Visually inspect the solution for particulate matter and discoloration prior to administration. The solution is clear to slightly opalescent, colorless to slightly yellow. Discard the vial if visible particles are observed.
- Dilute **KEYTRUDA 100 mg/4 mL** (concentrated solution) prior to intravenous administration.
- Withdraw the required volume from the vial(s) of **KEYTRUDA** and transfer into an intravenous (IV) bag containing 0.9% Sodium Chloride Injection, USP or 5% Dextrose Injection, USP. **Mix diluted solution by gentle inversion.** Do not shake. The final concentration of the diluted solution should be between 1 mg/mL to 10 mg/mL.
- Discard any unused portion left in the vial.

Storage of Diluted Solution

The product does not contain a preservative.

From a microbiological point of view, the product, once diluted, should be used immediately. If not used immediately, store the diluted solution from the **KEYTRUDA 100 mg/4 mL** vial either:

- At room temperature for no more than 6 hours from the time of dilution. This includes room temperature storage of the diluted solution, and the duration of infusion.
- Under refrigeration at 2°C to 8°C for no more than 96 hours from the time of dilution. If refrigerated, allow the diluted solution to come to room temperature prior to administration. Do not shake.

Discard after 6 hours at room temperature or after 96 hours under refrigeration.

Do not freeze.

Administration

- Administer diluted solution intravenously over 30 minutes through an intravenous line containing a sterile, non-pyrogenic, low-protein binding 0.2 micron to 5 micron in-line or add-on filter.
- Do not co-administer other drugs through the same infusion line.