

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) המשתי"ו - 1986

התרופה משוקעת על פי מרשם רופא בלבד

פינגולמוד טבע כמוסת

הרכב

כל כמותה מכילה:

פינגולמוד (הכיורכולוריד) 0.5 mg

Fingolimod (as HCl) 0.5 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק ממרכיבי התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלול זה מכל מידע המצטיי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם גם אם נראה לך כי מצעם הרפואי דומה.

<p>בנוסף לעלון, לתכשיר פינגולמוד טבע קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכלי מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בפינגולמוד טבע ולפעול על פיו.</p> <p>למען בטיחותך ולמנוע סיכונים נוספים, יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.</p>	<p>בנוסף לעלון, לתכשיר פינגולמוד טבע קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל.</p> <p>כרטיס זה מכלי מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בפינגולמוד טבע ולפעול על פיו.</p> <p>למען בטיחותך ולמנוע סיכונים נוספים, יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.</p>
---	---

נטילת המנה הראשונה:

לאחר נטילת המנה הראשונה של פינגולמוד טבע נדרשת השגחה על ידי צוות רפואי. במשך שש שעות לפחות. המלצה זו באישיה אם גם אתה מתחיל שוב טיפול לאחר הפסקת טיפול בפינגולמוד טבע.

ההוראות המלוות לגבי נטילת המנה הראשונה מפורטות בסעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

1. למה מיעדת התרופה?

פינגולמוד טבע מיועדת לטיפול בצורות התקפיות של מחלת הטרשת הנפוצה, להפחית את מספר ההתקפים ולהאט את ההתפתחות של בעיות גופניות (ככות) הנגרמות מהמחלה.

קבוצה תרופטית

מדכא סלקטיבי של מערכת החיסון

מווסט של הקולטן ספינגולינ-1/פוספט

מהי טרשת נפוצה?

מחלת הטרשת הנפוצה הינה מחלה כרונית המשפיעה על מערכת העצבים המרכזית הכוללת את המוח ואת חוט השדרה. בטרשת נפוצה התהליך הדלקתי הורס את המעטפת המגינה (הנקראת מיאלין) הנמצאת סביב העצבים במערכת העצבים המרכזית ומונעת פעילות רגילה של העצבים (demyelination).

טרשת נפוצה מסוג התקפית הפוגנית (-relapsing/remitting) מאופיינת בהתקפים חוזרים (relapses) של תסמינים של מערכת העצבים, המשקפים דלקת במערכת העצבים המרכזית. למטופלים שונים יתכנו תסמינים שונים, אך תסמינים אופיינים הם: קשיים בהליכה, חוסר תחושה, בעיות בראייה או בעיות בשיווי המשקל. התסמינים של התקף חוזר (relapse) עשויים להעלם לגמרי כשההתקף נגמר, אך בעיות מסוימות עלולות להישאר.

כיצד פועלת פינגולמוד טבע

פינגולמוד טבע עוזרת להגן על מערכת העצבים המרכזית מפני תקיפה של המערכת החיסונית בגוף על-ידי הפחתת היכולת של תאי דם לבנים מסוימים (לימפוציטים) לנוע בחצופיות בגוף ומניעת הגעתם למוח ולחוט השדרה. דבר זה מבטל את התקף לעצבים הגורם על-ידי הטרשת הנפוצה. פינגולמוד טבע גם מפחיתה חלק מהתגובה החיסונית של הגוף.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה אלרגי (בעל רגישות יתר) לפינגולמוד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכליה התרופה והפורטים בסעיף 6 "מידע נוסף". התסמינים של תגובה אלרגית עשויים לכלול: פריחה, סרפדת מגדרת (hives) או נפיחות של השפתיים, הלשונו או הפנים.
- מבלת ומתקנף לב, במעוקת לב בלתי יציבה (unstable angina), משבץ מוחי או מארוע מוחי חולף או מסוגים מסוימים של אי ספיקת לב ב-6 החודשים האחרונים.
- אתה סובל או מבלת בעבר מסוגים מסוימים של קצב לב לא סדיר או אל רגיל (הפרעות קצב), כולל מטופלים שבהם ממצא לבבי בשם QT מוארך נראה באק"ג לפני תחילת הטיפול בפינגולמוד טבע.
- יש לך בעיה בקצב הלב המצריכה טיפול בתרופות מסוימות.

שוחם עם הרופא שלך לפני נטילת פינגולמוד טבע אם יש לך את אחד מהמצבים האלה או אם אינך יודע אם יש לך אותם.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

נטילת המנה הראשונה:

לאחר נטילת המנה הראשונה, לקחה תעבור בדיקה הנקראת אלקטרוקרדיוגרם (אק"ג) לבדיקת הפעילות החשמלית של הלב לפני נטילת המנה הראשונה של פינגולמוד טבע.

כל המטופלים יישארו בהשגחה של איש צוות רפואי למשך 6 שעות לפחות לאחר נטילת המנה הראשונה של פינגולמוד טבע:

- לאחר נטילת המנה הראשונה של פינגולמוד טבע.
- יש ללבדוק את הדופק ואת לחץ הדם שלך בכל שעה
- עליך להיות בהשגחה של איש צוות רפואי כדי לראות אם יש לך תופעות לוואי רציניות כלשהן. אם קצב הלב מאט יותר מדי, ייתכן שיהיו לך תסמינים כגון: סחרחורת, עייפות, הרגשה כאילו הלב שלך פועם באיטיות או מחסיר פעימה, כאב בחזה.
- אם יש לך את אחד מהתסמינים של קצב לב איטי, הם בדרך כלל יתרחשו במהלך 6 השעות הראשונות לאחר נטילת המנה הראשונה של פינגולמוד טבע. התסמינים יכולים להתרחש של 24 שעות לאחר נטילת המנה הראשונה של פינגולמוד טבע.
- 6 שעות לאחר נטילת המנה הראשונה של פינגולמוד טבע, תעבור אק"ג נוסף. אם האק"ג יראה בעיות לב כלשהן או אם קצב הלב שלך יהיה נמוך מדי או ימשיך לרדת, אתה תמשיך להיות בהשגחה.
- אם יש לך תופעות לוואי רציניות כלשהן לאחר נטילת המנה הראשונה של פינגולמוד טבע, בעיקר כאלה שדורשות טיפול בתרופות אחרות, אתה תישאר במרכז הרפואי להשגחה במשך הלילה. בנוסף, תהיה בהשגחה לתופעות לוואי רציניות כלשהן למשך 6 שעות לפחות לאחר נטילת המנה השנייה של פינגולמוד טבע ביום שלאחרת.
- אם יש לך סוגים מסוימים של בעיות לב או אם אתה נוטל סוגים מסוימים של תרופות שיכולות להשפיע על הלב שלך, אתה תישאר במרכז הרפואי בהשגחת איש צוות רפואי במשך הלילה לאחר נטילת המנה הראשונה של פינגולמוד טבע.

קצב הלב האיטי שלך יחזור למצב רגיל בדרך כלל בתוך חודש אחד לאחר שהתחלת לטול פינגולמוד טבע. פנה מייד לרופא שלך או לחדר מיון בבית החולים הקרוב אם יש לך תסמינים כלשהם של קצב לב איטי.

אם החמצת מנה אחת או יותר של פינגולמוד טבע, ייתכן שתצטרך להיות בהשגחה של איש צוות רפואי כאשר תיטול את המנה הבאה. פנה לרופא שלך אם החמצת מנה של פינגולמוד טבע. ראה גם "כיצד תשתמש בתרופה?".

יש לידע את הרופא לגבי כל המצבים הרפואיים שלך לפני נטילת פינגולמוד טבע, כולל אם היו לך או אם יש לך כעת:

- קצב לב לא סדיר או אל רגיל (הפרעת קצב)
- היסטוריה של שבץ או של אירוע מוחי חולף
- בעיות לב, כולל התקנף לב או עתקות לב
- היסטוריה של התעלפויות חוזרות (איבוד הכרה)
- חום או זיהום, או אם אתה לא מסוגל להילחם בזיהומים בגלל מחלה או נוטל או נטלת בעבר תרופות המחלישות את מערכת החיסון שלך
- לאחרונה קיבלת חיסון או שאתה עומד לקבל חיסון
- אבעבועות רוח או אי קיבלת חיסון לאבעבועות רוח. ייתכן שהרופא יבצע בדיקת דם לנגיף אבעבועות רוח. ייתכן שתצטרך לקבל אל ת סדרת החיסונים לאבעבועות רוח וזאת המתין חודש אחד לפני שאתה מתחיל את הטיפול בפינגולמוד טבע
- בעיות געיניים, במיוחד דלקת בעין שנקראת דלקת הענביה (אנבאיטיס)
- סוכרת
- בעיות נשימה, כולל בזמן השינה
- בעיות בכבד
- לחץ דם גבוה
- סוגים של סרטן העור הנקראים קרצינומה של תאי הבסיס (BCC) או מלנומה
- אנא התייעץ עם הרופא שלך לפני כניסה להיריון. עלייך להנעם מכיניס להיריון במהלך נטילת פינגולמוד טבע או במהלך חודשיים לאחר שהפסקת, בשל הסיכון לפגוע בעובר. ראי סעיף "היריון והנקה" בהמשך

מטופלים קשישים (מעל גיל 65)

הניסוי עם טיפול בפינגולמוד טבע באנשים קשישים מוגבל. יש להשתמש בפינגולמוד טבע בהריות במטופלים בגיל 65 ומעלה.

ילדים ומתבגרים

פינגולמוד טבע אינה מיועדת לטיפול בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

בדיקות ומעקב

לפני תחילת הטיפול:

בדיקת כדוריות דם לבנות, בדיקת ראייה, בדיקת דם לבדיקת תפקודי כבד – כמפורט בסעיף "תופעות לוואי".

בדיקת היריון – כמפורט בסעיף "היריון והנקה".

ייתכן שהרופא יבצע בדיקת דם לנגיף אבעבועות הרוח. לבדיקות הנדרשות בנטילת המנה הראשונה של פינגולמוד טבע – ראה סעיף "נטילת המנה הראשונה" לעיל.

במהלך הטיפול:

בדיקות לחץ דם, בדיקת עור, בדיקת ראייה 3 עד 4 חודשים לאחר התחלת הטיפול, בדיקת דם לבדיקת תפקודי כבד – כמפורט בסעיף "תופעות לוואי".

יש להתייעץ לגבי בדיקה שגריתית של צוואר הרוחם (משטח פאפ) – ייתכן כמפורט בסעיף "תופעות לוואי".

תגובות בין תרופותיו

השימוש בפינגולמוד טבע יחד עם תרופות אחרות עלול לגרום לתופעות לוואי רציניות.

אם אתה לוקח או לקחת תרופות אחרות, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות המארכות מקטע QT** כגון ציטאלפוראם, כלורפרומאזין, הלופרידול, ומתאדון ואריתרומיצין, מכיוון שהתחלת טיפול בפינגולמוד טבע גורמת לירידה בקצב הלב ושנויה להאריך מקטע QT.
- קטוקונאזול** – תרופה לטיפול בזיהומים פטרייתיים. מטופל המשתמש בפינגולמוד טבע בקטוקונאזול בו זמנית צריך להיות במעקב צמוד מכיוון שהסיכון לתופעות לוואי גדול יותר.
- חיסונים** – אם אתה צריך לקבל חיסון, פנה קודם לקבלת ייעוץ מהרופא שלך. במהלך הטיפול ועד לחודשיים לאחר הטיפול בפינגולמוד טבע, אתה לא תוכל לקבל חיסונים מסוימים המכילים נגיף חי (חיסונים מוחלשים חיים) מכיוון שהם עלולים לגרום לזיהום שהחיסון אמור למנוע. גם חיסונים חוזרים עלולים לא לפעול היטב אם ייתנו במהלך התקופה הזו.

תרופות אנטי נאופלסטיות, תרופות המדכאות או המווסתות של המערכת החיסונית (כולל קורטיקוסטרואידים) – צפויות להגביר את הסיכון לדיכוי המערכת החיסונית ויש להתחשב בסיכון להשפעה נוספת על המערכת החיסונית אם תרופות אלה ינתנו ביחד עם פינגולמוד טבע. כאשר מחליפים את הטיפול מתרופות עם השפעה ממשכת על מערכת החיסון כגון נטילזומאב, טריפלנוומיד או טרילופסטורן, יש להתחשב במשך הזמן ובאופן הפעולה של התרופות האלה כדי להנמנע מהשפעה נוספת ולא מכוונתם של דיכוי חיסוני כאשר מתחילים לטול פינגולמוד טבע.

תרופות המאטות את חצב הלב ואת ההולכה הפרוזודרית-חדרית. כגון סומליט, דיגוקסיין או חוסמי תעלת הסיזין גנון דיילטיאזם או רזאפאמיל. לפני שמתחילים את הטיפול בפינגולמוד טבע, יש היוועץ ברופא שרשם לך את התרופות האלה לגבי האפשרות להחליף לתרופות שלא מאטות את קצב הלב ואת ההולכה הפרוזודרית-חדרית.

שימוש בפינגולמוד טבע ומזון

ניתן לטול פינגולמוד טבע עם אוכל או ללא אוכל.

היריון והנקה

היריון

פינגולמוד טבע עלול לפגוע בעובר שלך. יש לידע את הרופא שלך לפני נטילת פינגולמוד טבע, אם את בהריון או מתכננת להיכנס להריון.

ספרי מייד לרופא שלך אם נכנסת להריון במהלך הטיפול בפינגולמוד טבע או אם נכנסת להריון בתוך חודשיים מהפסקת הטיפול בפינגולמוד טבע.

- עלייך להפסיק נטילת פינגולמוד טבע חודשיים לפני שאת מנסה להיכנס להריון.
- אם את יכולה להרות, עלייך להשתמש באמצעי מניעה יעיל במהלך הטיפול בפינגולמוד טבע ובמשך חודשיים לפחות לאחר הפסקת הטיפול.
- ראי גם את סעיף "החמרה קשה בטרשת הנפוצה לאחר הפסקת פינגולמוד טבע" בסעיף "תופעות לוואי".
- הנקה**
- יש לידע את הרופא שלך לפני נטילת פינגולמוד טבע אם את מניקה או אם את מתכננת להניק.
- לא ידוע אם פינגולמוד טבע עוברת לחלב האם. היוועץ ברופא שלך לגבי הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך אם את נוטלת פינגולמוד טבע.

הגינה ושימוש במכונות

הרופא יאמר לך אם מולתך מאפשרת לך לנהוג ברכב, לרכוב על אופניים ולהשתמש במכונות באופן בטוח. לא צפוי שתהיה לפינגולמוד טבע השפעה על היכולת שלך לנהוג ולהשתמש במכונות.

עם זאת, לאחר נטילת המנה הראשונה של פינגולמוד טבע, עלייך להשאר למשך 6 שעות לפחות בהשגחת איש צוות רפואי. במהלך הזמן הזה ייתכן שגם לאחר מכן, היכולת שלך לנהוג ולהשתמש במכונות עשויה להיות לקויה.

מידע חשוב על חלק ממרכיבי התרופה

תכולת נתרן בכמוסה אחת כ-0.045 מ"ג. התרופה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בכל כמוסה ולכן נחשבת נוטלת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

מינון

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

כמוסה אחת ביום (0.5 מ"ג פינגולמוד).

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

למתן דרך הפה

יש לטול פינגולמוד טבע פעם אחת ביום עם כוס מים. נטילת פינגולמוד טבע באותה השעה בכל יום תסייע לזכור מתי יש לטול את התרופה.

אין מידע לגבי פתיחת הכמוסה ופיזור התוכן שלה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחתי לטול את התרופה

אם שכחתי מנה של פינגולמוד טבע, פנה לרופא מייד. ייתכן שתצטרך להיות במעקב של איש צוות רפואי במשך 6 שעות לפחות כאשר תיקח את המנה הבאה. אם תצטרך להיות במעקב של איש צוות רפואי כאשר תיקח את המנה הבאה של פינגולמוד טבע אתה תעבור:

- בדיקת אק"ג לפני נטילת המנה
- בדיקת דופק ולחץ דם בכל שעה לאחר נטילת המנה
- בדיקת אק"ג 6 שעות לאחר נטילת המנה

הפסקת טיפול

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעות עם הרופא.

אם אתה מספיק את נטילת התרופה, תסמיני הטרשת הנפוצה עלולים לחזור ולהחמיר – ראה סעיף "החמרה קשה בטרשת הנפוצה" לאחר הפסקת פינגולמוד טבע" בסעיף "תופעות לוואי".

אין לטול תרופות בחושה בדוק התויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרופא כשקשים אם הינך צוקק לפני. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפינגולמוד טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. לא תיבהל למקרא שימדת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. פינגולמוד טבע עלולה לגרום לתופעות לוואי רציניות, כולל:

- קצב לב איטי (ברדיקרדיה או ברדיאריטמיה) כאשר אתה מתחיל לטול פינגולמוד טבע.** פינגולמוד טבע יכולה להאטה בקצב הלב שלך, במיוחד לאחר שאתה נוטל את המנה הראשונה. פנה מיד לרופא או לחדר מיון בבית החולים הקרוב, אם יש לך תסמינים כלשהם של קצב לב איטי. ראי פירוט בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה", תת סעיף "נטילת המנה הראשונה".
- זיהומים** – פינגולמוד טבע יכולה להגביר את הסיכון שלך לזיהומים רציניים שעלולים להיות מסכני חיים ולגרום למוות. אין לקבל חיסונים **חיים** במהלך הטיפול בפינגולמוד טבע ובמשך חודשיים לאחר שהפסקת לטול פינגולמוד טבע. דבר עם הרופא שלך לפני שאתה מקבל חיסון בזמן הטיפול ובמשך חודשיים לאחר הטיפול בפינגולמוד טבע. אם אתה מקבל חיסון חי, אתה עלול לקבל את הזיהום שהחיסון היה אמור למנוע. חיסונים עלולים להיות פחות יעילים כאשר הם ניתנים בזמן הטיפול בפינגולמוד טבע.
- ירוס הפפילומה (HPV) – זיהומים, כולל פפילומה, דיספליזיה, יבלות וסרטן הקשור לוירוס הפפילומה, דווחו במטופלים בפינגולמוד טבע. הרופא שלך ישקול אם אתה צריך לקבל חיסון כנגד ירוס הפפילומה לפני תחילת הטיפול. עקב הסיכון לזיהום בירוס הפפילומה, יש להיוועץ ברופא שלך לגבי בדיקה שגריתית של צוואר הרוחם (משטח פאפ).
- פינגולמוד טבע מפחיתה את מספר תאי הדם הלבנים (לימפוציטים) בדם שלך, חזרה לרמה רגילה בדרך כלל תתרחש תוך חודשיים מהפסקת הטיפול. ייתכן שהרופא שלך יבצע בדיקת דם למפת את הדם הלבנים שלך לפני שאתה מתחיל לטול פינגולמוד טבע. פנה מייד לרופא שלך אם יש לך תסמינים כלשהם של זיהום במשך הטיפול בפינגולמוד טבע ובמשך חודשיים לאחר המנה הראשונה של פינגולמוד טבע.
- עייפות, כאבים בגוף, צמרמורות, בחילות, הקאות, כאב ראש המלווה בחום, נוקשות בצוואר, רגישות לאור, בחילות או לבולו (אלה עלולים להיות תסמינים של דלקת קרום המוח, זיהום של הרקומים סביב המוח ועמוד השדרה).
- Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML) – (PML)** הוא זיהום נדיר במוח אשר מוביל בדרך כלל למוות או לנכות עמורה. אם PML מתרחשת, זה קורה בדרך כלל באנשים עם מערכת חיסונית מחולשת אך קרה גם באנשים שהמערכת החיסונית שלהם לא מחולשת. התסמינים של PML מחמירים במשך ימים עד שבועות. פנה מייד לרופא שלך אם יש לך תסמינים של PML, חדשים או מחמרים, אשר ממשיכים מספר ימים מולל:
- אחלה של יצי אחד של מספר ימים התנועה (הקואורדינציה) בזרועות וברגליים, ירידה בכוח, בעיות

בשיווי המשקל, שינויים בראייה, שינויים בחשיבה או בזיכרון, בלבול, שינויים באישיות.

- בעיה בראיה הנקראת בצקת מאקולרית** – בצקת מאקולרית עלולה לגרום לחלק מהתסמינים הקשורים בראיה כמו בהתקף של טרשת נפוצה (דלקת בעצב הראייה). ייתכן שלא מבחין בתסמינים כלשהם של בצקת מאקולרית. אך אם מרחששת בצקת מאקולרית, היא בדרך כלל מתחילה במהלך 3 עד 4 החודשים הראשונים לאחר תחילת הטיפול בפינגולמוד טבע. על הרופא שלך לבדוק את הראייה שלך לפני תחילת הטיפול בפינגולמוד טבע ו-3 עד 4 חודשיים לאחר תחילת הטיפול, או בכל זמן בו אתה מבחין בשינויים בראייה במהלך הטיפול בפינגולמוד טבע. הסיכון שלך לבצקת מאקולרית גבוה יותר אם יש לך סוכרת או אם הייתה לך דלקת בעין הנקראת דלקת הענביה (אנבאיטיס).

פנה מייד לרופא אם יש לך אחד או יותר מהבאים:

ערפול או צללים במרכז הראייה שלך, כתם עיור במרכז הראייה שלך, רגישות לאור, ראיית צבעים (גוונים) חריגה.

תופעות לוואי רציניות נוספות:

- התנפחות והיצרות של כלי הדם במוח שלך.** מצב הנקרא Posterior Reversible Encephalopathy (PRES) Syndrome) התרחש באופן נדיר במטופלים הנוטלים פינגולמוד טבע. התסמינים של PRES משתפרים בדרך כלל כאשר מטופלים לטול פינגולמוד טבע. אולם ללא טיפול, עלולים להוביל לשבץ. פנה מייד לרופא אם יש לך אחד או יותר מהתסמינים הבאים:
- כאב ראש חמור פתאומי, בלבול פתאומי, איבוד פתאומי של הראייה או שינויים אחרים בראיה שלך, פרכוסים.
- זקק לכבד.** פינגולמוד טבע עלולה לגרום לזקק לכבד. על הרופא שלך לבצע בדיקות דם כדי לבדוק את הכבד שלך לפני שאתה מתחיל לטול פינגולמוד טבע ובאופן תקופתי במהלך הטיפול. פנה לרופא שלך מייד אם יש לך אחד או יותר מהתסמינים הבאים של זקק לכבד:
- בחילות, הקאות, כאב בטן, עייפות, איבוד תיאבון, הצהבה על העור או של הלבנה, רגישות לטו
- בעיות נשימה.** לאנשים מסוימים הנוטלים פינגולמוד טבע יש קוצר נשימה. פנה לרופא מייד אם יש לך בעיות נשימה חדשות או מחמירות.
- החמרה קשה בטרשת הנפוצה לאחר הפסקת נטילת פינגולמוד טבע.** לאחר הפסקת נטילת פינגולמוד טבע, תסמיני טרשת נפוצה עלולים לחזור ולהחמיר בהשוואה למת שהיה לפני הטיפול. טרשת נפוצה והתרחשה רבים עם החמרה בתסמיני טרשת נפוצה בהתחשה לאחר הפסקת נטילת פינגולמוד טבע, לא חוזרית לרמת התפקוד שהייתה לפני הפסקת נטילת פינגולמוד טבע. החמרה זו מתרחשת לרוב תוך 12 שבועות לאחר הפסקת נטילת פינגולמוד טבע אך עלולה להתרחש מאוחר יותר. דבר עם הרופא שלך תמיד לפני שאתה מפסיק לטול פינגולמוד טבע מכל סיבה שהיא. ספר לרופא שלך אם יש החמרה בתסמיני הטרשת הנפוצה לאחר הפסקת נטילת פינגולמוד טבע.

נפגעים לא רגילים במוח הקשורים להתקף של טרשת נפוצה. במקרים נדירים של נגעים גדולים באופן בלתי רגיל במוח, הקשורים להתקף של טרשת נפוצה, דווחו במטופלים בפינגולמוד טבע (מצב הנקרא tumefactive lesions). במקרה של התקף חמור, הרופא שלך ישקול לבצע MRI כדי להעריך את המצב ויחליט אם אתה צריך להפסיק לטול פינגולמוד טבע.

לחץ דם גבוה. על הרופא שלך לבדוק את לחץ הדם שלך במהלך הטיפול בפינגולמוד טבע.

סוגים של סרטן העור הנקראים קרצינומה של תאי בסיס (BCC) ומלנומה. ספר לרופא שלך אם יש שינויים כלשהם במראה העור שלך הכוללים שינויים בשומה, אזור כזה חדש על העור שלך, פצע שאינו מחלים או גידולים על העור שלך כגון בליטה שעלולה להיות מבריקה, לבן פינה, צבע העור או זודרה. על הרופא שלך לבדוק את העור שלך ולראות אם יש שינויים כלשהם במהלך הטיפול בפינגולמוד טבע. עלייך להגביל את זמן השיהיה באור השמש ובאור אולטרה-סגול (UV). לבש בגדים מגנים והשתמש בקרם הגנה עם מקדם הגנה גבוה.

תגובות אלרגיות. פנה לרופא שלך אם יש לך תסמינים של תגובה אלרגית, כולל פריחה, סרפדת מגדרת או התנפחות של השפתיים, הלשונו או הפנים.

תופעות לוואי שכוחות מאדם (מופיעות ביותר משמשת אחד מעשרה):

- כאב ראש
- בדיקות כבד לא תקינות
- שלשול
- שיעור
- שפעת
- דלקת בסינוסים (סינוטיטיס)
- כאב גב
- כאב באזור הבטן
- כאב בדוועות או ברגליים

תופעות לוואי שכוחות (מופיעות ב-10 משתמשים מתוך 100):

- דלקת הסימפונות (ברוניטיס)
- שלבקת חוגרת (הרפס zooster)
- פטריית שמש
- מיגרנה
- בחילות
- חולשה
- נשירת שיער
- קרנת קרטינית – גידול טרום סרטני (