



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) – 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

سيمفاكسون, حبسولات 10, 20, 40, 80 ملغ

تحتوي كل حبسولة على سيمفاستاتين (Simvastatin) بجرعة 10, 20, 40 و- 80 ملغ على التوالي.

مواد غير فعالة ومسببات الحساسية في الدواء – انظر للبند 6 "معلومات إضافية" وللبند 2 "معلومات مهمة حول جزء من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بامعان قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية, توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب لهم الضرر حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مماثلة.

الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين دون جيل 20 سنة.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

لدى مرضى لديهم مرض القلب التاجي وفرط كوليسترول الدم, يقلل سيمفاستاتين من:

- اختطار الوفاة بشكل عام من خلال خفض الوفيات نتيجة لأمراض القلب.
- اختطار حدوث نوبة قلبية غير مميتة.
- اختطار القيام بعمليات غزوية لاستعادة جريان الدم للقلب (مثل توسيعات بالبالون أو جراحات المجازة).
- الاختطار لسكتة دماغية ولنوبة إقفارية عابرة (Transient Ischemic Attack–TIA).

سيمفاستاتين مُستطب لخفض مستويات LDL والمركبات الدهنية الأخرى في الدم ولزيادة مستويات HDL في الدم لدى مرضى لديهم فرط دهنيات في الدم (مستوى مرتفع من الدهنيات في الدم).

الفصيلة العلاجية: ستاتينات, مثبطات عمل الإنزيم HMG-CoA ريدوكتاز.

كيف يعمل سيمفاستاتين:

سيمفاكسون يحتوي على مادة فعالة باسم سيمفاستاتين. يستعمل سيمفاستاتين لخفض مستوى الكوليسترول الإجمالي في الدم (total cholesterol), مستوى الكوليسترول "السيء" (كوليسترول ال-LDL), ومستويات المركبات الدهنية التي تسمى الجليسيريدات الثلاثية. بالإضافة, يزيد سيمفاستاتين من مستويات الكوليسترول "الجيد" (كوليسترول ال-HDL).

الكوليسترول هو أحد المركبات الدهنية الموجودة في الدم. يتألف الكوليسترول العام بشكل أساسي من كوليسترول ال-LDL وال-HDL. يسمى كوليسترول ال-LDL في الكثير من الأحيان الكوليسترول "السيء", لأنه قد يتراكم على جدران الشرايين ويسبب تكون اللويحات. مع الوقت قد يؤدي تراكم اللويحات إلى تضيق الشرايين. هذا التضيق قد يبطئ أو يسد جريان الدم إلى أعضاء حيوية مثل القلب أو الدماغ. قد يؤدي انسداد جريان الدم إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. يسمى كوليسترول ال-HDL في الكثير من الأحيان الكوليسترول "الجيد", لأنه يساعد في منع تراكم اللويحات في الشرايين, ويمنع مرض القلب. الجليسيريدات الثلاثية هي نوع آخر من الدهنيات الموجودة في الدم والتي قد تزيد من الاختطار لحدوث مرض قلب.

عليك أن تحرص على نظام غذائي قليل الكوليسترول في الفترة التي تتناول بها هذا الدواء.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجي) للمادة الفعالة (سيمفاستاتين) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبند 6).
- كنت تعاني حالياً من مشاكل كبد.
- كنتِ حاملاً أو مرضعةً.
- كنت تتناول أدوية تحتوي على واحد أو أكثر من المواد الفعالة التالية:
 - إيتراكونازول, كيتوكونازول, بوساكونازول أو فوريكونازول (التي تستعمل لعلاج العدوى الفطرية).
 - إيريثروميسين, كلاريثروميسين أو تيليثروميسين (التي تستعمل لعلاج العدوى).
 - مثبطات بروتياز HIV مثل إيندينافير, نيلفينافير, ريتونافير وساكوينافير (مثبطات بروتياز HIV تستعمل لعلاج عدوى HIV).

- بوسبيريفير أو تيلابريفير (التي تستعمل لعلاج عدوى التهاب الكبد C).
 - نيفازودون (الذي يستعمل لعلاج الاكتئاب).
 - كوبيبيستات.
 - جيمفيبروزيل (الذي يستعمل لخفض الكوليسترول).
 - سيكلوسبورين (الذي يستعمل لدى متعاليين بعد زرع عضو).
 - دانازول (هرمون اصطناعي يستعمل لعلاج الانتباذ البطاني الرَّجْمِيّ, حالة تنمو فيها أجزاء من نسيج بطانة الرحم خارج الرحم).
 - يمنع تناول أكثر من 40 ملغ سيمفاستاتين, إذا كنت تتناول لوميتابيد (دواء يستعمل لعلاج حالة طبية وخيمة ونادرة من الكوليسترول الوراثي).
- اسأل الطبيب إذا لم تكن متأكدًا فيما إذا كان دواؤك مسجلًا في الأعلى.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل العلاج بسيمفاكسون, أخبر الطبيب:

- عن كافة مشاكلك الطبيّة يشمل حساسيات.
- إذا كنت تشرب كميات كبيرة من الكحول.
- إذا عانيت في الماضي من مرض كبد. قد يكون العلاج بالدواء غير ملائم لك.
- إذا كنت على وشك الخضوع لعملية جراحية. قد تكون هناك حاجة للتوقف عن تناول الدواء لفترة قصيرة.
- إذا كنت تعاني من فشل تنفسي وخيم.
- إذا كنت من أصل آسيوي. قد يتطلب الأمر جرعة أخرى لك.
- إذا كنت تتناول أو إذا تناولت خلال ال-7 أيام الماضية دواء يسمى حمض الفوسيديك (دواء لعلاج العدوى البكتيرية) بإعطاء عن طريق الفم أو بحقنة. إن دمج حمض الفوسيديك مع سيمفاستاتين قد يؤدي لمشاكل عضلات وخيمة (انحلال الرُّبَيْدَات).
- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الوهن العضلي (مرض مصحوب بضعف عضلي عام يشمل أحيانًا العضلات المستخدمة في التنفس), أو الوهن العضلي العيني (مرض يسبب ضعفًا في عضلات العين), لأن الستاتينات يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى تفاقم المرض أو تسبب حدوث الوهن العضلي (انظر البند 4- "الأعراض الجانبية").

اتصل بالطبيب المعالج بشكل فوري إذا كنت تشعر بألم عضلات, حساسية أو وهن عضلات غير مفسّر. هذا لأنه في حالات نادرة, قد تكون مشاكل العضلات وخيمة, يشمل انحلال العضلات الذي يؤدي لضرر للكلية, وفي حالات نادرة جدًا للموت.

إن اختطار حدوث انحلال العضلات أعلى لدى المرضى الذين يتناولون جرعات عالية من السيمفاستاتين, خاصةً جرعة 80 ملغ. بالإضافة, الاختطار لانحلال العضلات أعلى لدى مرضى معينين. تحدث مع طبيبك إذا انطبقت عليك واحدة من الحالات التالية:

- كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول.
- كانت لديك مشاكل في الكلية.
- كانت لديك مشاكل في الغدة الدرقية.
- عمرك 65 سنة أو أكثر.
- كنت امرأة.
- كانت لديك في الماضي مشاكل عضلات خلال العلاج بأدوية لخفض الكوليسترول تسمى "ستاتينات" أو "فبيرات".
- كان لديك أو لدى أحد أقاربك مرض عضلات وراثي.

كذلك, بلغ الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديك وهن عضلات ثابت. قد يتطلب الأمر فحوصات وأدوية إضافية لتشخيص وعلاج هذا الأمر.

فحوصات ومتابعة

قبل بداية استعمال الدواء وخلال فترة العلاج بالدواء, إذا كانت لديك أية أعراض لمشاكل كبد, سوف يوجهك الطبيب لفحص دم. هذا من أجل فحص وظائف الكبد لديك. بعد بدء العلاج بالدواء, قد يتم توجيهك من قبل الطبيب لفحص دم لفحص وظائف الكبد.

إذا كان لديك سكري أو كنت في خطر لتطوير سكري, سوف يقوم طبيبك بمتابعة لصيقة لك. أنت في خطر لتطوير سكري إذا كان لديك مستويات مرتفعة من السكريات والدهنيات في الدم, وزن زائد وضغط دم مرتفع.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، أو أخذت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. إن تناول سيمفاستاتين مع أحد الأدوية المسجلة أدناه قد يزيد من الاختطار لمشاكل عضلات (بعضها مذكورة في البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا"):

- إذا كان عليك تناول حمض الفوسيديك بإعطاء عن طريق الفم لعلاج عدوى بكتيرية، سوف يتوجب عليك التوقف مؤقتًا عن العلاج بسيمفاستاتين. سوف يرشدك الطبيب متى يمكن البدء من جديد بتناول الدواء بشكل آمن. إن تناول سيمفاستاتين سوية مع حمض الفوسيديك قد يؤدي، في حالات نادرة، لوهن عضلات، لحساسية عضلات أو لآلم عضلات (انحلال الرَبِيدَات). للمزيد من المعلومات بخصوص انحلال الرَبِيدَات انظر للبند 4 - "أعراض جانبية".
- سيكلوسبورين (الذي يعطى في الكثير من الأحيان لمتعالجين بعد زرع عضو).
- دانازول (هرمون اصطناعي يستعمل لعلاج الانتباز البَطَانِي الرَّجْمِي، حالة تنمو فيها أجزاء من نسيج بطانة الرحم خارج الرحم).
- أدوية مع مواد فعالة مثل إيتراكونازول، كيتوكونازول، فلوكونازول، بوساكونازول أو فوركونازول (التي تستعمل لعلاج العدوى الفطرية).
- فيبرات مع مواد فعالة مثل جيمفيبروزيل أو بيزافيرات (تستعمل لخفض الكولسترول).
- إيربثروميسين، كلريثروميسين، تيليثروميسين (التي تستعمل لعلاج العدوى البكتيرية).
- منبطات پروتيياز HIV مثل: إيندينافير، نيلفينافير، ريتونافير أو ساكوينافير (التي تستعمل لعلاج ال-HIV).
- أدوية مضادة للفيروسات لعلاج التهاب الكبد C مثل بوسبيريفير، تيلابريفير، إيلباسفير أو جرازوبريفير (تستعمل لعلاج العدوى بفيروس التهاب الكبد C).
- نيفازودون (يستعمل لعلاج الاكتئاب).
- أدوية مع المادة الفعالة كوبيسيستات.
- أمبودارون (الذي يستعمل لعلاج نظم القلب الغير منتظم).
- فيراپاميل، ديلتيازيم أو أملوديبين (التي تستعمل لعلاج فرط ضغط الدم، لآلم في الصدر المتعلق بمرض قلب أو لحالات قلبية أخرى).
- لوميتاليد (دواء يستعمل لعلاج حالة طبية وخيمة ونادرة من الكولسترول الوراثي).
- دابنتوميسين (دواء يستعمل لعلاج حالات العدوى المعقدة في الجلد وفي أنسجة الجلد ولعلاج تجرثم الدَّم). قد تكون الأعراض الجانبية التي تؤثر على العضلات أقوى عند تناول هذا الدواء خلال العلاج بسيمفاستاتين. قد يقرر الطبيب بأن عليك التوقف عن تناول سيمفاستاتين بشكل مؤقت.
- كولشيسين (الذي يستعمل لعلاج النقرس).
- تيكاچريلور (دواء مضاد لتخثر الدم).

إضافة للأدوية المفصلة أعلاه، أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت مؤخرًا، أدوية أخرى يشمل أدوية بدون وصفة طبية. بلغ الطبيب خاصة إذا كنت تأخذ دواء واحد من الأدوية التالية:

- أدوية مع مادة فعالة مضادة لتخثر الدم، مثل وارفارين، فينيروكومون أو أسينوكومارول (مضادات التخثر).
- فينوفيرات (الذي يستعمل كذلك لخفض الكولسترول).
- نياسين (الذي يستعمل كذلك لخفض الكولسترول).
- ريفامبيسين (الذي يستعمل لعلاج السل).

أخبر كل طبيب يسجل لك دواء جديد بأنك تتناول سيمفاستاتين.

استعمال الدواء والطعام

يحتوي عصير الجريب فروت على واحد أو أكثر من المركبات التي تؤثر على طريقة تفكيك الجسم لأدوية معينة، يشمل سيمفاستاتين. يجب تجنب استهلاك عصير الجريب فروت.

الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال سيمفاستاتين إذا كنتِ حاملًا، تحاولين الدخول في حمل أو تظنين بأنك حامل. إذا حملت خلال العلاج بالدواء، توقفي عن تناوله واتصلي بطبيبك فورًا.

لا يجوز تناول سيمفاستاتين إذا كنتِ مرضعةً، لأنه لا يعرف فيما إذا كان الدواء ينتقل لحليب الأم.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

السياسة واستعمال الآلات

لا يتوقع أن يؤثر الدواء على قدرة السيقاية أو تشغيل الآلات. بالرغم من ذلك, يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أشخاص معينون قد يشعروا بدوخة بعد تناول الدواء.

معلومات مهمة حول جزء من مركبات الدواء

يحتوي سيمفاكسون على لاكتوز. إذا قيل لك في السابق من قبل طبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة, يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء. الجرعة وطريقة العلاج تحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الاعتيادية بشكل عام هي: الجرعة الابتدائية الموصى بها هي 10 ملغ أو 20 ملغ مرة في اليوم, في المساء, مع أو من دون طعام.

طريقة تناول

يجب بلع الدواء مع القليل من الماء. لا يجوز شطر الحبولة, ذلك لأنه لا يوجد خط تقسيم. لا تتوفر معلومات بخصوص السحق والمضغ.

بسبب الاختطار الزائد لمشاكل في العضلات, فإن جرعة 80 ملغ هي فقط لمتعالجين يتناولون جرعة 80 ملغ بشكل مزمن (مثل 12 شهرًا فما فوق) من دون ضرر للعضل والذين لا ينبغي عليهم أخذ أدوية معينة سوية مع سيمفاستاتين, والتي قد تزيد من احتمالك لتطويع ضرر في العضل.

قد يسجل لك طبيبك جرعات أقل, خاصة إذا كنت تتناول أدوية معينة من تلك التي تظهر أعلاه أو إذا كانت لديك مشاكل معينة في الكلية.

إذا كنت تتناول أيضًا أدوية رابطة للأحماض الصفراوية (أدوية لخفض الكولسترول) مثل كوليستيرامين, عليك تناول سيمفاستاتين على الأقل ساعتين قبل أو أربع ساعات بعد تناول هذه الأدوية.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة أعلى أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ, عليك التوجه فورًا لغرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص, لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب المداومة على العلاج كما أوصي من قبل الطبيب. حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية, لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة طبيبك.

إذا توقفت عن تناول الدواء

استمر بتناول سيمفاستاتين إلا إذا قال لك الطبيب بأن تتوقف. إذا توقفت عن تناول الدواء, قد يعود مستوى الكولسترول لديك للارتفاع مجددًا.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع نظرات إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء, استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

ككل أي دواء, قد يسبب استعمال سيمفاكسون أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

أعراض جانبية وخيمة نادرة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000):

- يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ فوراً عند ظهور احدى الأعراض التالية:
- ألم عضلات, حساسية عضلات, وهن عضلات, تقلصات عضلية أو تمزق في العضل (نادر جداً). في حالات نادرة قد تكون مشاكل العضل هذه وخيمة, يشمل انحلال العضلات الذي يسبب ضرراً للكلى, بل الموت في حالات نادرة جداً.
- ردود فعل فرط تحسس (أرجية) تشمل: انتفاخ الوجه, اللسان, أو الحلق الذي قد يسبب صعوبة في التنفس (وذمة وعائية).
- ألم عضلات وخيم, عادةً في الكتفين أو الفخذين (الأم العضلات الروماتزمية).
- طفح مع وهن في الأطراف وفي عضلات الرقبة.
- طفح الذي قد يظهر في الجلد وتقرحات في الفم (lichenoid drug eruptions) (نادر جداً).
- ألم أو التهاب في المفاصل.
- التهاب في الأوعية الدموية (vasculitis).
- كدمات غير عادية, طفح وانتفاخ الجلد (التهاب الجلد والعضل), شرى, حساسية الجلد للشمس, حمى, تورد.
- ضيق تنفس (dyspnea) وشعور عام سيء.
- حالة تشبه الذئبة (تشمل طفح, مشاكل في المفاصل وتأثير على خلايا الدم).
- التهاب في الكبد المصحوب بالأعراض التالية: اصفرار الجلد والعينين, حكة, بول بلون داكن أو براز بلون فاتح, شعور بالتعب أو الوهن, فقدان الشهية, فشل كبد مميت وغير مميت (نادر جداً).
- التهاب في البنكرياس المصحوب بشكل عام بألم بطن وخيم.

أعراض جانبية وخيمة نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

- رد فعل تحسسي وخيم الذي يؤدي لصعوبات تنفس أو دوخة (تأق).
- تنذّي الرّجل (تضخم الصدر لدى الرجال).

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000):

- تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر دم).
- اخضرار أو وهن في اليدين والساقين.
- صداع, شعور بالنخز, دوخة.
- رؤية مشوشة, خلل في الرؤية.
- اضطرابات في الجهاز الهضمي (ألم في البطن, إمساك, انتفاخ, صعوبات في الهضم, إسهال, غثيان, تقيؤ).
- طفح, حكة, تساقط الشعر.
- وهن.
- مشاكل في النوم (نادر جداً).
- ضعف الذاكرة (نادر جداً), فقدان الذاكرة, ارتباك.

أعراض جانبية شيوعتها غير معروف (أعراض لم يُحدّد شيوعتها بعد):

- مشاكل في الانتصاب.
- اكتئاب.
- مشاكل في الأوتار, التي قد تتعقد أحياناً لدرجة تمزق الوتر.
- وهن عضلات ثابت.
- الوهن العضلي الوبيل (مرض يسبب ضعف عام في العضلات وفي حالات معينة أيضاً ضعف في العضلات المشاركة في التنفس).
- الوهن العضلي العيني (مرض يسبب ضعف في عضلات العين).
- تحدث مع الطبيب إذا شعرت بضعف في الأذرع أو في الساقين الذي يتفاقم بعد فترة من النشاط, رؤية مزدوجة أو تدلي الجفون, صعوبة في البلع, أو ضيق التنفس.

أعراض جانبية ممكنة عند استعمال الستاتينات:

- اضطرابات نوم يشمل كوابيس.
- صعوبات في الأداء الجنسي.
- مشاكل تنفس يشمل سعال ثابت و/أو ضيق تنفس أو حمى.
- سكري. هذا أكثر احتمالاً إذا كان لديك مستويات مرتفعة من السكريات والدهنيات في الدم, وزن زائد وضغط دم مرتفع.
- سوف يتابعك طبيبك خلال فترة العلاج بهذا الدواء.

قيم نتائج المختبر:

شوهدت ارتفاعات في فحوصات دم معينة لفحص وظائف الكبد وإنزيم العضل (كرياتين كيناز).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- **تجنب التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (תאריך תפוגה) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- **شروط التخزين:** يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

إضافة للمركب الفعّال، يحتوي الدواء أيضاً على:

Lactose monohydrate, starch pregelatinised, microcrystalline cellulose, ascorbic acid, magnesium stearate, citric acid monohydrate, hydroxypropyl cellulose, hypromellose, titanium dioxide (E171), talc, butylhydroxyanisole, iron oxide (red, black, yellow) (E172), carnauba wax.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

- **سيمفاكسون 10:** حبسولات مطلية بلون وردي فاتح مطوّلة، مع الختم "SST" في جهة واحدة و- "10" في الجهة الأخرى.
- **سيمفاكسون 20:** حبسولات مطلية بلون بيج مطوّلة، مع الختم "SST" في جهة واحدة و "20" في الجهة الأخرى.
- **سيمفاكسون 40:** حبسولات مطلية بلون بني مانل للوردي مطوّلة، مع الختم "SST" في جهة واحدة و "40" في الجهة الأخرى.
- **سيمفاكسون 80:** حبسولات مطلية بلون بني مانل للوردي مطوّلة، مع الختم "SL" في جهة واحدة.

أحجام العبوات المصادق عليها من سيمفاكسون 10, 20, 40: 10, 14, 28, 30 حبسولات.
أحجام العبوات المصادق عليها من سيمفاكسون 80: 7, 10, 14, 28, 30 حبسولات.
قد لا تسوق كافة أحجام العبوات.

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض., شارع دكسل 1, أور عكيفا 3060000, إسرائيل.

تم تنقيحها في آذار 2024 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

سيمفاكسون 10 حبسولات: 132 83 31147 00

سيمفاكسون 20 حبسولات: 132 84 31148 00

سيمفاكسون 40 حبسولات: 132 85 31149 00

سيمفاكسون 80 حبسولات: 151 84 33890 00

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.

صاحب التسجيل: دكسل فارما تكنولوجيا م.ض. هكيما 10, يوكنعام عيليت 2069200, إسرائيل