

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

راميبريل تيفع 5 ملغ

أقراص

المادة الفعالة:

يحتوي كل قرص من راميبريل تيفع 5 ملغ على:

راميبريل 5 ملغ
المواد غير الفعالة ومسببات الحساسية في المستحضر: انظر البند 2 والبنء 6.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعلمه لآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

يُستعمل الدواء لعلاج فرط ضغط الدم، لتقليل خطر الإصابة بنبوية قلبية أو بسكتة دماغية، لتقليل ضغط حذوث مشاكل في الكلية أو لتأخير تفاقمها (لدى متلقي العلاج المصابين أو غير المصابين بالسكري)، لعلاج قصور القلب، للعلاج بعد الإصابة بنبوية قلبية متزامنة مع قصور القلب.
الغرض العلاجي: خفض لضغط الدم، من فصيلة منبسطات ACE.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا وُجدت لديك حساسية للمادة الفعالة لراميبريل، أو لمستحضر آخر من فصيلة منبسطات ACE، أو لأي من المركبات الإضافية التي تحتوي عليها الدواء (انظر البند 6). قد تشمل علامات رد الفعل التحسسي على: طفح جلدي، صعوبات في البلع أو في التنفس، الانتفاخ في الشفتين، في الوجه، في الحلق أو في اللسان. إذا عانيت في الماضي من رد فعل تحسسي خطير يسمى الوذمة العنائية، التي تشمل علاماتها على: الوخز، الشرى (urticaria)، البقع الحمراء على اليدين والقدمين والرقبة، انتفاخ الحلق واللسان، الانتفاخ حول العينين وفي الشفتين، الصعوبات في التنفس والبلع.
- إذا استعملت في الماضي أو تستعمل الآن ساكوبوتريل/فالسارتان، وهو دواء يُستعمل لعلاج أحد أنواع قصور القلب المزمن لدى البالغين.
- إذا كنت تتضع لغسيل الكلى أو لنوع آخر من تصفية الدم.
- تبعًا لنوع الماكئة المستعملة، يُحتمل ألا يكون راميبريل تيفع مناسبًا لك.
- إذا كنت تعاني من مشكلة في الكلية يقل فيها تزويد الكلية بالدم (Renal artery stenosis).
- في الانتهر السته الأخيرة من الحمل (انظري "الحمل، الإرضاع والخصوبة" في البند 2).
- إذا كنت تعاني من ضغط دم منخفض أو غير مستقر. سيُجرى هذا التقييم من قبل الطبيب.
- إذا كنت تعاني من السكري أو من خلل في وظيفة الكليتين وتتلقى علاجًا لخفض ضغط الدم يحتوي على السكريين. لا تستعمل راميبريل تيفع إذا انطيق عليك ما ذكر أعلاه. في حالة الشك، استشر الطبيب قبل استعمال راميبريل تيفع.

تحددات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بالدواء، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى.
- كنت تعاني من فقدان شديد للألماح أو السوائل (في أعقاب التقيؤ، الإسهال، التعرق المتزايد، آثباع حمية غذائية قليلة الأملاح، استعمال مدرات البول لفترة مطولة أو إذا خضعت لغسيل الكلى).
- كنت على وشك الخضوع لعلاج لتقليل الأرجية لسمعات النحل أو الديابوير (إزالة التمسح).
- كنت على وشك تلقي مواد مخدرة خلال عملية جراحية أو علاج للانسان، قد تضطر إلى إيقاف العلاج براميبريل تيفع قبل ذلك بيوم واحد؛ استشر الطبيب.
- كان مستوى البوتاسيوم في دمك مرتفعًا (بحسب نتائج فحص الدم).
- كنت تستعمل أدوية قد تقلل مستوى الصوديوم في دمك أو كنت تعاني من حالة طبية قد تقلل مستوى الصوديوم في دمك. قد يحيلك طبيبكي إلى فحوص دورية لمستويات الصوديوم في دمك، خاصة إذا كنت مسنًا.
- كنت تستعمل أدوية قد تزيد من خطر حدوث رد فعل تحسسي خطير يسمى الوذمة العنائية، مثل منبسطات mTOR (مثل: تيمسبروليوموس، إيفيروليوموس، سيروليوموس)، فيلداجلينين، منبسطات نيورينين (NEP inhibitors، على سبيل المثال: إيساكادوتريل) أو ساكوبوتريل/فالسارتان. بالنسبة لساكوبوتريل/فالسارتان، انظر أيضًا البند "لا يجوز استعمال الدواء".
- كنت تعاني من أمراض القلب التي تصيب الجلد (سكليروديرما) أو التئبة (systemic lupus erythematosus).
- عليك أن تخبري طبيبك إذا كنت تظنين أنك حامل أو ربما تحملين. لا يوصى باستعمال راميبريل تيفع في الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل وقد يسبب ضررًا محديداً للجنين بعد الشهور الثالث (انظري "الحمل، الإرضاع والخصوبة" في البند 2).
- كنت تستعمل أحد الأدوية التالية المستعملة لخفض ضغط الدم:
 - أدوية منبطة لمستقبل الأنجيوتنسين II

أيضًا بـ sartans، على سبيل المثال فالسارتان، تيلميسارتان، إيريبيسارتان)، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكليتين تتعلق بالسكري.

- السكريين.

قد تجبري كك طبيبك فحوصًا دورية للوظيفة الكلوية، لضغط الدم ومستويات الأملاح في دمك (مثل البوتاسيوم). انظر أيضًا "لا يجوز استعمال الدواء" في البند 2.

الأولاد والمراهقون

لا يوصى باستعمال راميبريل تيفع لدى الأولاد والمراهقين الذين يبلغون أقل من 18 عامًا من العمر لأنه لم يتم بعد إثبات الفعالية والسلامة عند استعمال راميبريل تيفع لدى الأولاد.

لا انطيق عليك ما ذكر أعلاه (أو في حالة الشك)، فیرجى استشارة الطبيب قبل استعمال راميبريل تيفع.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. ذلك لأن راميبريل تيفع قد يؤثر على فعالية الأدوية الأخرى وكذلك قد تؤثر الأدوية الأخرى على فعالية راميبريل تيفع. خاصة يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل:
الدمج مع الأدوية التالية قد يقلل من فعالية راميبريل تيفع:
أدوية لتسكين الألم وتخفيف الالتهاب (على سبيل المثال، NSAIDs، مثل إيبوبروفين أو إندوميثاسين والأسبيرين).
- أدوية لعلاج ضغط الدم المنخفض، الصمغة، قصور القلب، الربو أو الإرتاحيات مثل إيفيرين، نور-أدرينالين أو أدريالين. يجب على الطبيب أن يتابع ضغط دمك بحرص.

- الدمج مع الأدوية التالية قد يزيد من احتمال نشوء الأعراض الجانبية:**
ساكوبوتريل/فالسارتان – دواء لعلاج أحد أنواع قصور القلب المزمن لدى البالغين (انظر أيضًا البند "لا يجوز استعمال الدواء").
- أدوية لتخفيف الألم وتخفيف الالتهاب (على سبيل المثال، NSAIDs، مثل إيبوبروفين أو إندوميثاسين والأسبيرين).
- أدوية لعلاج السرطان (العلاج الكيميائي).
- أدوية لمنع رفض الغرسة المنخفض-العضو المزروع).
- أدوية ممتدة لتأثير مثل فوروسيميد.
- أدوية يمكنها أن ترفع مستوى البوتاسيوم في الدم مثل سيبرينولانكوز، تريامتيرين، إلموريد، أملاح البوتاسيوم، تريمتيوبريم لوحد أو بالدمج مع سولفاميتوكسازول (الثلوثات) وهيبيرين (لتضييع الدم).

- ستيرويدات لعلاج الالتهاب مثل بريدنيزولون.
- الويورينول (لتقليل حمض اليوريك في الدم).
- بروكيناميد (لعلاج مشاكل النظم القلبي).
- تيمسبروليوموس (لعلاج السرطان).
- سيروليوموس، إيفيروليوموس (لمنع رفض الغرسة).
- فيلداجلينين (لعلاج السكري من النوع 2).
- راساكادوتريل (ضد الإسهال).

قد يضطر الطبيب إلى تغيير جرعتك الدوائية وأو إلى اتخاذ وسائل حذر أخرى، إذا كنت تستعمل أدوية منبطة لمستقبل الأنجيوتنسين II (ARB) أو السكريين (انظر أيضًا البندين "لا يجوز استعمال الدواء" و"تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").

الدمج مع الأدوية التالية يمكن أن يؤثر على فعاليتها:

- أدوية للسكري مثل أدوية تستعمل عن طريق الفم لخفض السكر والإنسولين؛ قد يقلل راميبريل تيفع مستوى السكر في دمك، يجب متابعة مستوى السكر في الدم بحرص خلال فترة استعمال راميبريل تيفع.
- الليثيوم (الذي يعطى لعلاج المشاكل النفسية). قد يؤدي راميبريل تيفع إلى رفع مستوى الليثيوم في الدم. يجب على الطبيب أن يتابع مستوى الليثيوم بحرص خلال فترة استعمال راميبريل تيفع. إذا انطيق عليك ما ذكر أعلاه (أو في حالة الشك)، فیرجى استشارة الطبيب قبل استعمال راميبريل تيفع.
- استعمال الدواء والظام**
- يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.
- استعمال الدواء واستهلاك الكحول**
- شرب الكحول خلال فترة العلاج براميبريل تيفع قد يسبب الدوار. استشر طبيبك بالنسبة لإمكانية شرب الكحول خلال فترة العلاج براميبريل تيفع، لأنه قد يكون للكحول أيضًا تأثير إضافي على خفض ضغط الدم.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل
عليك أن تخبري طبيبك إذا كنت تظنين أنك حامل أو قد تصبحين حاملًا. لا يوصى باستعمال راميبريل تيفع في الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل ويُمتنع معًا بأنًا استعماله ابتداءً من الأسبوع الـ 13، لأن استعماله أثناء الحمل قد يضر بالطفل.

إذا حدث لديك حمل في الفترة التي لتلقيين فيها العلاج براميبريل تيفع، فأخبري طبيبك فورًا. قد يقرر الطبيب اتخاذ علاج بديل لاستعماله آمن في الحمل. إذا كانت هناك حاجة، فإن الانتقال إلى علاج بديل مناسب يجب أن يتم قبل الحمل المخطط.

الإرضاع
قبل أن تتلقى راميبريل تيفع، أخبري طبيبك إذا كنت مرضعًا أو تحظطين للإرضاع لأن هناك معلومات محدودة عن استعمال راميبريل تيفع في فترة الإرضاع. لا يوصى باستعمال راميبريل تيفع خلال فترة الإرضاع.

السياسة واستعمال الماكئات

قد تشعر بالدوار خلال فترة استعمال راميبريل تيفع. الأرجح أن يحدث هذا الشيء في بداية العلاج أو عند رفع الجرعة الدوائية. إذا حدث ذلك فلا تقُد السيارة ولا تشغل الماكئات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في القرص ولذلك يعتبر خاليًا من الصوديوم.

يحتوي كل قرص من راميبريل تيفع 5 ملغ على 92 ملغ من اللاكتوز (على شكل مونوهيدرات اللاكتوز). إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات، فيجب الاتصال بالطبيب المعالج قبل العلاج براميبريل تيفع.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دومًا وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيددهما الطبيب فقط.

المرضى المصنوعين
قد يقلل طبيبك الجرعة الدوائية الابتدائية ويلائم الجرعة الدوائية بشكل

أيضًا.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

- كيفية تناول
- يجب تناول الدواء في نفس الساعة كل يوم.
- يجب ابتلاع القرص بأكمله مع سائل.
- لا يجوز مضغ أو سحق القرص.
- يمكن شطر أقراص راميبريل تيفع 5 ملغ إلى شطرين متساويين في خط الشطر المشار إليه على القرص وتناول نصف الجرعة عند الحاجة.

إذا تناولت بالخطأ جرعة أعلى أو إذا قام ولد بلع الدواء بالخطأ: توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء، لكي يعلم الطبيب ما الذي تناولته. لا تقُد السيارة بنفسك، اطلب من شخص آخر أن يُقِّلك أو اطلب سيارة إسعاف.

إذا نسيت تناول الدواء:

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المحدد، فتناول الجرعة القادمة في موعدها المحدد القادم واستشر الطبيب. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة الفائتة!

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة/ راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء.
ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال راميبريل تيفع إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية قد لا تعاني من أي واحد منها.

أوقف العلاج براميبريل تيفع وتوجه فورًا إلى الطبيب إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية الخطيرة التالية – قد تحتاج إلى علاج طبي مستعجل.

- انتفاخ في الوجه، في الشفتين أو في الحلق مما يؤدي إلى صعوبات في البلع أو التنفس، وكذلك الوخز والطفح الجلدي – قد تكون هذه علامات رد فعل تحسسي حاد لراميبريل تيفع.
- رد فعل جلدي قد يشتمل على طفح جلدي، تقرحات في الفم، تقاخم مرض جلدي قائم، احمرار، حويصلات أو انفصال الجلد (مثل متلازمة Stevens-Johnson،

erythema multiforme) أو toxic epidermal necrolysis).
أبلغ الطبيب فورًا إذا كنت تشعر بأحد الأعراض الجانبية التالية:
تزايد نظم القلب، دقات قلب قوية أو غير منتظمة (palpitations)، ألم في الصدر، ضغط في الصدر أو مشكلة أكثر خطورة مثل التوربة القلبية أو السكتة الدماغية.

ضيق التنفس أو السعال – يمكن أن يشكّل هذان علامتين لمشكلة في الرئتين.
ظهور علامات تكدم بسوائل بالغة، نزف الدم لفترة أطول من المعتاد، أي علامة لنهولت زريف (مثلًا، نزف من اللثة)، نقاط بنفسجية، بقع على الجلد أو ظهور بثورات بسهولة مقارنةً بالوضع العادي، ألم في الحلق وحمى، شعور بالتعب، إغماء، دوار أو لون جلدي شاحب – يمكن أن تكون هذه علامات لمشاكل في الدم أو في نخاع العظمي.

ألم شديد في البطن قد يشع إلى الظهر – يمكن أن يكون علامة لالتهاب البنكرياس.

حمى، تشنجرية، تعب، فقدان الشهية، ألم في البطن، غثيان، اصفرار الجلد أو العينين (يرقان) – يمكن أن تكون هذه علامات لمشاكل في الكبد مثل التهاب الكبد أو تضرر الكبد.

أعراض جانبية إضافية تشتمل على:

- اصفرار الجلد أو العينين (يرقان) – يمكن أن تكون هذه علامات لمشاكل في الكبد مثل التهاب الكبد أو تضرر الكبد.
- أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 10)**
- صداع أو شعور بالتعب

- إحساس بالدوار – يرخح أن يظهر عند البدء بالعلاج براميبريل تيفع أو عند رفع جرعة راميبريل تيفع
- إغماء، ضغط دم منخفض بشكل استثنائي، خاصةً عندما تنتصب واقفاً أو تستوي جالسًا بسرعة
- سعال جاف، التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب القصبات، ضيق التنفس
- ألم في البطن أو في الأمعاء، إسهال، صعوبات في الهضم، غثيان وتقيؤات
- طفح جلدي مع أو بدون مناطق مرفوعة
- ألم في الصدر
- تقلص أو ألم في العضلات
- نتائج لفحوص الدم تُظهر مستوى بوتاسيوم أعلى من المعتاد

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 100)

- مشاكل في التوازن (فيرتيجو)
- حكة وأحاسيس جلدية غير عادية مثل الحذر، الوخز، النخز، الذع أو الإحساس بالتنميل على الجلد (مثل)
- فقدان أو تغير حساسة التذوق
- مشاكل في النوم
- شعور بالانتكباب، القلق، العصبية الزائدة عن المعتاد أو التمللم
- انسداد الأنف، صعوبات في التنفس أو تقاخم الربو
- انتفاخ في الأمعاء (intestinal angioedema) يتمثل بألم في البطن، تقيؤ أو إسهال
- حرقة، إسهال أو جفاف في الفم
- تبؤل متزايد عن المعتاد
- تعرق متزايد عن المعتاد
- انخفاض أو فقدان الشهية
- ارتفاع أو تغير في نظم القلب
- انتفاخ في الذراعين والرجلين – يمكن أن يشكّل علامة على احتباس السوائل في الجسم أكثر من المعتاد

- تورّد الوجه
- تَشوُّش الرؤية
- الآم في المفاصل
- حمى
- ضعف جنسي لدى الرجال، انخفاض الشهوة الجنسية لدى الرجال أو النساء
- ارتفاع في نوع معين من خلايا الدم البيضاء (eosinophilia) – شوه قد يحرص الدم
- نتائج لفحوص الدم تشير إلى تغير في وظيفة الكبد أو البنكرياس أو الكليتين

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 1,000)

- شعور بعدم الاستقرار أو بالارتباك
- احمرار وانتفاخ اللسان
- تقرح جلدي خطير، وخز، طفح جلدي على شكل كتل
- مشاكل في الأظفار (مثلًا، انفكاك أو انفصال الظفر عن قاعدته)
- طفح جلدي أو كدمات جلدية
- بقع جلدية وشعور بالبرودة في الأطراف
- في العينين – احمرار، وخز، انتفاخ أو دماغ
- اضطرابات في السمع وطنين في الأذنين
- شعور بالضعف

نتائج لفحوص الدم تُظهر انخفاضًا في عدد خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء أو صفائح الدم أو كمية الهيموجلوبين

أعراض جانبية نادرة جدًا (تظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 10,000)

- تزايد الحساسية لضوء الشمس
- أعراض جانبية إضافية تم التبليغ عنها:**
- أخبر الطبيب المعالج إذا تقاخم أحد الأعراض المفصلة أدناه أو استمر لأكثر من بضعة أيام:
- صعوبات في التركيز
- انتفاخ في الفم
- نتائج لفحوص الدم تُظهر قلة خلايا الدم في دمك
- نتائج لفحوص الدم تُظهر مستوى صوديوم أدنى من المعتاد في الدم بول مركز (لونه غامق)، غثيان أو تقيؤات، تقلصات في العضلات، ارتباك واختلاجات، قد تكون نتيجة لاضطراب في إفراز الهورمون المراقب لإفراز البول (ADH). إذا شعرت بهذه الأعراض، فراجع الطبيب في أسرع وقت ممكن
- تغير في لون أصابع اليدين والقدمين عندما تشعر بالبرد وبعد ذلك شعور بالوخز أو بالألم عندما تغطأ (ظاهرة تسمى Raynaud’s phenomenon)
- تضخم التندبين لدى الرجال
- تباطؤ أو تغير ردود الفعل
- شعور بالذع
- تغير في راحة الأشياء
- تساقط الشعر

إذا ظهر عرض جانبي، أو تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الامتارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il/

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم.

لا تسبب التذبذب بتغيير تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدون على العبوة/التبريط (البيسترس). يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين:

يجب التخزين في العبوة الأصلية في درجة حرارة لا تزيد عن 25°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي راميبريل تيفع 5 ملغ أيضًا على: Lactose monohydrate, pregelatinized maize starch, sodium hydrogen carbonate, croscarmellose sodium, sodium stearyl fumarate, Iron oxide red, Iron oxide yellow.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:

راميبريل تيفع 5 ملغ: قرص وردي، متطاوّل ومسطح، ذو خط للشطر على أحد جانبيه، بجانب خط الشطر الطويل "R" من جهة واحدة و"3" من الجهة الثانية. يمكن تقسيم القرص إلى نصفين متساويين. الأقراص معبأة في عبوة شرائط (بيسترس). تحتوي كل عبوة على 20، 28، 30، 50، 56 أو 60 قرصًا. ليست كل أحجام العبوة مسوقة. لا تشتمل هذه النشرة على جميع المعلومات عن المستحضر. إذا توفرت لديك أي أسئلة أو إذا لم تكن متأكدًا من شيء ما، فیرجى مراجعة الطبيب.

صاحب الامتياز والمصنّع وعنوانه: تيفع إسرائيل م.ض، شارع دقفورا هانفيثا 124، تل أبيب 6944020.

تم تحرير النشرة في آب/أغسطس 2024 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

راميبريل تيفع 5 ملغ: 176-76-3218-99

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.