

## עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקשיירים) התשמ"י - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

# כלוראפרפ

תמיישה לשימוש עור

הרכב:

חומרים פעילים

כלורhexידין גלוקונאט 20 מ"ג/מ"ל ואיזופרופיל אלכוהול 0.70 מ"ל/מ"ל.

Chlorhexidine gluconate 20 mg/ml and isopropyl alcohol 0.70 ml/ml.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים - ראה סעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.  
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר זה על פי ההוראות בסעיף המינון בעalon זה. היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.  
עליך לפנות לרופא במידה ותסמנני המחללה מחמירים או אינם משתפרים.

### 1. למה מיועדת התרופה?

התכשיר הרפואי מיועד לשימוש עבור חיטוי העור לפני פרוצדרות רפואיות חמורות.  
קבוצה רפואיית: כלורhexידין, שלובים.

### 2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לכלורhexידין גלוקונאט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים של כלוראפרפ, במיוחד אם יש לך היסטוריה של תגובות אלרגיות הקשורות לכלורhexידין (ראה סעיף 6).

ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה

כלוראפרפ הוא לשימוש חיצוני בלבד.

אין להשתמש בכלוראפרפ:

- ליד ריריות עדינות (մمبرנות מוקזחות), היהות שזה עלול לגרום ליגרוי.

אם הוא נכנס לריריות העדינות במעברי הגוף, יש לשטוף במהירות עם הרבה מים.

- על פצעים פתוחים בעור.

- על החלק באוזן הנמצא בתוך הגוף (האוזן התיכונה).

- בפגע ישיר עם רקמה עצבית (לדוגמא רקמת מוח או רקמת חוט שדרה).

כלוראפרפ אסור לבוא במגע עם העין בגל הסיכון לגרימת נזק בראיה. אם התרופה באה במגע עם העיניים, יש לשטוף מיד והיטב עם מים. במקרה של כל גירוי, אדמומיות או כאב בעין, או הפרעה בראיה, פנה לייעוץ רפואי בהקדם.

דוחה מקרים חמורים של פגיעה מתמשכת בקרנית (פגיעה בפני השטח של העין) שעולים להביא לצורכי בהשתלת קרנית כאשר מוצרים דומים באו בטעות במגע עם העין במהלך תהליכי כירורגיים, כאשר החולים היו תחת הרדמה כללית (שינה עמוקה ללא כאבים).

כלוראפרפ עלול במקרים נדירים לגרום לALERGENOTIC CHMOROT, המובילות לנפילה בלחץ הדם ואף לאיבוד ההכרה. תסמנים מוקדמים לתגובה אלרגית חמורה עשויים להיות פריחה עורית או אסתמה. אם אתה מביח

בתרסומים אלו, הפסיק לשימוש כלוראפרפ' ונונה לרופא שלך בהקדם האפשרי (ראה תחת סעיף 4: **"תופעות לוואי"**).

יש למרוח כלוראפרפ' על העור בעדינות בלבד. כאשר התמיישה נמרחת באופן נמרץ מדי על עור שברירי מאד או עור רגיש, או לאחר שימוש חוזר; פريحה, דלקת, גרד, יובש /או עור קשקי וכאב עולמים להופיע. עם הסימן הראשון לאחת מהתగובות האלו, יש להפסיק את המריחה של כלוראפרפ'.

יש להימנע מ מגע ממושך עם העור.  
חומרים ספוגים, כמו כיסויים או חולקים יש להסיר לפני השימוש. אין לתת לתמיישה להצטבר.

**התמיישה דלקת.** אין לשימוש במקורות הצתה עד שהעור יבש לחЛОוטין.

#### ילדים

יש לשימוש בחזרות ביילדים, במיוחד בפגים. כלוראפרפ' עלול לגרום לכוויות כימיות בעור.

**איןטראקטזיות/תגבות בין תרופתיות וכלוראפרפ':**  
אם אתה לוקח או לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר לרופא או לרוקח.

ספר לרופא או לאחות אם קיבלת לאחרונה חיסון או זריקת מבחין עור ( מבחין מטלית המשמש לאבחן אלרגיות [patch test].

**הרין, הנקה ופוריות**  
אין מחקרים של כלוראפרפ' בנשים הרות או מניקות.

הרין לא צפויות השפעות במהלך הרין היות והחשיפה הסיסטמית לכלורהקסידין גלוקונאט היא זניחה. ניתן לשימוש בכלוראפרפ' במהלך הרין.

הנקה לא צפויות השפעות על היילוד/תינוק היות והחשיפה הסיסטמית של האישה המnika לכלורהקסידין גלוקונאט היא זניחה.

ניתן לשימוש בכלוראפרפ' בזמן הנקה.  
פוריות ההשפעות של כלורהקסידין גלוקונאט על פוריות האדם לא נחקרו.

#### נהיגה ושימוש במכונות

כלוראפרפ' אין השפעה או השפעה זניחה על יכולת נהוג ולהשתמש במכונות.

#### 3. כיצד לשימוש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח לגבי המינון ואופן הטיפול בתכשיר.

התמיישה האנטי-ספטית בתוך מערכת כלוראפרפ' נשמרת בתחום האפליקטור הפלסטי. הרופא שלך או האחות יבחרו את גודל האפליקטור בהתאם לעוזר הפרואדרה והשתח שיש לכוסות. הרופא שלך או האחות ישפשפו את הספוג בעדינות על גבי העור שלך לכיסוי שטח העור שיש להכין. כתלות בפרואדרה הרפואית שלך, יתכן שימוש ביותר מאפליקטור אחד.  
כלוראפרפ' הוא לשימוש על העור בלבד ובכל אפליקטור משתמשים רק פעם אחת.

אם יש לך שאלות נוספות כלשהן לגבי השימוש בתכשיר זה, שאל את הרופא שלך או האחות.

#### אין לעבור על המנה המומלצת.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכב משקפים אם הנר זקין להם.

אם יש לך שאלות נוספות כלשהן בנוגע לשימוש בתרופה זו, היועץ ברופא שלך או באחות או ברוקח.

כמו בכל תרופה, השימוש בכלוראפרפ' עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

אם אתה חווית אחת מהתగובות הבאות, הפסיק להשתמש בכלוראפרפ' ופנה לעזרה רפואיית מיידית:  
התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון או האגרון; פרייה עורית אדומה מגדרת; צפצופים או קשיי נשימה;  
הרגשת עילפון וசחרחות; טעם מתכתי מוזר בפה; התמוטטות. יתכן שאתה חווית תגבהה אלרגית.  
אם אתה מפתח פריה או שעורך הופך מגדר, כאב, אדום, שלפוחית, יש או מודלק באזור בו השתמשת  
בתכשיר כטיפתת של העור, הפסיק להשתמש בכלוראפרפ' ושוחח עם הרופא שלך או הרוקח.

**תופעות לוואי נדירות מאד - תופעות שימושיות בפחות משתמש אחד מthan 10,000:**  
תגבות עוריות של אלרגיה או גירוי למרכיבים בכלוראפרפ' (כלורהקסידין גלוקוננט ואיזופרופיל אלכוהול)  
דיווחו.

**תופעות לוואי בשכיחות לא ידועה (שכיחותן טרם נקבעה):**  
גירוי בעיניים, כאב, פגיעה בקרנית (פגיעה בפני השטח של העין), ונזק קבוע לעיניים כולל ליקוי ראייה קבוע  
(לאחר חשיפה מקרית של העיניים במהלך פריצודורה כירורגית בראש, פנים ובצואර) בחולים תחת הרדמה  
כללית (שינוי عمוקה ללא כאבים), כוויות כימיות וכוויות בעור בילדים/תינוקות.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מטופעת הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא  
צינה בעלן זה, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב  
טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (il.gov) המפנה לטופס המופיע  
לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. כיצד לאחסן את התרופה?

מנع הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים  
או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה.  
אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי התווית או הקרטון. תאריך התפוגה  
מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

דליך.  
תרופה זו זה אינה דורשת תנאי אחסון מיוחד מיחידים כלשהם. מומלץ לאחסן בטמפרטורת החדר.  
יש לאחסן באירועה המקורי; האפליקטור סטרילי אלא אם הסוגר שבור.

מנع חשיפה של המכל ותוכלו להבאות פתוחות במהלך השימוש, האחסון והפינוי.

אין להשליך תרופות לביב או לאשפה הביתיית. שאל את הרוקח שלך כיצד להשליך תרופות שאינן משתמש  
בهن עוד. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

## 6. מידע נוסף

**נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:**

Purified water.

**כיצד נראה תרופה ותונן האירועה:**

האפליקטורים של 1.5 מ"ל פראף (Frepp) מורכבים מספג קצף מלכני, ללא ליטקס, המחבר לגליל פלסטייק  
אשר נושא אמפולת זכוכית המכילה את התמיישה האנטייספטית.

האפליקטורים של 1 מ"ל, 3 מ"ל ושל 10.5 מ"ל מורכבים מספג קצף עגול, ללא לטקס, המחבר לגליל פלסטי אשר נושא אמפולת זכוכית המכילה את התמייסה האנטיספטית.

האפליקטור של 26 מ"ל מורכב מספג קצף מרובע, ללא לטקס, המחבר לגליל פלסטי אשר נושא שתי אמפולות זכוכית המכילות את התמייסה האנטיספטית.

האפליקטורים הטריליים ארוזים כל אחד בנפרד בעטיפה שקופה.

גודל אריזה:

1 מ"ל	60 אפליקטורים
1.5 מ"ל (Frepp)	20 אפליקטורים
1.5 מ"ל	אפליקטור 1 או 25 אפליקטורים
3 מ"ל	אפליקטור 1 או 25 אפליקטורים
10.5 מ"ל	אפליקטור 1 או 25 אפליקטורים
26 מ"ל	אפליקטור 1

יתכן ולא כל גודלי האריזה משווים.

**בעל הרישום וכתובתו:**

בקטון דיקינסון (BD) ישראל בע"מ, רחוב השיטה 14, קיסריה, ישראל

**היצן וכתובתו:**

CareFusion 213 LLC. 1550 Northwestern Drive – El Paso, Texas 79912 – USA

קארפיזן 213 LLC 1550 נורת'ווסטרן דרייב - אל פאסו, טקסס 79912 – ארה"ב

**נערך בספטמבר 2024**

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:  
**כלוראפרפ: 00-172-49-36418-00**

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נושא בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

#### המידע הבא מיועד לאנשי צוות רפואי בלבד:

**הנחיות לשימוש באפליקטורים של כלוראפרפ:**

לשימוש על העור. לשימוש חיצוני בלבד.

- הוציא את האפליקטור מהעטיפה ואחוז בו כשהספג פונה מטה.

- לחץ על האפליקטור **פעם אחת בלבד**:

- בתכשיר בגין 26 מ"ל; לחץ את המנווף על הידית

- בתכשירים אחרים; לחץ את הכנפיים

- אין לחזור ולמעור או לפטוף את הכנפיים שוב ושוב בניסיון להאיץ את הרויה של הספג.

- לחץ בעדינות את הספג נגד עור המטופל על מנת למרוח את התמייסה האנטיספטית. כאשר ניתן לראות את התמייסה על העור, השתמש בתנועות עדינות הלווי ושוב להכנת האזור במשך 30 שניות.

- האפליקטור של 26 מ"ל כולל שני מקלוני מטושים. נקה את כל הטבור בעדרת המטושים המצורפים בעט הצורף (הרטב את המטושים על ידי לחיצתם נגדי ספג האפליקטור הספג בתמייסה).

- אפשר לאזור המrhoח להתיבש לחЛОטן באויר.  
ניתן להשריר כלוראפרפ על העור לאחר הפרוצדורה.

**אזורים כסויים מילויים:**

1 מ"ל	8 ס"מ x 10 ס"מ
1.5 מ"ל (Frepp)	10 ס"מ x 13 ס"מ
1.5 מ"ל	10 ס"מ x 13 ס"מ
3 מ"ל	15 ס"מ x 15 ס"מ
10.5 מ"ל	25 ס"מ x 30 ס"מ
26 מ"ל	50 ס"מ x 50 ס"מ

#### אמצעי זהירות לשימוש:

- הנח לכליואפרה להתייבש לחלוין לפני התחלת פרוצדורה רפואית כלשהי. אל תבצע פרוצדורות של צריבה באמצעות זרם חשמל (electrocautery) עד אשר העור יבש לחלוין. אל תשתמש בכמיות מופרזות ואל תאפשר לתמיסה להצטבר בכפל עור או מתחת למטופל או לטפטף על סדינים או חומרים אחרים בmagic שיר עם המטופל.
- השתמש בהזרחות ביילדים, במינוח בלבדו לפני שבוע 32 של ההריון ובמהלך השבועיים הראשונים לחייהם. קלואפרה עלול לגרום לכוויות כימיות בעור.
- אל תשתמש ליד קורומים ריריים, היות זהה יכול לגירום לגירוי, כאב וכיווית כימיות. אם התמיסה כן נכנסת לקורומים ריריים, יש לשטוף אותה במהירות עם הרבה מים.
- לכליואפרה אסור לבוא בmagic עם העין בגלל הסיכון לגירמת נזק בראייה. אם התרופה באה בmagic עם העיניים, יש לשטוף מיד והיטב עם מים. יש להתייעץ עם רופא עיניים.
- אל תשתמש על פצעים פתוחים בעור, על עור שבור או פגוע.
- אסור שכליואפרה יבוא בmagic עם רקמות עצביות או האוזן התיכונה.
- כלורוהקסידין אינם מתאים עם סבון וחומרים אণוניים אחרים.
- אלכוהול לא צריך לבוא בmagic עם חיסונים ותבחנים עוריים (patch tests) מסוימים. אם יש ספק, הייעוץ בספרות של יצרך החיסון.
- אל תمرة את התמיסה באופן נמרץ מדי על עור שביר מאוד או עור רגיש. לאחר שימוש חוזר עשויה להופיע תגובה עורית מקומית, כולל: אריתומה או דלקת, גרד, עור יבש /או קשקיי וכאב מקומי באזורי המריחה. הפסק את המריחה של קלואפרה עם הסיכון הראשון של תגובה עורית מקומית.
- אל תשתמש במטופלים אם ידועה רגשות יתר לתמיסת קלואפרה או לכל אחד ממרכיביה, במינוח בלבדו עם ההיסטוריה של תגבות אלרגיות אפשריות הקשורות לכליואפיה. תכשירים המכילים כלורוהקסידין הם גורמים ידועים לתגבות אנטיפילקטיות בהדרגה. אם מתגלים תס敏ים של תגובה אנטיפילקטית במהלך ההרדמה (כגון נפילה חרדה בלחץ הדם, סרפה, אנטגיאודה), יש לשקל תגובה אלרגית לכליואפיה.
- יש לנתק בmagic זהירות מיוחדות על מנת למנוע חשיפה של מטופלים לכל תכשיר אחר המכיל כלורוהקסידין במהלך הטיפול.

#### אמצעי זהירות מיוחדים לפינוי

התמיסה היא דלקת. אל תשתמש בזמן עישון או ליד כל להבה פתואה או מקורות חום חזקים. מנע חשיפה של המכל ותוכלו להבה פתואה במהלך השימוש, האחסון והפינוי. לאחר השימוש, השלך את האפליקטור לפי הנהלים לאשפזה רפואית.

אנא פנה לעלון לרופא (Summary of Product Characteristics) של קלואפרה למידע מפורט נוספת.