

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات 1986

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

بوماليدوميد تيفع 1 ملغ

بوماليدوميد تيفع 2 ملغ

بوماليدوميد تيفع 3 ملغ

بوماليدوميد تيفع 4 ملغ

المادة الفعالة:

بوماليدوميد تيفع 1 ملغ: تحتوي كل كبسولة صلبة على 1 mg pomalidomide بوماليدوميد **تيفع 2 ملغ:** تحتوي كل كبسولة صلبة على 2 mg pomalidomide بوماليدوميد **تيفع 3 ملغ:** تحتوي كل كبسولة صلبة على 3 mg pomalidomide بوماليدوميد **تيفع 4 ملغ:** تحتوي كل كبسولة صلبة على 4 mg pomalidomide بوماليدوميد للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسيبات الأرباح انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد مُصِف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه.

من المتوقع أن يسبب بوماليدوميد تيفع ضرراً بالغا للجنين يصل إلى حد التسبب بالموت. لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا كنت حاملاً أو تتوقعين أن تحملي. عليك التصرف بموجب توصيات منع الحمل المفصلة في هذه النشرة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

يُستعمل بوماليدوميد تيفع لعلاج البُلغين الذين يعانون من نوع من السرطان يسمى "الورم النقوي المتعدد".

يعطى بوماليدوميد تيفع:

• مع دوائين إضافيين – دواء يسمى "بوريتيزوميب" (نوع من أدوية العلاج الكيميائي) و-"ديكساميثازون" (دواء مضاد للالتهاب) لدى البالغين الذين تلقوا في الماضي علاجاً واحداً آخر على الأقل – بما في ذلك لينداليدوميد.

أو

• مع دواء واحد آخر اسمه "ديكساميثازون" لدى البالغين المصابين بالورم النقوي المتعدد المتكرر أو الذي قد تقاهم، على الرغم من أنهم قد تلقوا علاجين آخرين على الأقل يشتملان لبوماليدوميد وبوريتيزوميب وظهر لديهم تقدم في المرض خلال العلاج الأخير.

الفصيلة العلاجية: ينتمي الدواء إلى فصيلة الأدوية الكابتة للجهاز المناعي.

ما هو الورم النقوي المتعدد

الورم النقوي المتعدد هو نوع من السرطان يلحق الضرر بنوع معين من خلايا الدم البيضاء (تسمى "خلايا البلازما"). تتراكم هذه الخلايا في النخاع العظمي وتتكاثر بشكل غير خاضع للسيطرة. قد تسبب هذه الحالة ضرراً للعظام والكلى والبنين.

في الغالب لا يمكن الشفاء من الورم النقوي المتعدد. مع ذلك، يمكن تقليل علامات المرض وأعراضه إلى حد كبير بل وإخفاؤها تمامًا لفترة معينة إذا تم إعطاء علاج. إذا حصل ذلك، فإنه يسمى "استجابة".

كيف يعمل بوماليدوميد تيفع

يعمل بوماليدوميد تيفع من خلال عدة مسارات مختلفة:

• إيقاف تطور الخلايا السرطانية.

• تهييج جزء من الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا السرطانية.

• منع تطور أو عيه دموية في الورم النقواني.

أفضلية استعمال بوماليدوميد تيفع مع بوريتيزوميب وديكساميثازون يستطيع بوماليدوميد تيفع عند استعماله مع بوريتيزوميب وديكساميثازون لدى الأشخاص الذين تلقوا علاجاً واحداً إضافياً آخر على الأقل أن يوفر تفاهق الورم النقوي المتعدد:

• بالمعدل، عندما يعطى بوماليدوميد تيفع مع بوريتيزوميب وديكساميثازون فهو يوقف عودة الورم النقوي المتعدد لمدة أقصاها 11 شهراً – بالمقارنة مع 7 أشهر لدى المرضى الذين استعملوا بوريتيزوميب أو ديكساميثازون فقط.

أفضلية استعمال بوماليدوميد تيفع سوياً مع ديكساميثازون يستطيع بوماليدوميد تيفع عند استعماله مع ديكساميثازون لدى الأشخاص الذين تلقوا في الماضي علاجين آخرين على الأقل أن يوفر تفاهق الورم النقوي المتعدد:

• بالمعدل، يؤجل استعمال بوماليدوميد تيفع سوياً مع ديكساميثازون الظهور المتجدد للورم النقوي المتعدد لمدة أقصاها 4 أشهر بالمقارنة مع شهرين فقط لدى المرضى الذين استعملوا ديكساميثازون فقط.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

النساء:

• لا تستعلمي هذا الدواء إذا كنت حاملاً أو تحططين للحمل. قد يشكل بوماليدوميد تيفع خطراً على الجنين، وذلك إذا كنت في سن الخصوبة فلا يجوز استعمال الدواء دون اتخاذ وسائل مناسبة لمنع الحمل (انظري رجاءً "الحمل، وسائل منع الحمل، والإرضاع – معلومات للنساء والرجال").

بعد إنهاء استعمال الدواء، يجب الانتظار 4 أسابيع إضافية على الأقل قبل أن تحاولوا إحداث حمل.

الرجال:

• لا تستعمل هذا الدواء إذا كنت لا تستطيع أو لست على استعداد لاستعمال الواقي المظاطي (الكوندوم) في كل مرة تقيم فيها علاقة جنسية مع امرأة في سن الخصوبة (انظر رجاءً "الحمل، وسائل منع الحمل، والإرضاع – معلومات للنساء والرجال").

• لا تتبرع بالدمي عند استعمال الدواء، وخلال فترات الاستراحة بين جرعات الدواء، ولمدة 4 أسابيع على الأقل بعد إيقاف استعمال الدواء.

جميع مثقلى العلاج:

• لا يجوز استعمال الدواء إذا وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة – بوماليدوميد أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بخصة تيفع بوماليدوميد تيفع، أخبر الطبيب إذا:

• تعبت ذات مرة من عرضة لخطر ظهور خثرات دموية في الأوردة والشرايين. يُحتمل أن يوصيك الطبيب باستعمال دواء إضافي (مثل وارفارين (كومادين)) أو أن يقلل جرعة بوماليدوميد تيفع من أجل تقليل احتمال ظهور خثرات دموية.

• حدث لديك ذات مرة رد فعل تحسسي مثل الطفح الجلدي، الحكة، التورم، الدوار، أو الصعوبات في التنفس بعد تناول أدوية من نوع مشابه تسمى: "البليدوميد" أو "البليديوميد".

• كنت تعاني من قصور القلب أو أصبت بنوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس أو إذا كنت مدخنًا، أو إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع أو من مستويات مرتفعة للكوليسترول.

• وجدت لديك كمية كبيرة من الأورام في كل الجسم، بما في ذلك في النخاع العظمي. قد يؤدي ذلك إلى حالة تتحلل فيها الأورام ونتيجة لذلك ترتفع كمية المواد الكيميائية في الدم بشكل شاذ، مما قد يسبب فتلا في وظيفة الكلىتين. يُحتمل أن تلاحظ أيضًا نبضًا غير منتظم. تسمى هذه الحالة "متلازمة انحلال الورم" (Tumour Lysis Syndrome).

• كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من مرض في الجهاز العصبي المحيطي (neuropathy)، يتمثل مثلًا بالوخز أو بالألام في اليدين أو في القدمين.

• وُجد لديك الآن أو كان لديك في الماضي التهاب الكبد/هيباتيتيس B. العلاج ببوماليدوميد تيفع يمكن أن يجعل فيروس التهاب الكبد B نشطًا من جديد لدى المرضى الذين يُعتبرون حاملين للفيروس ونتيجةً لذلك يسبب عودة التلوث. سيفحص طبيبك ما إذا كنت ذات مرة مصابًا بتهاب الكبد B.

• وُجد لديك الآن أو نشأ لديك في الماضي واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية: طفح جلدي على الوجه أو طفح جلدي واسع النطاق، احمرار الجلد، حمى مرتفعة، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تضخم العقد الليمفاوية (علامات لرد فعل جلدي خفيف يسمى رد الفعل على الدواء، المصحوب بكثرة البثور بينات والأعراض الجهازية (DRESS) أو متلازمة فرط الحساسية للدواء، تُعثر الأنسجة المتوتمة الشبورية التسممي Toxic Epidermal Necrolysis) (E) أو متلازمة ستيفينس جونسون (SJS)، انظر أيضًا البند 4 "الأعراض الجانبية").

من الجدير بالذكر أن المرضى المصابين بالورم النقوي المتعدد الذين يتلقون العلاج ببوماليدوميد قد تتطور لديهم أنواع إضافية من السرطان. لذلك يجب على طبيبك أن يفحص الفائدة مقابل الخطر بعناية عندما يصف لك بوماليدوميد تيفع.

في أي وقت أثناء العلاج أو بعده، أخبر الطبيب بشكل فوري إذا نشأ لديك نبضات أو ضيق في التنفس، روية مرتفعة أو فقدان البصر، صعوبة في التكم (التقلص) العضلي، أو في النزاع أو في الرجل، تغير في طبيعة المشي وفي التوازن، خدر متواصل، دنتى أو فقدان الإحساس، فقدان الذاكرة وارتباك.

قد تشير هذه الأعراض إلى حالة من الحدت الدماغى المتعدد البؤرى (PML). أخبر الطبيب إذا كانت لديك هذه الأعراض قبل البدء بالعلاج الدوائى.

الأولاد والمراهقون

بوماليدوميد تيفع ليس مخصصًا لعلاج الأولاد والشباب الذين يبلغون أقل من 18 عامًا من العمر.

الفحوص والمتابعة

يحتاج العلاج ببوماليدوميد تيفع وسيبب سُجري لك فحوص دم منتظمة، لأن الدواء الذي تستعمله قد يقلل انخفاضًا في عدد خلايا الدم التي تساهم في مكافحة التلوثات (خلايا الدم البيضاء) وفي عدد خلايا الدم التي تساهم في مكافحة النزيف الدموي (الصفائح الدموية).

سيطلب منك الطبيب أن تخضع لفحص الدم:

• كل أسبوعٍ خلال الأسابيع الثمانية الأولى من العلاج.

• بعد كل مرة واحدة في الشهر على الأقل، ما تمت تستعمل بوماليدوميد تيفع.

وفقًا لتنتاج الفحوص، يُحتمل أن يغير الطبيب جرعة بوماليدوميد تيفع التي تتناولها أو أن يأمرك بإيقاف العلاج. يمكن أن يغير الطبيب الجرعة الأولى من أن يأمرك بالتوقف عن استعمال الدواء نظرًا أيضًا إلى وزن الجسمى العام.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. ذلك لأن بوماليدوميد تيفع قد يؤثر على كيفية عمل الأدوية الأخرى. كذلك، قد تؤثر الأدوية الأخرى على كيفية عمل بوماليدوميد تيفع. خاصةً يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل:

• أي أدوية مضادة للفطريات، مثل كيتوكونازول.

• أي أدوية من الكوندات الحيوية، على سبيل المثال:

• سيبروفلوكساسين، والفلوكساسين.

• أي أدوية مضادة للاكتئاب، مثل فلوروكسامين.

في نهاية العلاج ينبغي أن تعيد للصيدلي جميع الكبسولات التي لم تستعملها.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الكبسولة مع الطعام أو بدونه.

الحمل، وسائل منع الحمل، والإرضاع – معلومات للنساء والرجال يجب اتباع الإرشادات الواردة أثناء، كما هو مفصل في "برنامج إدارة المخاطر/برنامج منع الحمل عند استعمال بوماليدوميد تيفع (RMP/PPP)". يجب على النساء والرجال الذين يستعملون بوماليدوميد تيفع أن يتمتعا عن الحمل أو للتنبؤ به، الحمل، لأنه من المتوقع أن يسبب بوماليدوميد ضرراً للجنين. ينبغي عليك وعلى شريكك أن تستعملا وسائل فعالة لمنع الحمل عند استعمال الدواء.

لا تستعلمي بوماليدوميد تيفع إذا كنت حاملاً، أو تتظنين أنك حامل، أو تحططين للحمل، لأنه من المتوقع أن يسبب بوماليدوميد تيفع ضرراً للجنين. قبل البدء بالعلاج، عليك إخبار الطبيب إذا كان بإمكانك أن تحملي، حتى لو اعتدت أن ذلك غير مرجح.

إذا كان بإمكانك أن تحملي:

• أنت مازمة باستعمال وسائل فعالة لمنع الحمل لمدة 4 أسابيع على الأقل قبل أن تبديني بالعلاج، وأثناء العلاج (بما في ذلك في فترات الاستراحة بين الجرعات) وبعد انتهاء العلاج – بمدة 4 أسابيع.

إذا حملت على الرغم من وسائل منع الحمل التي اتخذتها:

• عليك إيقاف العلاج فوراً والتوجه إلى طبيبك على استعجال.

الإرضاع

يتغلغل بوماليدوميد تيفع في الحليب لدى البشر. إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فإليك معلومات إضافية عن كيفية تجنب انتقال الدواء إلى طفلك. ينبغي اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب إيقاف الإرضاع أو إيقاف الدواء.

الرجال

يتغلغل بوماليدوميد تيفع في الحليب لدى البشر. إذا كنت ترضع طفلك رضاعة طبيعية، فإليك معلومات إضافية عن كيفية تجنب انتقال الدواء إلى طفلك. ينبغي اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب إيقاف الإرضاع أو إيقاف الدواء.

• أنت مازمة باستعمال وسائل فعالة لمنع الحمل لمدة 4 أسابيع على الأقل قبل أن تبديني بالعلاج، وأثناء العلاج (بما في ذلك في فترات الاستراحة بين الجرعات) وبعد انتهاء العلاج – بمدة 4 أسابيع.

إذا حملت على الرغم من وسائل منع الحمل التي اتخذتها:

• عليك إيقاف العلاج فوراً والتوجه إلى طبيبك على استعجال.

الأعراض الجانبية

يُتوقع أن يسبب لك بوماليدوميد تيفع أعراض جانبية. قد تختلف شدة الأعراض من أعراض خفيفة إلى أعراض شديدة. قد تستمر بعض الأعراض بعد انتهاء العلاج.

• قد تسبب بوماليدوميد تيفع التعب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب، الدوار، الانخفاض في حالة الوعي إذا عانيت من هذه الأعراض، فلا يجوز السباحة أو تشغيل الأدوات والمكائن.

• قد يسبب بوماليدوميد تيفع التهاب،