

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תק Shirim) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ליבטאיו

תמייסה מרוכצת להכנת תמייסה לעירוי

חומר פעיל:

כל בקבוקון של תמייסה מרוכצת מכיל 350 מ"ג סמייפלימאב ב-7 מ"ל
(cemiplimab 50 mg/ml)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 6 "מידע נוספים".

קרא בעיון את העلون עד סופו לפני שימוש בתרופה.

שמור על עalon זה, יתכן שתצטרכך לקרוא בו שוב.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

אם יש לך תופעת לוואי כלשהי, פנה לרופא. זה כולל תופעות לוואי שאין רשומות בעalon זהה. ראה סעיף 4.

בנוסף לעalon, לתכשיר ליבטאיו קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעליך לדעת לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בלייטאיו ולפיעול על פיו. יש לעין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל ובעalon לצריכן לפני השימוש בתכשיר. יש לשמר את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

ליבטאיו כמנוגנוטרפיה משמשת לטיפול במוגרים:

- עם סרטן עור שנקרוּא קרzinומה עורית גורחתית או בעלת פולשנות מקומית מסווג תא קשך (CSCC) אשר אינם מועמדים לנינוח או הקרינה.
- עם סרטן עור שנקרוּא קרzinומה של תא הבסיס (BCC) גורחתית או בעלת פולשנות מקומית, אשר קיבלו טיפול במעקב מסלול קיפוד (Hedgehog) והטיפול לא עבד כמצופה או לא היה נסבל.

קבוצה רפואיית:

תרופה אנטי סרטנית; נגדן חד שבט.

מנגנון הפעולה

ליבטאיו היא תרופה לטיפול הסרטן המכילה את החומר הפעיל סמייפלימאב, שהוא נגדן חד שבט. ליבטאיו פועלת על ידי עזרה למערכת החיסון שלך להילחם הסרטן.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לסמייפלימאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים של ליבטאיו (ראה סעיף 6).

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בלייטאיו ספר לרופא אם:

- יש לך מחלת אוטואימונית (מצב בו הגוף תוקף את התאים של עצמו).

- עברת השטלה של איבר, קיבלת בעבר או אתה מתוכן לקבל השטלה מה עצם מאדם אחר (השתלת תא אב (תאי גזע) המטופואטיים, אלוגנאיות).
- יש לך בעיות בריאות או בנסיומה.
- יש לך בעיות בכבד.
- יש לך בעיות בצליות.
- יש לך סוכרת.
- יש לך כל מצב רפואי נוסף.

אם אחד מהסעיפים הנזכרים מעלה נוגע אליו, או אם איןך בטוח, פנה לרופא או לאחות, לפני שאתה מקבל ליבטאיו.

ילדים ומתבגרים
LIBTAYO אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

בדיקות ומעקב
במהלך הטיפול הרופא יעורר לך בדיקות דם, לheck אחר תופעות לוואי מסוימות.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות
אם אתה לוקה, אם لكחת לאחרונה, או אתה עשוי לחתת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא אם אתה לוקה או לחתת אי פעם את אחת מהתרופות הבאות:

- אידיאלייסיב (תרופה לסרטן)
- תרופות המחלישות את מערכת החיסון שלך. לדוגמה, קורטיקוסטרואידים כגון פרדניזון. תרופות אלו עלולות להפריע להשפעה של ליבטאיו. אולם, בזמן הטיפול בליבטאיו, הרופא עשוי לתת לך קורטיקוסטרואידים, להפחית תופעות הלואה, שייתכן שיהיה לך עם הטיפול בליבטאיו.

הירין, הנקה ופוריות

הירין

אם את בהירין, חושבת שאתה בהירין או מתכונת הירין, התיעצי עם הרופא שלך לפני הטיפול בליבטאיו.

- ליבטאיו עלול להזיק לעובר שלך.
- ספרי לרופא מיד, אם ונכנסת להירין במהלך הטיפול בליבטאיו.
- אם את בגיל הפוריות, עלייך להשתמש באמצעות מנעה ייעילה, על מנת למנוע כניסה להירין:
 - כאשר את מטופלת בליבטאיו וכן,
 - לפחות ארבעה חודשים לאחר קבלת המנה האחורה.
- התיעצי עם הרופא לגבי שיטות המניה בהן עלייך להשתמש בתקופה זו.

הנקה

- אם את מניקה או מתכונת להניק, התיעצי עם הרופא לפני הטיפול בליבטאיו.
- אין להניך בזמן שאתה מטופלת בליבטאיו, ובמשך לפחות ארבעה חודשים לאחר קבלת המנה האחורה.
- לא ידוע אם ליבטאיו עוברת לחלב האם שלך.

נהיגה ושימוש במכונות

ליבטאיו השפעה זניחה או חסור השפעה על יכולת הנהיגה שלך או על שימוש במכונות על ידך. עם זאת, אם אתה מרגיש עייפות, אל תנעה או תפעיל מכונות עד שתרגיש יותר טוב.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בליבטאיו תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בוטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

- ליבטאיו ניתנת בטפטוף לתוך הוריד (עירוי תוך ורידי).
- העירוי יימשך כ-30 דקות.
- ליבטאיו ניתנת בדרכן כל כל 3 שבועות.

מינון

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל הוא מנה של 350 מ"ג. הרופא יקבע כמה ליבטאיו תקבל, ולכמה טיפולים תזדקק. במהלך הטיפול הרופא יערוך לך בדיקות דם, ל上岗 אחר תופעות לוואי מסוימות.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא הגיע לטיפול בליבטאיו

צור קשר במהירות האפשרית עם הרופא שלך על מנת לקבוע מועד חדש. חשוב מאוד שלא תחסיר טיפול בליבטאיו. יש להתميد בטיפול כדי שהומלץ על ידי הרופא.

אם הפסקת לקבלת ליבטאיו

אין להפסיק שימוש בליבטאיו ללא התיעצות עם הרופא. הפסקת השימוש בתרופה עלולה להפסיק את השפעת התרופה.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהinic נוטל תרופה. **הרכב משקפיים אם הינו ז konk להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בליבטאיו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיימת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן. הרופא שלך ישוחח איתך לגבי התופעות הללו ויסביר לך את הסיכונים והיתרונות של הטיפול שלך. ליבטאיו פועלת על מערכת החיסון שלך ועלולה לגרום לדלקות בחלקי גופך השונים. מצבים דלקתיים עלולים לגרום לנזקים חמורים בגוף ובמרקם מסוימים אף למוות ודורשים טיפול או הפסקת הטיפול בליבטאיו. היה עירני לגבי תופעות הלואן המתוארות בסעיף זה, אם יש לך תופעת לוואי כלשהי, שוחח עם הרופא מייד. תופעות הלואן עלולות להופיע בכל זמן במהלך הטיפול ואף לאחר שתיפול הסתיים. יתכן שיהיו לך יותר מטופעת לוואי אחת באותו הזמן.

פונה לטיפול רפואי דחוף אם יש לך סימן או תסמין (סימפטום) כלשהו מהתופעות הבאות, או אם הם מחמירים:

- **בעיות עור** – כגון פריחה או גרד, שלפוחיות בעור או כיבים בפה או ברקמה רירית אחרת.
- **בעיות בריאות (דלקת ברקמת הריאה (פנאומוניטיס))** – כגון שיעול חדש או חומרה בשיעול קים, קוצר נשימה או כאב בחזה.
- **בעיות מעי (דלקת במעי הגס (קוליטיס))** – כגון שלשלולים תקופים, לעיתים קרובות מלאים בדם או ריר, תנודות מעיים רבות יותר מהרגיל, צואה שחורה או דומה לזרפת, כאב בטן חמור או רגשות בטן.
- **בעיות כבד (הפטיטיס)** – כגון הצבתה העור או לבון העיניים שלך, בחילות או הקאות חמורות, כאב באזן של הבطن שלך, הרגשת ישננות, שtan כהה (בצבע תה), דימום או הופעת חבורות בקלות רבה יותר מהרגיל, רידה בתחושים הרעבים לעומת המצב הרגיל.
- **בעיות בבלוטות ההורמונליות** – כגון כאב ראש חריג או שאינו חולף, פעיםות לב מהירות, הזעה מוגברת, עליה בתחושים קור או חום לעומת המצב הרגיל, עיפות רבה, סחרחוות או עילפון, רידה או עליה במשקל, עליה בתחושים הרעבים או הצמא לעומת המצב הרגיל, נשירת שיער, עצירות, הקול

- שלך נעשה עמוק יותר, לחץ דם נמוך מאד, מתן שתן לעיתים תכופות יותר מהרגיל, בחילות או הקאות, כאב בטן, שינויים במצב הרוח או בהתנהגות (כגון - ירידה בחשך המין, עצבנות או שכחנות).
- **תסמינים (סימפטומים) של סוכרת מסוג 1 או קטוואצידוזיס סוכרתי** – כגון עליה בתחשות הרעב או הצמא לעומת המצב הרגיל, צורך במנתן שתן לעיתים תכופות יותר, ירידה במשקל, תחשות עייפות או בחילה, כאב בטן, נשימה מהירה ועמוקה, בלבול, ישנוויות חריגה, ריח מתוק מהבל הפה שלך, טעם מתוק או מתכתית בפה שלך, או ריח שונה לשנן או לזרעה שלך.
 - **בעיות בכליות (דלקת בכליות (נפריטיס) ואי ספיקת כליות)** - כגון מתן שתן בתדרירות נמוכה יותר מהרגיל, דם בשתן, נפיחות בקרוסליים, ירידה בתחשות הרעב לעומת המצב הרגיל.
 - **תגובהות הקשורות לעירוי (לעיטים עלולות להיות חמורות או מסכנות חיים)** - כגון צמרמות, רעד או חום, גרד או פריחה, סומק או נפיחות בפניים, קוצר נשימה או צפיפות, תחשות סחרחות או תחשות עילפון, כאב בגב או בצוואר, בחילה, הקאה או כאב בטן.
 - **בעיות באזורי גוף אחרים** כגון:
 - **בעיות במערכת העצבים** – כגון כאב ראש או צוואר נוקשה, חום, תחשות עייפות או חולשה, צמרמות, הקאות, בלבול, בעיות זיכרון או תחשות ישנוויות, פרכוים, ראייה או שמיעה של דבריהם שאינם קיימים במצבות (הזמן), חולשת שרירים חמורה, דקירות/עקבצים, חוסר תחשוה, חולשה או כאב צורב בזרועות או ברגליים, שיתוק בגפיים.
 - **בעיות בשיריר ובמפרקים** – כגון כאב או נפיחות במפרקים, כאב שרירים, חולשה או נוקשות.
 - **בעיות בעיניים** – כגון שינויים בראשיה, כאב או אודם בעיניים, רגשות לאור.
 - **בעיותقلب ומחזור הדם** – כגון שינויים בקצב הלב, קצב לב מהיר, תחשוה של החסרת פעימה או תחשות הלמות לב, כאב בחזה, קוצר נשימה.
 - **אחר:** יובש בחלקי גוף רבים, מהפה לעיניים, אף, גרון והשכבות העליונות של העור, חבורות בעור או דימום, הגדלה של הכבד /או הטחול, הגדלה של בלוטות ליפפה.
 - **מחלה בה מערכת החיסון מייצרת יותר מדי תאים** (Separator לייצור העודף הינט תקין) שנלחמים בזיהומיים, שנקראים היסטוציטים ולמפוסיטים שעולמים לגורמים לתסמינים שונים (המווגוציאטי-limfohistiocytosis, *Haemophagocytic lymphohistiocytosis*).

התופעות הבאות דוחו בניסויים קליניים במטופלים שטופלו בסמייפילימאב:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (ሞפייעות ביותר מ- 1 מתוך 10 משתמשים):

- תחשות עייפות
- כאב בשירים או בעצמות
- פריחה
- שלשול
- ירידה במספר תאי הדם האדומים בחילה
- ירידה בתחשות הרעב גרד
- עצירות
- שיעול
- כאב בטן
- דיזום בדרכי הנשימה העליונות.

תופעות לוואי שכיחות (מופייעות بعد 1 מתוך 10 משתמשים):

- הקאה
- קוצר נשימה
- חום
- דיזום בדרכי השתן
- כאב ראש
- נפיחות (בצקת)
- בעיות בבלוטת התריס (פעילות יתר של בלוטת התריס (היפרתריאואידיזם) ותת פעילות של בלוטת התריס (היפותריאואידיזם))

- לחץ דם גבוה
- עליה ברמות אנדמי כבד בדם
- אזורים של עור עבה, קשקי או קרומי (קרנת עור אקטינית, actinic keratoses)
- שימוש, דלקת ריאות
- תגבות הקשורות לעירוי
- דלקת בכבד
- דלקת בעור (שלשול, תנודות מעי רבות יותר מהמצב הרגיל, צואה שחורה או דומה לצפת, כאב חמוץ או רגימות בטן)
- דלקת בחלל הפה
- תוצאות לא תקין של תפקוד כליה
- דלקת בעצבים, הגורמת לדקירה/עכוז, חוסר תחושה, חולשה או כאב צורב של הזרועות או הרגליים
- דלקת בצליות

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיות بعد 1 מתוך 100 משתמשים):
כאב במפרקים, נפיחות, רב-שיגרון (פוליארטיטיס) ותפליט של המפרקים (Effusion).

- חברות בעור או דימום
- דלקת בבלוטת התರיס
- דלקת שריר הלב (מיוקרדייטיס) שייתכן שמויפה כקוצר נשימה, קצב לב לא סדיר, תחושת עייפות או כאב בחזה
- ירידה בהפרשת ההורמוניים המיויצרים על ידי בלוטת יותרת הכליה (אדרנל)
- חולשה בשירים
- דלקת בבלוטת יותרת המוח (היפופיזה) הממוקמת בסיס המוח
- דלקת בעטפת הלב
- יובש בחלקי גוף רבים, מהפה לעיניים, אף, גרון והשכבות העליונות של העור
- דלקת בשירים שעשויה לכלול כאב בשירים או חולשת שרירים (מיוזיטיס), ועשוויה להופיע עם פריחה (דרמטומיווזיטיס)
- דלקת בדופן הקיבה
- כאב בשירים או נוקשות (כאבי שרירים רב-שגרוניים)

תופעות לוואי נדירות (מופיות بعد 1 מתוך 1,000 משתמשים):

- דלקת בקרום המוח וחוט השדרה העשויה להיגרם מזיהום
- סוכרת מסוג 1, העשויה לכלול עליה בתחשות רעב או צמא לעומת המצב הרגיל, צורך במתן שתן בתדירות גבוהה מהרגיל, ירידה במשקל ותחושת עייפות או קטואציגוזיס סוכרתי
- כאב בעיניים, גירוי, גרד או אדמומיות, דלקת, ראייה מטושטשת, רגימות לאור הגורמת לאין נוחות (דלקת עינביה ודלקת קרנית)
- דלקת זמנית בעצבים, הגורמת לכאב, חולשה ושיתוק בגפיים
- מצב בו שרירים הופכים חלשים ומתעיפים בקלות, כאב שרירים

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- דחיה של איבר מושתל
- דלקת בשלפוחית השתן. סימנים ותסמינים (סימפטומים) עשויים לכלול מתן שתן תכוף /או כאב במתן שתן, דחיפות במתן שתן, דם בשתן, כאב או לחץ בטן התחתונה.
- המוגוציאטי-לימפוהיסטiocytosis, Haemophagocytic lymphohistiocytosis. מחלה בה מערכת החיסון שלר מיצרת יותר מדי תאים (שפרט לייצור העודף הינם תקינים) שנלחמים ב齊homim, שנקראים היסטוציטים ולימפוציטים. התסמינים עשויים לכלול הגדלה של הגוף /או הטחול, פריחה בעור, הגדלה של בלוטות למפה, בעיות נשימה, נתיחה לחברות, בעיות בכליה ולב.
- מחלת צ'ליאק (מאופיינת בתסמינים כגון כאבי בטן, שלשולים ונפיחות לאחר צריכת מזונות המכילים גלוטן).
- חוסר או הפחטה של אנדמי עיכול המיויצרים על ידי הלבלב (אי ספיקת אקסוקרינית של הלבלב).

אם הופעה תופעת לואאי, אם אחת מתופעות הלואאי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לואאי שלא צוינה בעלון, עליך להתיעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לואאי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואאי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקורי לדיווח על תופעות לואאי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. כיצד לאחסן את התרופה?

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התופגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התופגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

יש לאחסן במקסר (2°C - 8°C). אין להקפיא. אין לנער. יש לאחסן באריזה המקורית על מנת להגן מאור. מרגע ההכנה על ידי מיהול התכשיר בשקייה עירוי, ניתן לאחסן ליבטאיו לפני השימוש למשך לא יותר מ 8 שעות, בטמפרטורה של עד 25°C , או לא יותר מ 10 ימים במקסר (2°C - 8°C). אם בקבוקון או שקייה עירוי אוחסנו בקרירור, יש לאפשר להם להגיע לטמפרטורת החדר, לפני השימוש. אין לשמר שרירות של תמייסת העירוי לשימוש חוזר. יש להשמיד שרירות בהתאם לנוהלים המקומיים המקצועיים המקובלים.

6. מידע נוסף

נוסך על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

sucrose, L-proline, polysorbate 80, L-histidine monohydrochloride monohydrate, L-histidine and water for injections.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תמייסה צוללה עד מעט אטומה, חסרת צבע עד גוון צהוב חיוור, עשוי להכיל כמותות מזעריות של חלקיקים שkopים עד לבנים. כל אריזה מכילה בקבוקון זכוכית, המכיל 7 מ"ל של תמייסה מרוכצת.

בעל הרישום והיבואן וכתובתו: מדיסון פארמה בע"מ, רח' השילוח 10, פתח תקווה

שם היצרן וכתובתו:

Sanofi Biotechnology, France
54 Rue La boétie, 75008 Paris, France

עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשירים. אם יש לך שאלה כלשהי או אין לך בטוח בדבר מה, אנא פנה לרופא.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 00-36023-99-164-164
לשפטות ולהקלת הקရיה, עלון זה נוסח בלשון ذכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
נערך בספטמבר 2024.