

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (בתשע"ב) התשמ"ז – 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

בקלוסל 10, 25 טבליות

הרכב:

כל טבליה של **בקלוסל 10** מכילה:

בקלפון 10 מ"ג Baclufen 10 mg

כל טבליה של **בקלוסל 25** מכילה:

בקלפון 25 מ"ג Baclufen 25 mg

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

קבוצה תרפויטית: מרפה שרירים עם פעילות בעמוד השדרה.

פעילות רפואית: הרפיית שרירים ו/או עוויתות שמקורן בגורמים שונים.

בקלוסל משמש להפחתה ולהקלה על עודף נוקשות ו/או עוויתות בשרירים עקב מחלות ומגוון שונים.

הרפיית שרירים על-ידי **בקלוסל** משפרת את היכולת לזוז ומקלה על ביצוע הפעילויות היומיומיות.

אם יש לך שאלות לגבי אופן הפעילות של **בקלוסל**, או מדוע תרופה זו נרשמה לך, יש לפנות לרופא.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לבקלפון או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- הינך סובל או סבלת בעבר מכיב בקיבה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בבקלוסל, ספר לרופא אם:

- היה לך שבץ.
- הינך סובל מאפילפסיה.
- הינך סובל ממחלת נפש כלשהי.
- יש לך מחלת פרקינסון.
- הינך מטופל נגד יתר לחץ דם.
- הינך סובל ממחלת כליות, כבד או ריאות.
- יש לך סוכרת.

יש לך קשיים במתן שתן.

- הינך בהריון או מניקה (ראי סעיף 2 "הריון והנקה").

- יש לך היסטוריה של התמכרות או תלות בתרופה.

אם אחד או יותר ממקרים אלו חלים עליך, יש ליידע את הרופא או הרוקח לפני נטילת **בקלוסל**, מכיוון שייכתן **שבקלוסל** אינו מתאים לך.

שימוש בילדים ובמתבגרים

בקלוסל אינו מיועד לילדים מתחת למשקל של 33 ק"ג.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם וטופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

תרופות אחרות להרפיית שרירים, לדוגמה טיאנידין.

תרופות המשמשות לטיפול בהפרעות במצב הרוח כגון ליתיום או תרופות נוגדות דיכאון טריציקליות כגון אמיתריפטילין.

תרופות המורידות לחץ דם כולל תרופות המשמשות לטיפול ביתר לחץ דם כגון דיילטאם.

תרופות אחרות אשר משפיעות על הכליות כגון איבופרופן.

תרופות לטיפול במחל פרקינסון כגון לבדופה או קרבידופה.

תרופות המאטות את המערכת העצבית לדוגמה אנטיהיסטימיים כגון פרומתאזין, תרופות להרגעה כגון טמאזאפם, אופיאטים ולקחת כאב כגון מורפין ונוגדי עוויתות (תרופות לאפילפסיה כגון קארבאמאזפין).

שימוש בתרופה ומזון

יש ליטול **בקלוסל** במהלך הארוחה עם מעט נוזלים.

הריון והנקה

יש להתייעץ עם הרופא אם הרוקח לפני נטילת כל תרופה שהיא.

אין להשתמש **בבקלוסל** במהלך הריון, אלא אם הרופא מייצע לך לעשות זאת. ידעי את הרופא אם את בהריון או מתכננת הריון. אם עלייך ליטול **בקלוסל** במהלך הריון, גם העבר יתייץ לטיפול **בקלוסל**. לאחר הלידה ייתכן שהייו לתינוק תסמיני גמילה כגון פרנסום (תסמיני גמילה מתוארים בסעיף "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה").

רק כמות מעטה של **בקלוסל** עוברת לחלב אם. הרופא שלך ידון איתך האם תוכלי להניק במהלך הטיפול **בבקלוסל**.

נהיגה ושימוש במכוונת

מטופלים מסוימים עשויים להרגיש ישנוניות ו/או סחרחורת, או הפרעות בראייה בזמן נטילת **בקלוסל**. אם זה קורה לך, אין לנהוג ברכב, או

לבצע דברים הדורשים ממך להיות ערני (כגון תפעול מכשור או מכוונת) עד אשר השפעות אלו יחלפו.

באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

אזהרות מיוחדות

- יש להזהר בעת נטילת משקאות אלכוהוליים – הם עלולים להשפיע עליך יותר מהרגיל.

יש אנשים מבין המטופלים בבקלפון שיש להם מחשבות לפגוע או להרוג את עצמם או ניסו להרוג את עצמם. לרוב האנשים הללו היה גם דיכאון, הם השתמשו באלכוהול בצורה מוגזמת או היו מיועזץ על מחשבות על התאבדות. אם יש לך מחשבות לפגוע בעצמך או מחשבות אובדניות בכל עת, דבר מייד עם הרופא או פנה לבית חולים. כמו כן, בקש מקרב משפחה או חבר קרוב שיגיד לך אם הם מודאגים מכל שינוי שחל בהתנהגותך ובקש מהם לקרוא את העלון הזה.

ייתכן והרופא ירצה לערוך לך בדיקות תקופתיות בזמן נטילת **בקלוסל**.

אם הינך עומד לעבור ניתוח כלשהו, יש ליידע את הרופא שהינך נוטל **בקלוסל**.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. הרופא יאמר לך כמה טבליות **בקלוסל** לקחת בדיוק. הרופא עשוי להעלות או להוריד את מינון התרופה בהתאם לתגובתך לטיפול.

המינון של **בקלוסל** תלוי בתגובת המטופל לתרופה. עליך להתחיל במינון נמוך ולהעלות את המינון בהדרגה במהלך מספר ימים תחת פיקוח רפואי, עד שמגיעים למינון שמתאים עבורך. הרופא יאמר לך מתי עליך ליטול את התרופה.

אופן השימוש

יש ליטול את התרופה עם ארוחה ולבלוע את התרופה עם מעט נוזלים כמו משקה חלב.

אם אתה חש בחילה לאחר נטילת **בקלוסל**, נטילה עם ארוחה או משקה חלבי עשויה לעזור. במידת הצורך ניתן לחצות את הטבליה לשימוש מייד. אין מידע לגביי כתישה או לעיסה של הטבליה. נטילת **בקלוסל** באותו הזמן בכל יום תעזור לך ליכרו מתי ליטול את התרופה.

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

מבוגרים

המינון המקובל הינו 20 מ"ג (2 כדורים של

בקלוסל 10) שלוש פעמים ביום.

המינון המקסימלי הינו 100 מ"ג ליום, פרט לחולים המאושפזים, שם ייתכן ויירשם מינון גבוה יותר.

ילדים

המינון בילדים מחושב לפי משקל הגוף.

מטופלים עם מחלות כליה

מטופלים עם מחלות כליה בדרך כלל יקבלו מינון נמוך משמעותית של התרופה, על פי החלטת הרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עליך לדווח מייד לרופא.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא ארזית התרופה איתך. תסמינים של מנת יתר הינם: טינטון באוזניים.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אין להפסיק בפתאומיות את נטילת **בקלוסל**. טרם ההפסקה יש לדון עם הרופא או הרוקח. אם הרופא יחליט להפסיק את הטיפול בתרופה **בקלוסל**, המנה תופחת בהדרגה כדי למנוע תסמיני גמילה כמו התכווצויות שרירים וקשיין מוגבר של שרירים, טנוס שרירים גבוה, קצב לב מהיר, חום, בלבול, הזיות, שינויים במצב הרוח והרגש, הפרעות נפשיות, תחושת רדיפה או עוויתות.

אין ליטול תרופות בחושרן! בדוק תוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש **בבקלוסל** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות הלוואי הרשומות מטה דווחו:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביותר משתמש 1 מתוך 10):

- עייפות.
- ישנוניות.
- בחילות.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות בעד משתמש 1 מתוך 10):

- חולשה מוגברת בגפיים או תחושת עייפות ותשישות, כאב בשרירים.
- כאב ראש, סחרחורת או תחושת סחרור.
- קשיי נשימה.

• חוסר יכולת לישון.

• תנודות במצב הרוח, בלבול, הזיות או סיוטי לילה.

• יובש בפה.

• בעיות בעיניים.

• חוסר יציבות, רעד או בעיות אחרות בשליטת שרירים.

• לחץ דם נמוך (התעלפות).

• הפרעות במערכת העיכול: בעיות בקיבה הכחולות רצון להקאה; הקאה; עצירות; שלשול.

• הזעה מוגברת, פריחה.

• מתן שתן רב מהרגיל או כאב בעת מתן שתן.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות בעד משתמש 1 מתוך 1,000):

- עקצוץ או חוסר תחושה של כפות הידיים ו/או כפות הרגליים.
- התכווצות שרירים מוגברת.
- הפרעות בחוש הטעם.
- דיבור משובש או איטי.
- כאב בטן.
- בעיות בכבד.
- קושי במתן שתן.

• בעיות מין אצל הגבר, לדוגמה אין אונות (אימפוטנציה).

• עוויתות (במיוחד בחולי אפילפסיה).

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש 1 מתוך 10,000):

• היפותרמיה (חום גוף נמוך).

תופעות לוואי נוספות (בשכיחות שאינה ידועה):

• פריחה בולטת על העור ומגדרת (אורטיקריה – ידוע גם כסרפדת או חרלת).

• דופק איטי.

• עלייה ברמת הסוכר בדם.

• קשיי נשימה במהלך השינה (תסמונת דום נשימה בשינה).

• נפיחות במפרק הקרסול, כפות רגליים או רגליים תחנותות.

• נפיחות בפנים.

• תגובה אלרגית (רגישות יתר).

• נשירת שיער.

• קשיים בתפקוד מיני.

• תסמיני גמילה הנגרמים בשל הפסקה מיידית של התרופה (ראה סעיף 3 "אם אתה מפסיק בחילות").

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מהמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח בחברת "אוניפארם בע"מ".

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייהם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-25°C ובמקום מוגן מאור.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose; Maize starch; Povidone; Magnesium stearate.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
בקלוסל ארוז בתוך מגשיות (בליסט) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון.

בכל אריזה של **בקלוסל** יש 50, 60, 100 או 1,000 טבליות.

ייתכן ולא כל גדלי האריזה משווקים.

בקלוסל 10 הן טבליות עגולות קמורות, בעלות קו חצייה מצידן האחד וצבען לבן.

בקלוסל 25 הן טבליות עגולות שטוחות, בעלות קו חצייה מצידן האחד וצבען לבן.

שם בעל הרישום וכתובתו: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 16545 ת"א, 016401.

שם היצרן וכתובתו: אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה "מבוא כרמל".

נערך ביולי 2024.

מספר הרישום של התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:

בקלוסל 10: 046 07 23779 02

בקלוסל 25: 045 34 23780 04

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.