

ترديفرون™ 80 ملخ أقراص

المواد الفعالة - يحتوي كل قرص مطلي على:

حديد 80 ملخ (كـ كربيرات حديد مجففة 247.25 ملخ).

Ferrous iron 80 mg (as ferrous sulfate dried 247.25 mg).

المواد غير الفعالة وموارد الحساسية في المستحضر: انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرء الفحارة تمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

على تناول المستحضر حسب التعليمات في الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء".

استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت ملامات المرض (الأعراض) أو لم تتحسن.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

منع وعلاج نقص الدم الناتج عن نقص الحديد.

الفصيلة العلاجية: من مستحضرات الحديد لعلاج فقر الدم.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كانت حساساً (الergicy) لل المادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (للحصول على معلومات إضافية الرجاء أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

• وجد في جسمك حديد أكثر مما أنه بحاجته.

• كنت تعاني من فقر الدم (كيمية غير كافية من خلايا الدم الحمراء) غير مرتبطة بنقص الحديد الذي يؤدي إلى فرف حل الحديد (مثل، ثالسيمية، فقر الدم المقاوم أو فقر الدم الانتسجي).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل الملاجء بترديفرون أخذ الطبيب أو الصيدلي إذا:

• إذا كنت تتناول تريدينرون بسبب نقص الحديد، فيجب التتحقق من سبب نقص الحديد ليتسنى علاجه.

• إذا كان نقص الحديد مرتبط بمرض إلتهابي، فإن العلاج بـ تريدينرون لن يكون ناجماً.

• بسبب حشوة حوث تقرحات في الفم وتلوث الأسنان فلا يجوز مضغ الأقراص، مفعهاً أو إيقافها داخل الفم. يجب بلع القرص بأكمله مع الماء، إذا لم يكن قادرًا على اتباع هذه التعليمات أو إذا كنت تواجه صعوبة في البلع، استشر طبيب.

• كانت لديك صعوبات في البلع.

• وفقًا للمعلومات الواردة في المراعي، بلغ عن حالات نادرة لتفريق لون جدران المعدة والماسالك الهضمية (فنلن: melanosis) لدى المعالجين المسئلين الذين يتناولون أدوية من مرض طولي، ومكمل الحديد لعلاج فقر الدم لديهم. هذا التعلم قد يعرقل العلاج هذه الأمراض ومكمل الحديد لعلاج فقر الدم لديهم. هذه الجرونة، العمليات الجراحية في الجهاز الهضمي وهذا يجب أخذة بالحسبان، خاصة إذا كان إلحاد الطبيب العاجز بذلك تناول مكمل الحديد بالتزامن مع ذلك (أنظر الفقرة 4 "عرض إضافية").

خلال أو بعد العلاج الخاص بك، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي فوراً:

• إذا تم استنشاق الدواء بالخطأ (توقف "غير المسلط الخطأ")، فهو قد يدخل عبر المسالك التنفسية لديك. إذا لمس الدواء الطرق التنفسية، قد يؤدي ذلك إلى جرعة مثلاً نحو (موت السحيق) أو الإلهاق القصبات الهوائية (ماناطق غير منها الهواء عبر الرئتين) أو المريء (الأخيوبي الذي يربط الماء بال沐دة). هذه الجرونة قد تؤدي إلى تضيق القصبات الهوائية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى سعال متواصل.

سعال دموي و/أو شعور بضيق في التنفس، حتى ولو تم الإستنشاق عدة أيام أو أشهر قبل ظهور هذه الأعراض.

• إذا دخل الدواء إلى المسالك التنفسية ولديك واحد أو أكثر من تلك العلامات، توجه في أسرع وقت ممكن إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ القريبة ليقوم شخص متخصص بتقدير حالتك، من أجل التأكد من عدم حدوث اصابة في المسالك التنفسية.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، اخذ الطبيب أو الصيدلي عن ذلك:

إذا كنت تتناول حالياً بأدوية التالية، فلا تتناول تريدينرون، إلا أوصاً طبيب بذلك. بعض الأدوية لا يمكن تناولها في نفس الوقت، بينما أدوية أخرى تحتاج إلى ملاممات معينة (مثل، أوقات تناول منفصلة).

إذا كنت تستعمل أدوية التي تُعطى عن طريق الحقن وتحتوى على حديد، فعليك الانتباه من تناول تريدينرون.

يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بين تناول تريدينرون وتناول الأدوية التالية:

• مضادات حيوية من فصائل معينة (سيكلاتين أو فلوروكينولونات)

• أدوية لعلاج الإيدز/HIV (مثبطات إنتردان، بيكتيرجاينير)

• أدوية لعلاج هشاشة العظام (يسوفوسفونات)

• أدوية لعلاج أمراض المفاصل، مرض ويسون أو لمنع الحصى في الكلى (پينسيلامين، تريثينين)

• مستحضرات لعلاج نسب الحديد المحسضة العالمية في المعدة: مستحضرات معdenine

لجهاز الهضم أو مضادات الحموضة (أملاح الألومينيوم، الكالسيوم والمغنيزيوم)

• أدوية لعلاج مرض الغدة الدرقية (тирوكسين)

• أدوية لعلاج مرض پاركينسون (إنتاكابون، مينيل دوبا، ليفودوبا)

• أدوية أو منتجات تحتوي على الزنك، الكالسيوم أو الستروناسيوم

• أدوية لعلاج التلوث المزمن في المسالك البولية (حمض الأسيتوهيدروكساميك).

استعمال الدواء والطعام

يُنصح بتناول الدواء قبل الوجبة أو مع الوجبة، اعتماداً على تحمل الجهاز الهضمي.

لا يجوز شرب كميات كبيرة من الشاي، القهوة أو النبيذ الأحمر لأن ذلك قد يقلل من امتصاص الحديد في جسمك.

لا يوصي بتناول هذه الدوائرة في نفس الوقت مع الحبوب الكاملة (الألياف، البقوليات،

البذور النباتية)، بروتينات معينة (البيض) أو أغذية أو مشروبات تحتوي على الكالسيوم (الجبن، الحليب وما شابه). يجب ترك فاصل زمني قدره ساعتين على الأقل بين تناول أدواء الحديد وهذه المأكولات.

الحمل والرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تظنين بأنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، فيجب

استشارة طبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

المعلومات المتوفرة عن استهلاك الحديد خلال الثلث الأول من الحمل هي محدودة،

لكن يتوفر عدد كبير من المعلومات البي bliogرافية عن النساء في الثلث الثاني والثالث من الحمل، حيث أشارت شهادات لخطورة حدوث عيوب أو سمية للجنين

و/أو حدوث الولادة.

نتيجة لذلك، بالإمكان إستعمال تريدينرون خلال الحمل وفقاً للحاجة. بالإمكان

استعمال هذا الدواء من قبل النساء المرضعات.

السياسة وإستعمال الماكولات

من غير المحتل أن يكون لإستعمال تريدينرون تأثير على القدرة على السيادة أو

على إستعمال الماكولات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي تريدينرون على أقل من 1 ملليمول من الصوديوم (23 ملخ) في القرص، وبالتالي يعتبر خالٍ من الصوديوم.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً من المقدار الموصى

ومن طريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي الإعتدائي عادة في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

لعلاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى البالغين: عادة قرص واحد في اليوم.

لمنع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى النساء الحوامل: عادة قرص 1 في اليوم أو قرص 1 كل يومين خلال الثلاثين الأخيرين من الحمل (أي من الشهر الرابع

فما فوقاً)، وفقاً لتقدير الطبيب. يجب إستعمال هذا الدواء فقط خلال الفترة التي

حدّدت من قبل الطبيب المعالج.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

طريقة التناول

يجب بلع القرص بأكمله مع الماء.

السحق/الشطر/المضخ: لا يجوز مضغ، مضخ أو إبقاء القرص داخل الفم.

لا يجوز سحق/شطر/مضخ القرص بسبب خطورة حدوث تقرحات في الفم وتلوث الأستان.

- تغيرات في لون الأسنان (خلل تصبيح الأسنان) **
 - تقرحات في الفم *
 - آفات في المريء (اصابة/تقرح في المريء) *
 - نخر في خلايا أو نسيج الرئة *
 - إنتهاء تسريح الرئتين *(pulmonary necrosis)
 - تصييف في المسالك التنفسية *(bronchial stenosis)
 - تقرحات في الحنجرة (تقرح في البليوم) *
 - تقرحات في المريء *
 - تغيرات في لون جدار المعدة المسالك المعاوية (تلع المسالك الهضمية) (أنظر الفقرة 2)
 - التهاب مزمن في مخاطية المعدة (التهاب المعدة التاکي)
 - جرح عميق في مخاطية المعدة (قرحة نازفة في المعدة)
 - نزف من جرح عميق في جدار المعدة (قرحة نازفة في المعدة) قد يكون جميع المتتعالجين، وخاصة المسنين والمتأتلجين الذين يعانون من صعوبة في البلع، معربين عن خطورة الإصابة بقرحة في الحنجرة أو في المريء (الأتبور الذي يربط الفم بالمعدة). إذا دخل القرص في المسالك التنفسية، فهناك خطرة لحدوث تقرح في الشعب الهوائية (الممرات الهوائية الرئيسية في الرئتين)، والذي قد يؤدي إلى تضييق القصبات الهوائية.
 - بسبب التناول الخاطئ، عندما يتم وضع الأغذية، منها أو إيقانها داخل الفم.
 - إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعانى من عرض جانبى لم يذكر في هذه الشارة، عليك استشارة الطبيب.
- التقليل عن أعراض جانبية**
- بإمكانك تقليل عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة المصطف على الرابط [تبليغ عن أعراض جانبية علاج دوائي] الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى المونوج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الرابط:
- <https://sideeffects.health.gov.il>
- بالإضافة لذلك، بإمكانك تبلغ شركة پاداچيس بواسطة العنوان التالي: Padagis.co.il

5. كيفية تخزين الدواء

- يجب التسليم بحفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أىي ومحال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي اصطيهان بالتسنم. لا تسبب التسنم بدورها تعليمات صرافية من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة واللوحة (بليستر). يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين الدواء في درجة حرارة دون 30 درجة مئوية.
- لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو للقمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تجد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Core: Cellulose microcrystalline, maltodextrin, ammonio methacrylate copolymer type B, glycerol dibehenate, talc, ammonio methacrylate copolymer type A, triethylcitrate.
Film coating: Sepifilm LP010, titanium dioxide, triethylcitrate, red iron oxide, yellow iron oxide.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
قرص مطلي دائري بلون وردي مائل للبرتقالي.
في الخليبة 30 قرصاً مطلياً.

صاحب الإمتياز والمستورد: وكالات پاداچيس إسرائيل. م.ض، شارع راكيفيت 1، شوهام.

تم إعدادها في نيسان 2024.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 13566.31400 من أجل سهولة وسهولة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

يجب تناول كأس مليئة بالماء، يفضل قبل وجبات الطعام أو خلال وجبات الطعام (عدا مع أغذية معينة مخصصة في فقرة "استعمال الدواء والطعام") كآخر متعلق بتحمّل الجهاز الهضمي.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

الأعراض لجرعة مفرطة من الجديد تشمل العلامات التالية:

- تهيج شديد في الجهاز الهضمي والذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث نخر في نسيج الجهاز الهضمي (necrosis) (نخر) في الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي).
- الأعراض الرئيسية هي: ألم في البطن، غثيان، تقيؤات (تضارق مع دم أحياناً) وأسهال (مع براز أسود اللون أحياناً).
- يمكن أن يكون متراافق مع حفاض استقلابي وسدمة. الأعراض الرئيسية هي: تنفس سريع أو ضيق في النتنفس، إرتفاع في نظم القلب، صداع، إرثاب، شعور بالغثاء، إرهاق، فقدان الشهية، ألم في البطن، تقيؤات وانخفاض سرعت في ضغط الدم والذي يمكن أن يتضطر إلى فقدان الوعي مع تشنجات (غيبوبة شنجية).
- علامات أخلل في الأداء الظيفي للكل (اختصاص كبير في جسم البول) والكليد (الالم في الجانب الأيمن العلوي، إصفرار الجلد أو العينين وبول داكن). يمكن أن تحدث عاقب طولية المدى في الجهاز الهضمي مع تصييف مسالك الجهاز الهضمي (stenosis) (وذلك يمكن أن يتضمن وجود غثيان، نفخة، إمساك وإنفاس البططن).

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، فتووجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر محله عليه الدواء.

إذا تناول الدواء في الموعود المطلوب، فقم بتناوله فور تذكر ذلك. مع

ذلك، إذا حان تقريرياً موعد تناول الجرعة التالية، فلا تناول الجرعة المنسية: قم بتناول الجرعة الثانية فقط في الموعود المعتاد. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة المنسية.

إذا توقفت عن تناول الدواء

قد تحدث مشاكل بعد التوقف عن العلاج.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، فتوجه للطبيب أو للصيدلي.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، وضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر لذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، فاستشر الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تريفيرون قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدشن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاين أي منها.

أعراض جانبية شائعة (common) - ظهر لدى 10-100 مستعملين من بين 100

- إمساك
- إسهال
- إنفاس في البطن (نفخة في البطن)
- ألم مطن
- لون غير طبيعي للبراز
- غثيان

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - ظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

- إنفاس غير سليم (dyspepsia)
- عسر هضم
- تقيؤات
- إنفاس مخاطية المعدة (gastritis)
- حكة

• ظهور مفاجأة لإحمرار في الجلد (الطفح الحمامي)

أعراض جانبية ذات شروع غير معروف (أعراض لم يحدد شروعها بعد)

- رد فعل تحسسي (حساسية مفرطة)
- ظهور طفح متراافق مع حكة (urticaria) [شرى]