



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

برِچابالين دِكسل 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 ملغ, كبسولات

كل كبسولة تحتوي على برِچابالين (Pregabalin) 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 أو 300 ملغ على التوالي.

المواد غير الفعّالة وموُلدات الحساسية في الدواء – أنظر البند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وُصف للعلاج لأجلك، لا تعطه إلى آخرين، فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن حالتهم الصحية مماثلة.

هذا الدواء غير مُخصص لعلاج الأطفال والمراهقين تحت جيل 18 سنة.

1. لأي غرض مُخصص الدواء؟

لعلاج ألم ناتج عن اغتلال عصبي لدى البالغين، لعلاج ألم عضلي ليفي (فيبروميالجيا-Fibromyalgia) ولعلاج اضطراب القلق المتعمم لدى البالغين.

الفصيلة العلاجية: مُضاهي حَمْض غامًا-أمينو بُوتيريك (gamma-aminobutyric acid).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أرجي) للمادة الفعّالة (برِچابالين) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (أنظر البند 6).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

توجه لطبيبك قبل تناول برِچابالين.

- جزء من المرضى الذين يتناولون برِچابالين أبلغوا عن أعراض حساسية. هذه الأعراض تشمل إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان والبلعوم وأيضًا طفح جلدي متفشي. إذا كنت تتعرض لواحد أو أكثر من هذه الأعراض، عليك التوجه فورًا للطبيب.
- تم الإبلاغ عن طفح جلدي خطير، مثل متلازمة ستيفنز جونسون ونخر البشرة السمي، مع استعمال برِچابالين. يجب عليك التوقف عن استعمال الدواء والاتصال بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من الأعراض المرتبطة بالأعراض الجلدية الوخيمة الموصوفة في بند 4.
- قد يؤدي الدواء لدوخة ولثعاس، بحيث أن المرضى البالغين الذين يتناولون الدواء هم باختطار (احتمال الخطر) عالي للسقوط وللإصابات. يجب إتخاذ الحذر حتى تعتاد على تأثير الدواء عليك.
- قد يؤدي الدواء لضبابية أو فقدان رؤية أو تغيرات أخرى في الرؤية، التي تنقضي بمعظمها. يجب إعلام الطبيب فورًا عن كل تغيير الذي طرأ على الرؤية.
- لدى مرضى سكري معينين، الذين يزدادون في الوزن خلال العلاج بالدواء، قد تكون هنالك حاجة لملائمة جرعة الأدوية لتخفيض مستوى السكر في الدم.
- أعراض جانبية معينة، مثل ثعاس، قد تكون منتشرة أكثر، لأن المرضى ذوي إصابة بالعمود الفقري قد يتناولون أدوية إضافية لعلاج الألم والشئاج، التي لها أعراض جانبية مشابهة لتلك التي للبرِچابالين ووخامتها قد تزداد عندما يتم تناولها سوياً.
- لدى عدد من المرضى الذين تناولوا برِچابالين تم التبليغ عن فشل قلبي، بالأساس لدى البالغين ذوي أمراض قلب وأوعية الدم. قبل البدء باستعمال الدواء، يجب إعلام الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض قلب.
- هنالك عدد من التبليغات عن فشل كلوي على خلفية علاج ببرِچابالين. إذا لاحظت خلال العلاج بالدواء قلة في التبول، يجب التبليغ عن ذلك للطبيب، لأن إيقاف العلاج الدوائي قد يؤدي لتحسن.
- لدى مرضى معينين، الذين تم علاجهم بأدوية المضادة للصرع مثل برِچابالين، تم التبليغ عن أفكار لإيذاء النفس وأفكار انتحارية أو أظهروا سلوك انتحاري. في حال ظهور أفكار أو سلوك من هذا النوع في أي مرحلة، يجب التوجه للطبيب فورًا.

- دمج بيرجابالين مع أدوية أخرى التي قد تسبب الإمساك (مثل انواع معينة من مسكنات الألم), قد يؤدي لمشاكل في الجهاز الهضمي (مثل: إمساك, إندساد أو شلل الأمعاء). يجب إعلام الطبيب إذا كنت تعاني من إمساك, خصوصاً إذا وجد ميول لإمساك.
- قبل البدء باستعمال الدواء, يجب إعلام الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من تعلق أو إدمان على مشروبات كحولية, على مخدرات أو على أدوية أيًا كانت. في حالة كهذه يمكن أن يكون لديك احتمال أعلى لتطوير تعلق ببيرجابالين.
- خلال استعمال الدواء أو فوراً بعد إيقافه قد تظهر تشنجات. يجب إعلام الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من تشنجات.
- لدى عدد من المرضى ذوي خلفية أمراض إضافية تم التبليغ عن انخفاض في وظيفة الدماغ (اعتلال دماغي). يجب إعلام الطبيب إذا غُلم وجود وضع طبي له تداعيات جدية, بما في ذلك أمراض كبد أو كلية.
- كان هناك بلاغات عن صعوبات تنفس. إذا كانت لديك اضطرابات في الجهاز العصبي, اضطرابات تنفس, خلل كلوي أو أنك فوق عمر 65, من الممكن أن يصف لك الطبيب نظام جرعة آخر. استشر الطبيب إذا كان لديك صعوبة في التنفس أو تنفس سطحي.

تعلق

يُطور بعض الأشخاص تعلقاً ببيرجابالين (حاجة للاستمرار في تناول الدواء). قد تتطور لديهم أعراض انسحاب عند التوقف عن استعمال بيرجابالين (انظر البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟" و- "إذا توقفت عن تناول الدواء"). إذا كان هناك خوف أنك قد تطور تعلقاً ببيرجابالين, من المهم أن تستشير الطبيب.

إذا لاحظت أيًا من العلامات التالية أثناء تناولك بيرجابالين, فقد تكون هذه علامة بأنك طوّرت تعلقاً:

- تحتاج إلى تناول الدواء لفترة أطول من الوقت الذي تم وصفه لك
- تشعر بأنك بحاجة إلى تناول أكثر من الجرعة الموصوفة لك
- تستعمل الدواء لأسباب غير تلك التي وصف لك من أجلها
- كانت لديك محاولات متكررة وغير ناجحة للتوقف عن استعمال الدواء أو التحكم في استعماله
- عندما تتوقف عن تناول الدواء تشعر بتوَعك, وتشعر بشكل أفضل بعد تناول الدواء مرة أخرى.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات, توجّه إلى الطبيب واستشره بخصوص العلاج الأفضل لأجلك, بما في ذلك متى تتوقف عن تناول الدواء وكيفية القيام بذلك بأمان.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت مؤخرًا أدوية أخرى, بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية, أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. على وجه الخصوص إذا كنت تأخذ:

للبرجابالين ولأدوية معينة أخرى قد تكون هناك تأثيرات متبادلة على الفعالية. إذا تم أخذ بيرجابالين بالتوازي مع أدوية معينة ذات تأثيرات مهدئة (بما في ذلك أفيونات), بيرجابالين قد يزيد من هذه التأثيرات ويؤدي لفشل تنفسي, غيبوبة (coma) وللصحة. شدة الدوخة, النعاس والانخفاض في التركيز قد تزيد جميعها إذا تم أخذ بيرجابالين بالتوازي مع:

- أوكسيكودون – دواء لتسكين الألم
- لورازيبام – دواء لعلاج القلق
- كحول

يمكن تناول بيرجابالين مع حبوب منع الحمل.

استعمال الدواء والطعام

يجوز تناول الدواء مع أو بدون الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يجوز استهلاك الكحول خلال العلاج بالدواء.

الحمل, الإرضاع والخصوبة

لا يجوز استعمال بيرجابالين خلال الحمل أو فترة الإرضاع, إلا بتعليمات من الطبيب بعد استشارته. استعمال بيرجابالين خلال ال-3 أشهر الأولى من الحمل قد يسبب عيوب خلقية لدى الجنين التي تتطلب علاج طبي. في بحث الذي فحص معطيات من نساء من دول الشمال (النوردية) اللواتي تناولن بيرجابالين خلال ال-3 أشهر الأولى من الحمل, 6 رُضع من بين 100 عانوا من هذه العيوب الخلقية. هذا بالمقارنة مع 4 رُضع من بين 100 الذين ولدوا لنساء اللواتي لم يتعالجن ببيرجابالين في البحث. تم التبليغ عن شذوذ في الوجه (شقوق في الوجه والفم), في العينين, في الجهاز العصبي (بما في ذلك الدماغ), في الكلى وفي الأعضاء التناسلية.

النساء اللواتي قد يحملن خلال العلاج بالدواء مُلزمات باستعمال وسائل منع ناجعة. إذا كنتِ حاملاً أو مرضعةً، تعتقدين بأنك حاملٌ أو تخططين للحمل، فقمي باستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

السياقة واستعمال الآلات

لا يجوز السياقة أو تشغيل آلات خطرة حتى تعرف كيف يؤثر الدواء عليك، لأن استعمال هذا الدواء قد يسبب دوار، نُعاس أو انخفاض في التركيز.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

پرچابالین دیکسل 50 ملغ تحتوي على مادة Allura red AC (E129)، التي قد تسبب ردود فعل تحسسية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائماً وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بما يتعلق بالجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالدواء. الجرعة وطريقة العلاج يُحددان من قبل الطبيب فقط. لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تناول

يجب بلع الكبسولة بكاملها. لا توجد معلومات بخصوص فتح أو نثر محتوى الكبسولة، لأن تأثير نمط الإعطاء هذا لم يُفحص بعد. يجب بلع الدواء مع ماء.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى، قد تعاني من الأعراض التالية: نُعاس، إرتباك، عدم هدوء، نقص راحة. تم التبليغ أيضاً عن نوبات تشنجات وفقدان الوعي (غيبوبة). إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع ولد من الدواء بالخطأ، توجه فوراً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسييت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد،

من المهم تناول الدواء في كل يوم بساعة مُحددة. إذا نسييت تناول هذا الدواء في الوقت المُخصص، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. خذ الجرعة التالية في الوقت المُعتاد واستشر الطبيب.

يجب الاستمرار في العلاج حسب الموصى به من قبل الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

حتى إذا طرأ تحسن في وضعك الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب. إذا تم إقرار توقيف العلاج، فسوف يشرح لك الطبيب كيفية القيام بذلك. يجب أن يكون توقف العلاج بالدواء تدريجياً، لفترة أسبوع على الأقل.

بعد إيقاف العلاج بالدواء (سواءً إذا كان علاج طويل أو قصير الأمد) قد تتعرض لأعراض معينة تسمى أعراض انسحاب. تشمل هذه الأعراض: أرق، آلام رأس، غثيان، قلق، اسهال، أعراض شبيهة بالزكام، تشنجات، عصبية، إكتئاب، أفكار لإلحاق الضرر بنفسك أو للإنتحار، الآم، تعرّق ودوخة. كلما تم تناول الدواء لفترة زمنية أطول، قد تكون هذه الأعراض متواترة ووخيمة أكثر. إذا عايشت أعراض انسحاب، فيجب التوجه للطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المصلى والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع نظارات إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يسبب استعمال پرچابالین أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن أن لا تصاب بأية واحدة منها.

يجب التوجه فوراً للطبيب إذا كنت تعاني من انتفاخ في الوجه أو في اللسان أو من رد فعل جلدي وخيم (يحمّر الجلد ويتغطى بحويصلات أو يتقشر).

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين عشرة): دوار، شعور بالنعاس، آلام رأس.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 100):

- شهية زائدة.
- شعور بالنشوة، ارتباك، توهان، انخفاض في الرغبة الجنسية، عصبية.
- اضطراب في التركيز أو في الذاكرة، فقدان الذاكرة، خرق، ارتجاف، اضطراب في الكلام، شعور بوخز، خدر. سُكون، سبات، أرق، تعب، شعور غريب.
- ضبابية الرؤية، ازدواجية الرؤية.
- دوام، اضطراب في التوازن، سقوط.
- جفاف في الفم، إمساك، تقيؤات، غازات، إسهال، غثيان، بطن منتفخة.
- مشاكل انتصاب.
- انتفاخ الجسم، بما في ذلك الأطراف.
- شعور بالثمالة، نمط مشي شاذ.
- زيادة في الوزن.
- تشنجات عضلية، ألم مفاصل، آلام ظهر وأطراف.
- ألم حلق.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 1,000):

- فقدان شهية، انخفاض في الوزن، مستوى منخفض من السكر في الدم، ارتفاع في مستوى السكر بالدم.
- تغير بنظر الشخص لنفسه، عدم هدوء، اكتئاب، نقص راحة، تغيرات مزاج، صعوبة في إيجاد الكلمات، هذيان، أحلام غريبة، نوبات دُعر، لا مبالاة، عدائية، مزاج منتشي، اضطراب نفسي، صعوبة في التفكير، ازدياد في الرغبة الجنسية، مشاكل في الوظيفة الجنسية، بما في ذلك عدم القدرة للوصول للنشوة الجنسية، تأخير القذف.
- تغيرات في الرؤية بما في ذلك فقدان الرؤية المحيطية، رَأْة، ومضات ضوئية، حركات قفز، انخفاض يردود الفعل، نشاط، دوام عند الوقوف، حساسية جلدية، فقدان الطعم، شعور بحرق، ارتجاف في الحركة، انخفاض في مستوى الوعي، فقدان وعي، إغماء، حساسية زائدة للضجة، شعور بالمرض.
- عيون جافة، انتفاخ أو ألم في العين، ضعف عيني، عيون دامعة، تهيج بالعين.
- اضطراب في نظم القلب، نبض قلب زائد، ضغط دم منخفض أو مرتفع، تغيرات في النبض، فشل قلبي.
- توهج، موجات سخونة.
- صعوبة في التنفس، جفاف في الأنف، احتقان بالأنف.
- إنتاج ألعاب زائد، حرقة في المعدة، تخدير حول الفم.
- تعرق، طفح، قشعريرة، سخونة.
- تشنجات عضلات، انتفاخ في المفاصل، تصلب عضلات، ألم يشمل ألم عضلات، ألم رقبة.
- ألم في الثديين.
- صعوبة أو ألم عند التبول، سلس البول.
- ضعف، عطش، ضغط في الصدر.
- تغيرات في فحوص الدم ووظائف الكبد (ارتفاع في الكرياتينين فوسفوكيناز في الدم، ارتفاع في إنزيمات الكبد، انخفاض في الصفائح الدموية، قَلَّة العَدَلَات، ارتفاع في الكرياتينين في الدم، انخفاض البوتاسيوم في الدم).
- حساسية مفرطة، انتفاخ في الوجه، حكة، شرى، رشح، رُعاف (نزيف من الأنف)، سُعال، شخير.
- آلام في الدورة الشهرية.
- أيدي وأرجل باردة.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 10,000):

- حساسة شم شاذة، تموُّج بالرؤية، تغير في إدراك العمق، سطوع بالرؤية، فقدان رؤية.
- توسُّع الحدقتين، حَوْل.
- عرق بارد، شعور بتضيق بالحلق، لسان منتفخ.
- التهاب البنكرياس.
- صعوبة في البلع.
- حركة جسم بطيئة أكثر من المعتاد أو قليلة.
- صعوبة في الكتابة.
- وَدَمَات في منطقة البطن.
- سوائل في الرئتين.
- تشنجات.
- تغيرات في تخطيط القلب التي تُلائم اضطرابات نظم القلب.
- ضرر للعضل.
- إفراز من الثديين، تضخم ثديين شاذ، تضخم ثديين لدى الرجال.

- اضطرابات في الدورة الشهرية.
- فشل كلوي, انخفاض في حجم البول, احتباس بول.
- انخفاض في خلايا الدم البيضاء في فحص الدم.
- سلوك شاذ, سلوك انتحاري, أفكار انتحارية.
- ردود فعل تحسسية (قد تتمثل بصعوبات في التنفس, التهاب عيني [التهاب في القرنية] ورد فعل جلدي وخيم الذي يتميز ببقع مستديرة, لونها يميل للأحمر, غير مرتفعة في منطقة الجذع, والتي غالبًا ما تكون مصحوبة ببثور في مركزها, تقشر الجلد, تقرحات في الفم, في الحلق, في الأنف, في الأعضاء التناسلية وفي العينين). يمكن أن يكون لهذه الاعراض الجلدية الوخيمة أعراض مسبقة, مثل الحمى وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا (متلازمة ستيفنز جونسون, نخر البشرة السام).
- يرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين).
- باركنسونية, مما يعني أعراض مشابهة لمرض الباركنسون مثل: رعاش, بطء الحركة (انخفاض في القدرة على الحركة), وتصلب (تيبس العضلات).

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من بين 10,000):

- فشل كبدي.
- التهاب كبد فيروسي (hepatitis).

أعراض جانبية شائعة غير معروف (أعراض لم يحدّد إنتشارها بعد):

- تطوّر تعلق بيريجابالين
- بعد التوقف عن العلاج بيريجابالين (سواءً كان علاجًا للمدى القصير أو للمدى الطويل) فقد تعايش أعراضًا معينة تسمى أعراض الانسحاب (انظر البند 3 "إذا توقفت عن تناول الدواء").

أعراض جانبية معينة, مثل نعاس, قد تكون شائعة أكثر, لأن المرضى ذوي إصابة بالعمود الفقري قد يتناولون أدوية إضافية لعلاج الألم والتهنّاج, التي لها أعراض جانبية مشابهة لتلك التي للبريجابالين ووخامتها قد تزداد عندما يتم تناول هذه سوياً.

تم التبليغ عن الأعراض الجانبية التالية بعد تسويق الدواء: صعوبات في التنفس وتنفس سطحي.

إذا ظهر عرض جانبي, إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة, عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" الموجود في الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النموذج الإلكتروني للتبليغ عن أعراض جانبية, أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تاريخ انتهاء) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعّال يحتوي الدواء أيضًا على:

Gelatine, starch pregelatinized, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), printing ink: shellac (E904), propylene glycol (E1520), strong ammonia solution (E527), potassium hydroxide (E525), black iron oxide (E172).

كيسولات بيرجابالين دكسل 25 و - 50 ملغ تحتوي بالإضافة إلى ذلك: Mannitol.
كيسولات بيرجابالين دكسل 50 ملغ تحتوي بالإضافة إلى ذلك: Allura red AC (E129), brilliant blue FCF (E133).
كيسولات بيرجابالين دكسل 75, 100, 200, 225 و - 300 ملغ تحتوي بالإضافة إلى ذلك: Yellow iron oxide (E172), Red iron oxide (E172).
كيسولات بيرجابالين دكسل 75, 100 و - 300 ملغ تحتوي بالإضافة إلى ذلك: Black iron oxide (E172).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
پرچابالین دیکسل 25 ملغ: کبسولة بلون أبيض مطبوع عليها 'DP25'.
پرچابالین دیکسل 50 ملغ: کبسولة بلون أبيض ورمادي مطبوع عليها 'DP50'.
پرچابالین دیکسل 75 ملغ: کبسولة بلون أبيض وبني مطبوع عليها 'DP75'.
پرچابالین دیکسل 100 ملغ: کبسولة بلون بني مطبوع عليها 'DP100'.
پرچابالین دیکسل 150 ملغ: کبسولة بلون أبيض مطبوع عليها 'DP150'.
پرچابالین دیکسل 200 ملغ: کبسولة بلون برتقالي مطبوع عليها 'DP200'.
پرچابالین دیکسل 225 ملغ: کبسولة بلون برتقالي وأبيض مطبوع عليها 'DP225'.
پرچابالین دیکسل 300 ملغ: کبسولة بلون بني وأبيض مطبوع عليها 'DP300'.

حجم عبوة مُصادق عليه: 56 كبسولة.

تم تنقيحها في أيار 2024 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

پرچابالین دیکسل 25 ملغ: 158-72-34727-00
پرچابالین دیکسل 50 ملغ: 158-73-34728-00
پرچابالین دیکسل 75 ملغ: 158-74-34729-00
پرچابالین دیکسل 100 ملغ: 158-75-34730-00
پرچابالین دیکسل 150 ملغ: 158-76-34731-00
پرچابالین دیکسل 200 ملغ: 158-77-34732-00
پرچابالین دیکسل 225 ملغ: 158-78-34733-00
پرچابالین دیکسل 300 ملغ: 158-79-34695-00

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل: دیکسل م.ض، شارع دیکسل 1، أور عکیفا 3060000، إسرائيل.