

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

<b>كارين</b>	<b>كارين</b>
<b>250</b>	<b>250</b>
<b>أقراص</b>	<b>أقراص</b>
<b>مطلية</b>	<b>مطلية</b>

**التكوين:**

يحتوي كل قرص مطلي من كارين **250** على: كلاريثروميسين Clarithromycin 250 mg ملغ 250 يحتوي كل قرص مطلي من كارين **500** على: كلاريثروميسين Clarithromycin 500 mg ملغ 500

للقائمة المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. هو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص عادة للرضع دون عمر 6 أشهر أو للرضى المُعالجين بـ MAC دون عمر 20 شهراً.

**(1) لأي غرض مخصص الدواء؟**

لعلاج تلوذات الطرق التنفسية العلوية، الطرق التنفسية السفلية، تلوذات الجلد والأنسجة المخاطية الرخوة.

لعلاج تلوذات MAC (Mycobacterium Avium Complex) لدى مرضى الإيدز.

للعلاج المشترك مع أدوية من فصيلة مثبّطات مضخات الهروتون (PPI) لدى مرضى القرحة الهضمية النشطة المرتبطة بتلوذ هيليكوباكتر بيلوري.

يوقف هذا المضاد الحيوي تطوّر الجراثيم المسببة للتلوذات.

**الفصيلة العلاجية:**

مضاد حيوي من فصيلة الماكروليدات.

**(2) قبل إستعمال الدواء**

**لا يجوز إستعمال الدواء إذا:**

- كنت حساساً (ألرجي) لـ كلاريثروميسين، مضادات حيوية أخرى من فصيلة الماكروليدات أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

قد تؤثر أدوية معينة على نجاعة كارين أو العكس. هذه الأدوية تشمل:

**قد يزيد كارين من تأثير الأدوية التالية:**

- أستيميزول، تريفنادين (أدوية مضادة للحساسية)، - بيموزيد (دواء مضاد للذئبان)، سيسابريد ودومبيريدون (لعلاج إضطرابات في الجهاز الهضمي)، إرغوتامين، - ديهيدرو إرغوتامين (أدوية للشقيقة)، إبروتينيب (دواء لعلاج إبيضاض الدم الليمفاوي المزمن)، لوفاستاتين، سيمفاستاتين (أدوية لخفض نسب الكوليسترول في الدم)، تيكاجريلور (دواء لمنع الخثرات الدموية)، رانولازين (لعلاج الذبحة الصدرية)، كولشيسين (لعلاج النقرس [gout]) - أنظر الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا".

- نيكاجريلور (لمنع الخثرات الدموية). - رانولازين (لعلاج الذبحة الصدرية). - إيفابرادين (لنوبة قلبية، آلام في الصدر أو ذبحة صدرية). - إرغوتامين أو ديهيدرو إرغوتامين (أدوية لعلاج الشقيقة).

- سيسابريد ودومبيريدون (لإضطرابات في الجهاز الهضمي).

- بيموزيد (مضاد للذئبان).

- تريفنادين أو أستيميزول (حمى القش، مضاد للحساسية).

- لوفاستاتين، سيمفاستاتين (أدوية تُستعمل لخفض نسب الكوليسترول في الدم).

- سيكلوسبورين، سيرولييوس، تاكروليموس (مثبّطات جهاز المناعة).

- كاربامازيبين، فينيتوين، فالبروات (لعلاج الصرع).

- سيلوستازول (يُستعمل لتحسين الدورة الدموية في الرجلين).

- إنسولين وأدوية أخرى لعلاج السكري (مثل نيتاجلينيد، ريباجلينيد).

- ميتيل بريدنيزولون (كورتيكوستيرويد لعلاج الإلتهاب).

- أوميبرازول (دواء للمعدة).

- سيلدينافيل، تادالافيل، فاردنافيل (لعلاج العجز الجنسي).

- تولترودين (لعلاج متلازمة المثانة العصبية).

- فينبلاستين (لعلاج السرطان).

- أدوية ذات خطورة للتأثير على السمع، خاصة المضادات الحيوية من فصيلة أمينوجليكوزيدات مثل جنتاميسين أو نيوميسين.

هذه المعلومات أيضاً مهمة وذلك إذا كنت تتناول الأدوية التالية:

● هيدروكسيكلوروكوين أو كلوروكوين (لعلاج حالات تشمل إلتهاب المفاصل الروماتيزمي، أو للعلاج أو للوقاية من الملاريا). إن تناول هذه الأدوية بالتزامن مع كلاريثروميسين من شأنه أن يزيد من احتمالية حدوث شذوذ في نظم القلب وأعراض جانبية خطيرة أخرى التي تؤثر على قلبك.

● كورتيكوستيروئيدات، التي تؤخذ عن طريق الفم، بالحقن أو بالإستنشاق (تستعمل لتثبيت الجهاز المناعي - فعّالة في علاج طيف واسع من الحالات).

**أدوية، عند تناولها سوية مع كارين، تزيد من تأثير كارين وكذلك يزداد تأثيرها أيضاً:**

● أتازانافير، ساكونافير (أدوية لعلاج الإيدز).

● إيتراكونازول (دواء لعلاج الثوآل الفطري).

إذا أوصاك طبيبك بتناول كارين سوية مع إحدى الأدوية المذكورة أعلاه، فقد يحتاج طبيبك إلى إجراء مراقبة عن كثب.

**الأدوية التالية قد تضعف تأثير كارين:**

● ريفامبيسين، ريفابوتين، ريفانينتين (مضادات حيوية).

● إيفاقيرينز، إترافيرين، نيفيرابين (أدوية لعلاج الإيدز [HIV]).

● فينيتوين، كاربامازيبين، فينوباربيتال (لعلاج الصرع).

● هيبيريكوم (St. John's Wort).

**تلتفت إنتباهك**

● إن ريتونافير (مضاد للفيروسات) وفلوكونازول (دواء لعلاج الإلتهاب الفطري) قد يزيدان من تأثير كارين.

قد يضعف كارين من تأثير زيدوفودين (مضاد للفيروسات).

لمنع ذلك، يجب ترك فاصل زمني قدره 4 ساعات بين تناول هذه الأدوية.

● أن تناول كارين في نفس الوقت مع ديجوكسين، كينيدين، ديزوبيراميد أو فيراپاميل (أدوية للقلب) أو مضادات حيوية أخرى من فصيلة الماكروليدات قد يسبب إضطرابات في نظم القلب.

إستعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.

**الحمل، الإرضاع والخصوبة**

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدن أنك حامل أو تخططين للحمل إستشيري الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

لا تتوفر معلومات حول تأثير كلاريثروميسين على خصوبة الإنسان. لدى الجردان، لم تظهر الدراسات حول الخصوبة أي دليل على وجود تأثيرات ضارة.

**السياقة وإستعمال الماكينات**

بشكل عام، من غير المفترض أن يؤثر كارين على القدرة على السياقة أو إستعمال الماكينات ولكنه قد يسبب أعراضاً جانبية مثل دوار، إرتباك وتوهان.

إذا كان المستحضر يسبب لك هذه الأعراض، فلا يجوز السياقة، تشغيل الماكينات أو القيام بأي نشاط آخر يعرضك أنت أو من حولك للخطر. إن خلل في الرؤية وتشوش الرؤية قد يؤثران على قدرة المتعالج على السياقة أو تشغيل الماكينات.

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

يحتوي كارين على أقل من 1 ميليول (23 ملغ) من الصوديوم في القرص، مما يعني أن القرص عملياً يعتبر "خالياً من الصوديوم".

**(3) كيفية إستعمال الدواء؟**

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

**لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.**

يجب بلع القرص مع القليل من الماء.

إذا لزم الأمر يمكن شطر القرص للإستعمال الفوري. لا تتوفر معلومات حول سحق أو مضغ القرص.

**إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر**

من الجائز أن تشعر بأعراض جانبية مختلفة في الجهاز الهضمي مثل: إسهال، غثيان، تقيؤات وآلام في البطن.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معدل عبلة الدواء.

**إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك.** لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي فور تذكرك. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي. لا يجوز تناول كمية أكبر من الأقراص في اليوم مما أوصاك به الطبيب.

● إصفرار الجلد والعينين، غثيان، فقدان الشهية للطعام، بول داكن.

**أعراض جانبية خطيرة شيوعتها غير معروف (أعراض لم يتم تحديدها شيوعتها بعد):**

● إسهال، آلام في البطن، سخونة (علامات إلتهاب القولون).

● ألم حاد في البطن والظهر الناجم عن إلتهاب البنكرياس.

● تغير في كمية البول، نعاس، إرتباك وغثيان الناتج عن إلتهاب الكلى.

● طفح جلدي شديد أو مثير للحكة، خاصة إذا كان يتراقف بحويصلات ويظهر ألم في العينين، في الفم أو في الأعضاء التناسلية.

● كدمات أو أنزفة غير عادية ناجمة عن إنخفاض نسبة الصفائح الدموية.

● نظم قلب سريع أو غير منتظم.

● نزف شديد.

● تفكك غير سليم للنسيج العضلي مما يسبب آلاماً، سخونة، بول ذو لون أحمر - بني.

● إنخفاض شديد في نتاج البول.

● إلتهاب الجلد الفقاعي (dermatitis bullosa)، طفح، سخونة، تغيرات في الدم (التي قد تشير إلى متلازمة فرط الحساسية التي تسمى DRESS)، طفح أحمر، حرشفي مع نتوءات تحت الجلد وحويصلات (بثار طفحي حاد معمم - acute generalised exanthematous pustulosis).

كل هذه أعراض جانبية خطيرة. من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي طارئ.

**أعراض جانبية إضافية:**

أخير طبيبك إذا كانت إحدى الأعراض الجانبية التالية تزعجك.

**أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):**

● صعوبة في الخلود للنوم.

● صداع.

● تغير في حاسة التذوّق (على سبيل المثال طعم معدني أو طعم مر).

● ألم في البطن، غثيان أو تقيؤ، إسهال، صعوبات هضم، حرقان.

● نتائج غير سليمة لفحص وظائف الكبد.

● طفح.

● تعرّق متزايد.

● تمدد الأوعية الدموية.

**أعراض جانبية غير شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):**

● تساقط الشعر، ألم في الحنجرة أو تقرحات في الفم بسبب التلوذات (علامات لنسب منخفضة من خلايا الدم البيضاء).

● طفح، حكة، شرى، ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، صفير أو سعال، دوار، الشعور بدوخة، تغيرات في الوعي، ضغط دم منخفض مع أو بدون حكة عامة طفيفة، إحمرار في الجلد، إنتفاخ الوجه/الحنجرة، إزرقاق الشفتين، اللسان أو الجلد (علامات لرد فعل تحسسي شديد).

● عدم إنتظام نظم القلب (تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب).

● إنخفاض العدلات (قلة العدلات).

● فقدان أو تناقص الشهية للطعام.

● قلق.

● دوار، نعاس، إرتجاف، ميل للنوم، رجفان.

● حركات عضلات لاإرادية.

● خلل في السمع.

● شعور بدوخة.

● رنين في الأذنين (طنين).

● إلتهاب مخاطية المعدة، إسهال، غازات، جفاف في الفم، تجشؤ، إنتفاخ ونفخة في البطن.

● إرتفاع إنزيمات الكبد في الدم.

● شعور بالمرض، ضعف، إرهاق.

● ألم في الصدر.

● قشعريرة.

● تشنجات عضلية، ألم في العضلات أو فقدان النسيج العضلي. إذا كان طفلك يعاني من الوهن العضلي الوبيل (حالة تضعف فيها العضلات وتتعب بسهولة)، فإن العلاج بـ كارين قد يؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض.

● ألم في فتحة الشرج.

● ربو - مرض رئوي مرتبط بتضيّق الطرق الهوائية، مما يجعل التنفس صعباً.

● رعاف.

● خثرة دموية تسبب إندسداً مفاجئاً في الشريان الرئوي (انصمام رئوي).

● إرتفاع شاذ في نتائج فحص الدم لوظائف الكبد والكلى.

● نتائج شاذة لفحوص الدم - نسب مرتفعة للإنزيم المسمى ألكالين فوسفاتاز (alkaline phosphatase) في الدم، الذي يدل على صحة العظام في الجسم، أو نسب مرتفعة للإنزيم المسمى لاكتات ديهيدروجيناز (lactate dehydrogenase) في الدم، الذي يدل على صحة أعضاء معينة في الجسم.

**أعراض جانبية شيوعتها غير معروف (أعراض لم يتم تحديدها شيوعتها بعد):**

● كوابيس، توهان في الخلاء، إرتباك، هلوسة (رؤية أشياء غير موجودة)، نهان (فقدان الإتصال بالواقع)، الشعور بفقدان الهوية، هوس (الشعور بمزاج مرهف أو بفرط الإنفعال)، إكتئاب.

● إختلاجات، فقدان حاسة التذوق أو الشم، وخز وخدر في الجلد.

● تلوذات جرثومية معينة في الجلد والأنسجة الموجودة تحت الجلد.

● إضطراب في حاسة الشم، فقدان حاسة الشم أو حاسة التذوق.

● تغير لون اللسان، تغير لون الأسنان.

● نزف (hemorrhage).

● حبّ الشباب.

● ألم أو ضعف في العضلات.

● نتائج فحوص دم شاذة - وقت مطوّل لتخثر الدم.

● لون شاذ للبول.

● مشاكل في الرؤية (رؤية مشوّشة).

● خلل في الرؤية.

قد يؤثّر كارين على نتائج فحوص معينة. إذا كنت بحاجة للذهاب إلى المستشفى أو إلى الطبيب لإجراء فحوص دم، فمّن المهم أن تخبر الطبيب أو الممرضة أنك تتناول كارين.

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمّت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعانّي من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.**

**التبليغ عن أعراض جانبية**

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقيب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم.ص.ب.".

**(5) كيفية تخزين الدواء؟**

● تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

● يجب التخزين دون 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

**(6) معلومات إضافية**

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعّالة أيضاً على:

Microcrystalline Cellulose, Pregelatinized Starch, Carmellose Sodium LS, Povidone, Glyceril Behenate, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide, Opadry OY-6900 (pink).

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:**

● كارين مُعبأ ضمن لويحات (بليسترات) داخل عبلة كرتون.

في كل عبلة من كارين **250** يوجد 2، 10، 14، 20 أو 28 قرصاً.

في كل عبلة من كارين **500** يوجد 2، 1، 7، 10، 14، 21 أو 28 قرصاً.

من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العبء.

● كارين هي أقراص مطاولة، بيضاوية، مطلية، لونها وردي، مع خط للشطر من جانب واحد.

**إسم صاحب الإمتياز وعنوانه:** يونيفارم م.ص.ب. ص.ب. 16545، تل أبيب، 1616401.

**إسم المنتج وعنوانه:** يونيفارم م.ص.ب.، پارک الصناعة "مافو كرمل".

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

**كارين 250: 104 96 28719 01**

**كارين 500: 109 30 29343 01**

تم إعدادها في أيار 2024.

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة