

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986 يسلق الدواء بدون وصفة طبيية

كارتيا™

أقراص ذات تغليف معوي 100 ملغ

يحتوي كل قرص على:

حمض أسيتيل ساليسيليك 100 ملغ

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة تبمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

يُتوجب عليك تناول المستحضر بموجب تعليمات المقدار الدوائي في الفقرة 3. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص للمنع الأولي لمرض قلبي إكليلي لدى مرضى معرضين لخطورة عالية ولمنع الثانوي لأمراض القلب والدماغ الناتجين عن جلطة شريانية.

الفصيلة العلاجية: مضادات التخثر، مثبط تكسّس الصفائح الدموية.

يُبيّط كارتيا من تكسّس الصفائح الدموية وبذلك يمنع تشكل خثرات دموية.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

● كنت حساساً (أليرجي) لحمض أسيتيل ساليسيليك (المادة الفعالة). للسالييلات أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية") ● إذا كان لديك أية حالة مرضية مزمنة لأمراض الكلى، أمراض الكلى أو التهاب (سالييلات أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب لا ستيرويدية)، الذي يتجلى بنوبات متكررة من الربو أو ربود فعل تحسسية أخرى ● كنت تعاني من تقرحات ناجمة في المعدة أو في الأمعاء ● وجدت لديك قاطعة لحديث إصطرابات تؤدي إلى أنزفة ● كنت تعاني من قصور كلوي أو كبدي ● كنت تعاني من قصور قلبي حاد غير معالج كما ينبغي ● كنت تتناول بالآنزائم ميثوتريكسات بمقدار دوائي قدره 15 ملغ أو أكثر في الأسبوع ● كنت في الثلث الأخير من الحمل وتتناولين مقداراً دوائياً يومياً أعلى من 150 ملغ (أنظري فقرة "الحمل والإرضاع").

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج ب كارتيا، أخبر الطبيب إذا:

● كنت حساساً لأدوية أخرى مُسكّنة للألم، مضادات الالتهاب، مضادات الروماتيزم (antirheumatic) أو لمواد أخرى تسبب الحساسية ● كنت تتناول أيضاً أدوية مضادة للالتهاب لا ستيرويدية (NSAIDs)، مثل إيبيروفون أو نابروكسين (أدوية لعلاج الألم، السكتونة أو الالتهاب). أنظر الفقرة 2 "مستحضرات تضعف من تأثير الدواء" ● كنت تعاني من حساسيات أخرى (مع أعراض مثل أعراض جلدية، حكة أو شرى) ● كنت تعاني من الربو القصبي، وهي العلف (رشح تحسسي)، إنتفاخ مخاطية الأنف (زوائد أنفية) أو مرض تنفسي مزمن ● كنت تتعالج حالياً بمستحضرات مضادة للتخثر (مثل مشتقات الكومارين أو الهيبارين، عدا الهيبارين بمقدار دوائي منخفض) ● وجدت لديك سابقة لتقرحات في المعدة أو في الأمعاء أو سعال لزف في المعدة أو في الأمعاء ● كنت تعاني من خلل في الأداء الوظيفي للكبد ● كنت تعاني من خلل في الأداء الوظيفي الكلوي أو من تناول مضاد تدفق الدم في القلب وفي الأوعية الدموية (مثل مصل الأوعية الدموية في الكلى، قصور القلب، تناقص حجم الدم، عملية جراحية كبيرة، خمج دموي أو حوادث نزفية ذات أهمية)، وذلك لأن حمض أسيتيل ساليسيليك يمكن أن يزيد بشكل أكبر من خطورة تضرر الأداء الوظيفي الكلوي وحدثت قصور كلوي حاد ● كنت مقبلاً على إجراء عملية جراحية، بما في ذلك عملية جراحية بسيطة (على سبيل المثال، عملية جراحية لإقتلاع السن)؛ قد تحدث زيادة في قابلية حدوث نزف. أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان بأنك تتناول كارتيا ● كنت تعلم بوجود نقص في فيتامين B12 أو فيتامين C - 6 - فوسفات - ديهيدرو جيناز (G6PD) ● إن حمض أسيتيل ساليسيليك قد يؤدي سرعة تفكك أو إنحلال خلايا الدم الحمراء أو لنوع معين من فقر الدم. العوامل التي قد تزيد من الخطورة لذلك هي مثلاً: مقدار دوائي مرتفع، سخونة أو ثلوثات حادة.

تحذيرات إضافية

● في المقادير الدوائية المنخفضة، يقلل حمض أسيتيل ساليسيليك من طرح حمض البوليول. هذه الحالة قد تحدث على حدوث نوبة تفرس (gout) في ظروف معينة لدى مرضى لديهم ميل مُسبق لحدوث ذلك ● إذا جُرحت أو أصبت، فمن الجائز أن يستمر النزف لفترة أطول من المعتاد. يتعلّق الأمر بطريقة عمل الدواء. إن الجروح أو الإصابات الطفيفة (أثناء الحلاقة مثلاً) لا تشكل مشكلة عادة. في حال وجود نزف شاذ (في مكان غير معروف أو لفترة زمنية غير عادية)، إستشر الطبيب ● لا يجوز تناول أدوية تحتوي على حمض أسيتيل ساليسيليك لفترات طويلة أو بمقادير دوائية عالية دون إستشارة الطبيب.

الأطفال والمراهقون

الدواء مُخصص لل كبار فوق عمر 18 سنة. يجب التوجه إلى الطبيب لمن هم دون هذا العمر. لا يجوز إستعمال كارتيا لدى الأطفال أو المراهقين الذين يعانون من أمراض تراقافية ساخونة لا بتعليمات من الطبيب وبعد فشل وسائل علاج أخرى. إن التقيؤ المتواصل بمشاكرة مثل هذا المرض قد يشكّل علامة متلازمة راي، مرض نادر جداً لكنه يشكل خطراً على الحياة الذي يتطلب علاجاً طبياً فورياً.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

مستحضرات تزيد من تأثير الدواء لدرجة الخطورة لحدوث أعراض جانبية:

● أدوية مضادة لتخثر الدم (مثل كومارين، هيبارين) وأدوية حالة للخثرات الدموية: إن حمض أسيتيل ساليسيليك قد يزيد من خطورة حدوث نزف إذا تم تناوله قبل العلاج بأدوية حالة للخثرات الدموية. يجب الإنتباه لعلامات نزف خارجية وداخلية (كدماث مثلا) إذا كنت تتعالج بمثل هذا العلاج ● أدوية أخرى التي تثبط تكسس الصفائح الدموية (أدوية مثبطة لتكسّس الصفائح الدموية)، مثل تيكلوبيدين، كلويدوجريل: زيادة خطورة حدوث نزف ● أدوية التي تحتوي على كورتيزون أو مواد تشبه الكورتيزون (عدا تلك التي تستعمل للعلاج الموضعي أو العلاج ببدائل الكورتيزون لدى إيدس): تزيد خطورة حدوث نزف وتقرحات في المعدة وفي الأمعاء ● كحول: زيادة الخطورة لحدوث تقرحات ونزف في المعدة وفي الأمعاء

● أدوية أخرى مسكّنة للألام ومضادة للالتهاب (مضادات الالتهاب اللا ستيرويدية)، وأدوية مضادة للروماتيزم بمشاركة حمض أسيتيل ساليسيليك: زيادة خطورة حدوث تقرحات في الجهاز الهضمي وحدثت نزف ● أدوية لعلاج السكري، مثل إنسولين، تولبوتاميد، جليبينكلاميد (المسمى سولفونيل يوريا) بمشاكرة حمض أسيتيل الساليسيليك بمقادير دوائية مرتفعة: قد تتخفّف نسبة السكر في الدم ● ديجوكسين

(دواء يؤدي لزيادة شدة تقلص عضلة القلب) ● ميثوتريكسات (لعلاج السرطان وأمراض روماتيزمية معينة) ● حمض فالپروتيك (لعلاج الصرع) ● أدوية لعلاج الإكتئاب من نوع SSRIs: زيادة خطورة حدوث نزف في المعدة وفي الأمعاء.

مستحضرات تضعف من تأثير الدواء:

● أدوية معينة تزيد طرح البول (المدرات البولية: مضادات الالكدوستيرون، مثل سبيرونولكتون، كانبريوات، المدرات البولية العروية مثل فوروسيميد) ● أدوية معينة لعلاج فرط ضغط الدم (خاصة مضبوطات ACE) ● أدوية لعلاج التقرس (gout) التي تزيد من طرح حمض البول (مثل بروبنيسد، بنزبرومارون) ● بعض الأدوية المضادة للإلتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) (عدا حمض أسيتيل ساليسيليك)، مثل إيبيروفون ونابروكسن: إنخفاض في تأثير كارتيا على تثبيط تكسّس الصفائح الدموية والتخثر: قد يضيف من الوقاية التي يمنحها الدواء ضد النوبات القلبية والسكتة ● ميتامتازول (مستحضر مُعدّ لتخفيف الألم والحرارة): إنخفاض محتمل في تأثير حمض أسيتيل ساليسيليك على تكسّس الصفائح الدموية عند تناول كلا الدوائين معاً. لذلك، يجب إستعمال هذا المزيج بحذر لدى المتعالجين الذين يتناولون كارتيا بمقدار دوائي منخفض لحماية القلب.

قبل إستعمال حمض أسيتيل ساليسيليك، أطلع الطبيب على الأدوية الأخرى التي تتناولها. إذا كنت تستعمل حمض أسيتيل ساليسيليك بشكل دائم، إستشر الطبيب قبل تناول أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية.

لا يجوز تناول كارتيا سوية مع إحدى الأدوية التي ذكرت سابقاً بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يجوز إستهلاك الكحول خلال فترة العلاج بحمض أسيتيل ساليسيليك.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إذا كان لديك شك بأنك حامل، أو إذا كنت تخططين للحمل، فيجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال هذا الدواء.

الحمل

في الثلث الأول والثاني

لا يجوز تناول كارتيا في الثلث الأول والثاني من الحمل إلا عند الضرورة فقط بموجب تعليمات الطبيب. إذا كنت بحاجة إلى علاج خلال هذه الفترة أو أثناء محاولات الحمل، فيجب إستعمال أقل مقدار دوائي ممكن لأقصى وقت ممكن. بدءاً من الأسبوع 20 من الحمل، إذا كنت تتناولين كارتيا لأكثر من بضعة أيام، فمن الجائز أن يسبب المستحضر مشاكل في كلى الجنين، مما قد يؤدي إلى قلة السائل الأمنيوسي المحيط بالطفل (قلة السائل السلوي)، أو إلى تضيق إحدى الأوعية الدموية (ductus arteriosus) في قلب الجنين. قد يحدث هذا العرض قريباً لموعد بدء العلاج ب كارتيا وي غالب ما يكو قابل للعكس عند إيقاف العلاج بالمستحضر. إذا تم تخصيص قلة السائل الأمنيوسي أو تضيق الأوعية الدموية في قلب الجنين، فيجب إيقاف العلاج ب كارتيا فوراً. إذا كنت بحاجة إلى علاج لأكثر من بضعة أيام، فقد يوصي الطبيب بمراجعة حثيثة أكثر (مع التشديد على كمية السائل الأمنيوسي والأوعية الدموية في قلب الجنين).

في الثلث الأخير

خلال الثلث الأخير من الحمل، لا يجوز تناول حمض أسيتيل ساليسيليك، المادة الفعالة في كارتيا، بمقدار دوائي يزيد عن 150 ملغ لليوم، وذلك بسبب خطورة حدوث إحتلالات لدى الأم والطفل قبل وأثناء الولادة (بما في ذلك خطورة زائدة لحدوث إجهاض وتشوهات خلقية معينة؛ أنظر أيضاً فقرة "لا يجوز إستعمال الدواء إذا").

خلال الثلث الأخير من الحمل، بالإمكان تناول كارتيا بمقدار دوائي قدره حتى 150 ملغ لليوم، بتعليمات من الطبيب فقط.

الإرضاع

إن حمض أسيتيل ساليسيليك ومستقلاباته تنتقل بكميات قليلة إلى حلب الأم. لم يُبلَع حتى يومنا هذا عن أية تأثيرات سلبية على الرضيع ولذلك لا حاجة بالتوقف عن الإرضاع طالما أن المقدار الدوائي اليومي لا يزيد عن 150 ملغ. مع ذلك، عند إستهلاك مقادير دوائية أكبر (أعلى من 150 ملغ لليوم) يجب التوقف عن الإرضاع.

السياقة وإستعمال الماكينات

لا حاجة بإتخاذ وسائل حذر خاصة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على أقل من 1 ميليغرام صوديوم (23 ملغ) في كل قرص، وبذلك يعتبر "خالٍ من الصوديوم".

3) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستياضح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو: قرص واحد لليوم.

يجب تناول القرص الأول وفق اليوم المُعلم به لظهر اللوحة (بليستر).

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

مدة العلاج

كارتيا مخصص للإستعمال طويل الأمد. يتوجب على الطبيب المعالج تحديد مدة العلاج.

طريقة تناول

يجب بلع القرص بشكله الكامل مع الكثير من الماء قبل وجبة الطعام بنصف ساعة على الأقل.

منوع سحق، مضغ أو شطر القرص وذلك لأن الدواء ذو تغليف معوي (واقتي).

لا يجوز إبقاء الدواء في الفم بما يتجاوز الزمن اللازم للبلع.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إن الدوار وربوين الأذنين يمكن أن تكونا علامتين لحدوث تسمم خطير، خاصة لدى الأطفال والمرضى المسنين، يجب إبلاغ الطبيب فوراً إذا كنت تظن بأنك تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً. سوف يقرر الطبيب حول أية وسائل يجب إتخاذها بحسب درجة المقدار الدوائي المفرط الذي تم تناوله.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدّد، فيجب مواصلة تناول المقدار الدوائي بحسب التناول في الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء؟". أو كما حدّد من قبل الطبيب، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول مقداري الدواء فوق التعويض عن المقدار الدوائي المنسي.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول كارتيا بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزّم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كارتيا قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أبأ منها.

إذا كنت تقاسمي من إحدى الأعراض الجانبية المُفضّلة لاحقاً، توقف عن تناول كارتيا وبلغ الطبيب، وذلك لكي يكون بمقدوره تقييم درجة خطورة الأعراض الجانبية وإتخاذ القرار حول كيفية التصرف.

يجب التوقف عن إستعمال كارتيا فوراً عند ظهور علامات أوليّة لفرط الحساسية (أنظر لاحقاً أعراض جانبية نادرة).

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10):

● مشاكل في المعدة وفي الأمعاء مثل حرقان، غثيان وتقيؤات، آلام في البطن، وإسهال ● فقدان دم طفيف من المعدة ومن الأمعاء.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100):

● ردود فعل جلدية [في حالات نادرة جداً، من الجائز حدوث إهتياج حاد لطفح جلدي مع مشاركة للأغشية المخاطية وسخونة (Erythema exsudativum multiforme)] ● نزف في المعدة وفي الأمعاء. إن الإستعمال المطول ب كارتيا قد يؤدي لحدوث فرم (باعتبار قلة الحديد) نتيجة فقدان دم خفي في المعدة وفي الأمعاء ● تقرحات في المعدة وفي الأمعاء، التي قد تؤدي في حالات نادرة جداً لحدوث نتفب ● التهاب في المعدة وفي الأمعاء.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تتلاحظ برآزاً أسوداً أو تقيؤاً دمويّاً (علامات لنزف جدي في المعدة، الرجاء أنظر لاحقاً بند "إجراءات مضادة").

أعراض جانبية نادرة (أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000):

● ردود فعل لفرط الحساسية في الجلد، في الجهاز التنفسي، في المعدة وفي الأمعاء وفي جهاز القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى مرضى الربو. الأعراض يمكن أن تكون: إنخفاض ضغط الدم، نوبات من صعوبة التنفس، إتهاب مخاطية الأنف، إنسدال الأنف، صدمة تاقية (رد فعل تحسسي شديد وخطير)، إنتفاخ الوجه، السنان والحنجرة (وذمة وعائية).

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10,000):

● إرتفاع في قيم أنزيمات الكبد ● خلل في الأداء الوظيفي للكلى وقصور كلوي حاد ● إنخفاض نسب السكر في الدم (hypoglycemia) ● في المقادير الدوائية المنخفضة يقلل حمض أسيتيل ساليسيليك من طرح حمض البول. هذه الحالة يمكن أن تحدث على حدوث نوبة تفرس (gout) في ظروف معينة لدى مرضى لديهم ميل مُسبق لحدوث ذلك.

أعراض جانبية لا يعرف شيوعها المصنوب:

صداغ، دوار، إرتباك، تناقص في السمع أو طنين (ردين في الأذنين) يمكن أن تكون علامات لفرط المقدار الدوائي، خاصة لدى الأطفال والمتعالجين المسنين (أنظر "إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر") ● بلُغ عن حدوث حالات لأنزفة خطيرة مثل نزف في الدماغ (خاصة لدى مرضى فرط ضغط الدم غير المراقب و/أو بالعلاج المشترك مع مضادات التخثر). يُعَصّد بيلاقات ذات شيوع نادر حتى نادر جداً، حيث أن بعض الحالات شكّت خطراً على الحياة ● تفكك متسارع أو إنحلال خلايا الدم الحمراء وفقر الدم من نوع معيّن لدى المرضى الذين يعانون من نقص شديد في جلوكوز - 6 - فوسفات - ديهيدرو جيناز (G6PD) ● نزف: رعااف، نزف من اللثة، نزف جلدي أو أنزفة في المسالك البولية والأعضاء التناسلية، ومن الجائز أن تحدث إهالة في زمن النزف. يمكن أن يستمر هذا العرض 4 حتى 8 أيام بعد الإستعمال ● عند وجود ضرر في مخاطية الأمعاء، قد تتشكل أششية في جوف الأمعاء التي قد تؤدي إلى حدوث تضيق.

إجراءات مضادة:

يجب التوقف عن تناول كارتيا إذا كنت تشعر بالأعراض المذكورة أعلاه وإبلاغ الطبيب الذي سيرقر حول أية من الإجراءات يجب إتخاذها، وفقاً لشدة العرض الجانبي. يجب التوقف عن تناول كارتيا بشكل دائم عند ظهور العلامة الأولى التي تدل على رد فعل لفرط حساسية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمّت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ الشركة بوساط العنوان التالي: Padagis.co.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو المريض، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب ● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر ● لا يجوز الإستعمال إذا كانت العبوة مزقة أو مطبوعة ● شروط التخزين: يجب التخزين دون 25 درجة مئوية ● لا يجوز لقاء أدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية، إرسال الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. لتسامع هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمُركّب الفعّال أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:

Guar gum, Talc, Methylacrylic acid copolymer, Hypromellose 6cp, Titanium dioxide, Polyvinyl alcohol, PEG 3350, Triethyl citrate, FD&C Yellow #6, Triacetin, Colloidal anhydrous silica, Sodium bicarbonate, Sodium lauryl sulfate.

● كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة: كارتيا عبارة عن قرص برتقالي اللون ذو تغليف معوي (واقتي). الأقراص متوفرة ضمن عبوة لويحة (بليستر) التي تحتوي على 28 قرصاً ● صاحب الإمتياز وعنوانه: وكالات باداجيس إسرائيل م.ض، شارع راكيفيت 1، شوم ● إسم المنتج وعنوانه: أسين فارما Pty م.ض، داندونج، فيكتوريا، أستراليا ● تم إعادتها في 2024 ● رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 5089.26384 ● من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المُكْر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.