

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא.

החומר הפעיל וריכוזו: פובידון יודין 10% Povidone Iodine

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

תרופה זו מיועדת לחיטוי פצעים וכוויות קלות ולטיפול בזיהומי עור.

• **קבוצה תרפויטית:** חומרים אנטיספטיים (מחטאים).

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

אין להשתמש אם אתה רגיש (אלרגי) לאחד ממרכיבי התכשיר או ליוד.

אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם הנך לוקח, או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.
- יש להימנע משימוש על אזורים נרחבים של העור. יש להיוועץ ברופא לפני הטיפול בפצעים עמוקים.
- אין להשתמש מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).
- **הריון והנקה:** אם הנך בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

שים לב: לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש בתכשיר – הוראות כלליות:

- למרוח על פצע או האזור המטופל 2-4 פעמים ביום.
- ניתן למרוח גם על גזה ולכסות בתחבושת.
- אם לא חל שיפור במצב תוך שבוע ימים יש לפנות לרופא.
- כתמים על הגוף או על בד כותנה ניתן לנקות ע"י שטיפה במים.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל את התרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

4. תופעות לוואי:

• כמו בכל תרופה, השימוש בפולידין משחה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

• בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: פריחה, גירוי, או נפיחות מתמשכים.

• אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי: ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות

לוואי, או ע"י כניסה לקישור <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• ניתן להשתמש עד 36 חודשים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.

• יש לאחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף

• נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:
PEG 400, PEG 4000, Purified Water, Trisodium Phosphate

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?
משחה בצבע חום כהה, ריח אופייני של יוד, תכולה 15 גרם, 50 גרם.

• בעל הרישום: פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ, רחוב בר יוחאי 9,
בני ברק 5155309 או ת.ד. 39071, ת"א 6139001.

• שם היצרן וכתובתו: בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב,
ד.נ משגב 20174.

• פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך נובמבר 2014 ועודכן בהתאם להוראות
משרד הבריאות בתאריך דצמבר 2023.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 116.74.23415

• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.