

**Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами (препараты) - 1986**

Препарат отпускается без рецепта врача

# «Аф Типонет» – солевой раствор для младенцев Назальные капли

## Состав:

Натрия хлорид 0,9% м/об (Sodium Chloride 0,9% w/v).

Перечень неактивных компонентов и аллергенов в препарате приведен в разделе 2 «Важная информация о некоторых ингредиентах препарата», а также в разделе 6 «Дополнительная информация».

**Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед приёмом препарата.** Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Применяйте данный препарат согласно указаниям в разделе 3 данной инструкции – «Способ применения и дозы».

Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация. Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) обострились или если не наблюдается улучшения после 3 дней применения препарата.

## 1. Показания к применению:

Препарат предназначен для облегчения заложенности носа у детей и младенцев.

**Терапевтическая группа:** препараты для назального применения

**Медицинское воздействие:** увлажняет слизистую носа и тем самым облегчает отделение слизи и ее удаление из носа.

## 2. Перед применением препарата

**Противопоказания к применению препарата:**

Гиперчувствительность (аллергия) на активное вещество или на любой из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате (см. раздел 6 «Дополнительная информация»).

**Особые предостережения относительно использования препарата:**

**Перед применением препарата «Аф Типонет» – солевой раствор для младенцев, предупредите врача, если**

вы или ваш ребенок страдает / страдали в прошлом нарушением функции сердца и/или сосудов, нарушением функции печени или повышенным артериальным давлением.

**Дополнительные предостережения:**

Не применяйте препарат часто, а также на протяжении длительного времени, без консультации с врачом. До начала приёма препарата сообщите врачу, если у вас / у вашего ребенка имеется гиперчувствительность к какому-либо продукту питания или лекарственному препарату.

Не следует применять препарат, если цвет раствора изменился, либо раствор помутнел. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

**Если вы принимаете другие лекарственные препараты, включая препараты, продаваемые без рецепта, и биодобавки, или если недавно закончили лечение другим лекарством, сообщите об этом врачу или фармацевту.**

**Важная информация о некоторых ингредиентах препарата:**

Препарат содержит бензалкония хлорид (Benzalkonium Chloride), который может вызвать раздражение или отечность в полости носа, в особенности при длительном курсе приема. Лекарство содержит 0,01 мл бензалкония хлорида на каждые 100 мл – т. е., концентрация составляет приблизительно 0,0001 мл/мл.

## 3. Способ применения и дозы

При возникновении сомнений касательно дозировки и способа применения препарата проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Принятая дозировка:

по 2 капли в каждую ноздрю, 1-4 раз в день.

**Не превышать рекомендуемую дозу.**

Если нет улучшения состояния после 3 дней применения, следует обратиться к врачу.

**Прием препарата:**

**Не глотать!** Препарат предназначен исключительно для наружного использования.

**Способ применения:**

- Осторожно высморкайтесь.
- Откиньте голову ребенка назад или положите ребенка и наклоните его голову в сторону.

- Закапайте капли в каждую ноздрю. Оставьте голову запрокинутой на несколько минут, чтобы лекарство распределилось по носовой полости.

Во избежание распространения инфекции не следует использовать тот же флакон для другого человека.

**Лекарства нельзя принимать в темноте! При каждом применении препарата проверьте его название и дозировку на упаковке. Если нужно, надевайте очки.**

**Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.**

## 4. Побочные эффекты

Как и при применении любого другого препарата, использование препарата «Аф Типонет» – солевой раствор для младенцев может вызвать побочные эффекты у некоторых людей. Не пугайтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, вам не придется столкнуться ни с одним из них.

**Прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к врачу при появлении следующих очень редких побочных явлений:**

- повышение кровяного давления (может проявляться покраснением лица);
- сыпь или локальное воспаление, которых не было до начала применения препарата.

**Другие побочные эффекты:**

сыпь, раздражение или жжение в носу. **В случае появления или обострения какого-либо из побочных явлений, либо проявления иного, не указанного в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.**

**Извещения о побочных эффектах**

Сообщить о побочных эффектах в министерство здравоохранения можно, заполнив форму отчета о побочных эффектах по ссылке «Отчет о побочных эффектах в результате медикаментозного лечения» на домашней странице веб-сайта Министерства здравоохранения ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)), или по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. Как хранить препарат?

- Не допускайте отравления! Во избежание отравлений данный препарат, как и все другие лекарства, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и находящемся вне их поля зрения. Не следует вызывать рвоту, не получив на то прямого указания от врача.

- Недопустимо использовать препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

**Условия хранения:**

- Хранить в прохладном месте, при температуре ниже 25°C.
- После первичного вскрытия упаковки можно использовать препарат не более месяца и не позднее истечения срока годности, указанного на упаковке.
- Не следует принимать препарат, если цвет раствора изменился, либо раствор помутнел.

## 6. Дополнительная информация

**Помимо действующего вещества препарат содержит также:**

Purified Water, Benzalkonium Chloride Solution. **Как выглядит препарат и содержимое упаковки?**

Флакон, содержащий прозрачный бесцветный раствор.

**Утвержденные расфасовки:** 20 мл.

**Производитель и держатель лицензии:** Бен Шимон Флориш ЛТД, Индустриальный парк Мисгав. Почтовый ящик Мисгав 2017400, Израиль.

Данная инструкция была отредактирована 09/2024 в соответствии с предписаниями Министерства здравоохранения.

**Регистрационный номер лекарственного препарата в государственном реестре Министерства здравоохранения:**

134-08-31368-00