

## لقاحات

يجب التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي إذا تلقيت مؤخراً لقاحاً أو إذا كنت تخطط لتلقي لقاح - وذلك لأن بعض اللقاحات الحية (مثلاً، زوستافاكس® (Zostavax) لا يوصى بها قبيل بدء استعمال سيبيبنكو أو في أثناء استعماله.

## خطورة حدوث خثرات دموية في الأوردة أو في الرئتين:

يجب التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي إذا:

- شعرت بضيق مفاجئ في التنفس أو صعوبة في التنفس، ألم في الصدر أو ألم في الجزء العلوي من الظهر، انتفاخ في الرجل أو الذراع، ألم أو مضمض في الرجل، احمرار أو تغير في لون الرجل أو الذراع، لأن هذه قد تكون علامات لحدوث خثرات دموية في الأوردة.

## خطورة حدوث مرض قلبي:

يجب التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي قبل وأثناء العلاج إذا:

- تطور لديك ألم شديد في الصدر أو ضغط في الصدر (الذي قد ينتشر إلى الذراعين، الفك، الرقبة والظهر)، ضيق في التنفس، تعرّق بارد، شعور بدوخة أو دوام مفاجئ، لأن هذه قد تكون علامات على نوبة قلبية.

## خطورة الإصابة بالسرطان:

لوحظ سرطان الجلد غير الميلانوما لدى المتعالجين الذين تناولوا سيبيبنكو. قد يوصي الطبيب بإجراء فحوصات روتينية للجلد أثناء تناول سيبيبنكو. إذا ظهرت آفات جلدية جديدة أثناء العلاج أو بعده، أو إذا غيّرت الآفات الموجودة مظهرها، يجب إبلاغ الطبيب.

## فحوصات مخبرية

يجب عليك إجراء فحوصات مخبرية (بما في ذلك فحص نسبة الكوليسترول المرتفعة) بناء على تعليمات الطبيب قبل بدء العلاج بـسيبيبنكو وأثناء تناوله، من الممكن أن يغير طبيبك العلاج وفقاً لذلك. لا تناول سيبيبنكو إذا كان عدد الخلايا الليمفاوية أو العدلات، أو الهيموغلوبين أو الصفائح الدموية منخفضاً جداً.

## منع الحمل والحمل

لا يجوز استعمال سيبيبنكو أثناء الحمل أو أثناء الإرضاع.

إذا كنت امرأة يمكنك أن تحملي، عليك استعمال وسيلة ناجعة لمنع الحمل أثناء العلاج بـسيبيبنكو ولمدة شهر آخر على الأقل بعد تناول آخر جرعة دوائية من سيبيبنكو. تحدثي مع الطبيب بخصوص وسائل منع الحمل المناسبة أخبري الطبيب على الفور إذا كنت حاملاً أو

إذا كنت تعتقدين أنك أصبحت حاملاً أثناء العلاج.

## التبليغ عن أعراض جانبية

من الممكن التبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال نموذج التبليغ عن أعراض جانبية الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

أو من خلال الدخول على الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

أيضاً يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لفايزر عن طريق البريد الإلكتروني: [isr.aereporting@pfizer.com](mailto:isr.aereporting@pfizer.com)

هذه البطاقة ومحتواها تمت المصادقة عليهما من قبل وزارة الصحة في آب 2024.

بطاقة معلومات  
السلامة لمعالجة  
CIBINQO سيبيبنكو

50 ملغ، 100 ملغ، 200 ملغ  
(أبروسيتينيب (Abrocitinib)



## حاملة/ة هذه البطاقة يتلقى العلاج بسيبينكو (CIBINQO)

اسم المتعالج/ة:

تاريخ الميلاد:

اسم الطبيب/ة (الذين وصفوا سيبينكو):

رقم هاتف الطبيب/ة:

تاريخ بدء العلاج بسيبينكو:

المقدار الدوائي:

## معلومات السلامة للمتعالجين حول سيبينكو (Cibinqo):

- تحتوي هذه البطاقة على معلومات مهمة حول الأمان التي عليك أن تعرفها قبل وأثناء العلاج بسيبينكو.
- لمعلومات إضافية، اقرأ النشرة للمستهلك المرفقة في كل علبة من سيبينكو.
- يجب استشارة الطبيب/ة أو الصيدلي/ة إذا كانت هنالك أية معلومات غير واضحة.
- يجب عليك حمل البطاقة معك وأن تريها لكل فرد مهني من الطاقم الطبي المشارك بالعلاج الطبي، مثلاً، الصيدالدة أو أطباء الطوارئ. يجب الاحتفاظ بهذه البطاقة معك لمدة شهرين آخرين على الأقل بعد تناول آخر جرعة دوائية من سيبينكو.

2

## ما هو سيبينكو ولأي غرض هو مخصص:

يحتوي سيبينكو (Cibinqo) على المادة الفعالة أبروسيتينيب (Abrocitinib)، وهو ينتمي إلى مجموعة الأدوية التي تسمى مثبطات جانوس كيناز، والتي تساعد في تقليل الالتهاب. هو يعمل عن طريق تقليل نشاط إنزيم في الجسم يعرف باسم "جانوس كيناز" الذي يساهم في الالتهاب.

سيبينكو مخصص لعلاج البالغين المصابين بالتهاب الجلد التأتبي (يُسمى أيضاً الإكزيما التأتبية) بدرجة متوسطة-شديدة المرشحين للعلاج الجهازى. عن طريق تقليل نشاط إنزيمات جانوس كيناز، يخفف سيبينكو من الحكة والتهاب الجلد. هذه العملية يمكن أن تقلل من اضطرابات النوم والتداعيات الأخرى للإكزيما التأتبية مثل القلق أو الاكتئاب وتحسن جودة الحياة بشكل عام.

3

## كيفية تناول سيبينكو:

- الجرعة الأولية الموصى بها هي 100 ملغ أو 200 ملغ مرة واحدة في اليوم، حسب ما وصفه الطبيب.
- يمكن للطبيب زيادة المقدار الدوائي أو تقليله حسب نجاعة الدواء. يحتاج بعض المرضى إلى جرعة أولية أقل، وقد يعطيك طبيبك جرعة أولية قدرها 100 ملغ مرة واحدة في اليوم إذا كان عمرك 65 عاماً أو أكبر، أو إذا كان لديك ماضي طبي معين أو حالة طبية معينة. يوصى أيضاً بتخفيض الجرعة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى.
- قد يقرر طبيبك إيقاف العلاج بسيبينكو إذا لم يتجح معك في غضون 24 أسبوعاً.
- يجب ملاءمة المقدار الدوائي من سيبينكو إذا تم وصف أدوية أخرى معينة لك. بالإضافة إلى ذلك، يجب إيقاف العلاج بشكل دائم أو مؤقت إذا أظهرت اختبارات الدم انخفاض

4

تعداد الهيموغلوبين، خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية.

- عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، إذا كانت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلى وبشأن أي تغيير في حالتك الطبية.
- إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص: إذا فوتت جرعة، تناولها لحظة تذكرك ذلك، إلا إذا عليك تناول الجرعة التالية خلال أقل من 12 ساعة. إذا بقيت أقل من 12 ساعة حتى الجرعة التالية، تخط الجرعة التي فوتتها وتناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد. لا يجوز تناول جرعة مزدوجة للتعويض عن جرعة تم تفويتها.
- عليك معرفة أعراض جانبية معينة والمسائل المفصلة أدناه. عليك إبلاغ طبيبك إذا كانت لديك أية أعراض جانبية:

5

## خطورة حدوث حالات عدوى

- يجب التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي قبل وأثناء العلاج بسيبينكو إذا:
- كانت لديك أعراض مثل سخونة، قروح، تشعب بالإرهاق أكثر من المعتاد أو لديك مشاكل في الأسنان، لأن تلك قد تكون علامات لعدوى.

6