

כרטיס מידע בטיחותי למטופל בקסלג'אנז XELJANZ®



במהלך הטיפול בקסלג'אנז ולפחות
במשך 4 שבועות לאחר המנה האחרונה.
• אין להניק במהלך הטיפול בקסלג'אנז.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד
הבריאות באמצעות הפורטל לדיווח תופעות
לוואי אשר נמצא בדף הבית של אתר משרד
הבריאות: www.health.gov.il או על ידי
כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

ניתן לדווח על תופעות לוואי גם לפיזור
במייל: isr.aereporting@pfizer.com

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה כרטיס
זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה
מיועדת לבני שני המינים.

כרטיס זה אושר בהתאם להוראות משרד
הבריאות באוגוסט 2024.

- מבחין בגידול חדש על העור או בכל
שינוי בשומות או נקודות קיימות.
- מפתח תסמינים של מחלת ריאה
אינטרסטיציאלית (interstitial lung
disease) כמו קוצר נשימה.
- מפתח סימנים ותסמינים בטניים כמו
כאבים בקיבה, כאבי בטן, דם בצואה,
או כל שינוי בהרגלי היציאות המלווים
בחום.
- מפתח עור צהוב, בחילות או הקאות.
- מתכנן לקבל חיסון כלשהו. ישנם סוגים
מסוימים של חיסונים שאסור לקבל
במהלך הטיפול בקסלג'אנז.
- נכנסת להיריון או שמתכננת להיכנס
להיריון.
- אין להשתמש בקסלג'אנז במהלך
ההיריון. נשים בגיל הפוריות צריכות
להשתמש באמצעי מניעה יעילים



נושא/ת כרטיס זה מטופל/ת ב- XELJANZ®

שם המטופל/ת:

שם הרופא/ה:

מספר הטלפון של הרופא/ה:

תאריך התחלת הטיפול בקסלג'אנז:

1

כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב על קסלג'אנז.

אם המידע אינו ברור לך, אנא פנה לרופא או לרוקח בכדי שיסבירו לך. יש לשמור את הכרטיס ולהציג אותו לכל רופא או רוקח המעורבים בטיפול שלך.

אם אתה מפסיק ליטול קסלג'אנז, שמור את הכרטיס למשך חודשיים לפחות לאחר נטילת המנה האחרונה של קסלג'אנז.

למידע נוסף יש לקרוא את העלון לצרכן. יש להשתמש בקסלג'אנז בהתאם לעלון לצרכן.

דווח לרופא או לרוקח על כל התרופות שאתה נוטל, כולל תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם, ויטמינים ותוספי תזונה צמחיים. נטילת קסלג'אנז יחד עם תרופות מסויימות אחרות עלולה להגדיל את הסיכון לתופעות לוואי, לדיכוי מערכת החיסון ולזיהומים.

2

הטיפול בקסלג'אנז עלול להגדיל את הסיכון לזיהומים, ממאירויות (כולל סרטן ריאות, לימפומה וסרטן עור שאינו מלנומה).

מטופלים בני 65 ומעלה עלולים להיות בסיכון גבוה לזיהומים, התקף לב ולסוגים מסויימים של סרטן. יתכן שהרופא יחליט שקסלג'אנז לא מתאימה לך.

פנה מייד לרופא אם את/ה:

- מפתח קוצר נשימה פתאומי או קשיי נשימה, כאבים בחזה או בגב העליון, נפיחות ברגל או בזרוע, כאב או רגישות ברגל, או אדמומיות או שינוי צבע ברגל או בזרוע בזמן נטילת קסלג'אנז, מאחר שאלה עשויים להיות סימנים של קריש בריאות או בוורידים.
- מפתח תסמינים של זיהום כמו חום, שיעול מתמשך, ירידה במשקל או עייפות יתר.

3

• מפתח תסמינים של שלבקות חוגרת (הרפס זוסטר), כמו שלפוחיות או פריחה כואבות על העור.

• היית במגע קרוב עם אדם החולה בשחפת.

• מפתח כאבים עזים או לחץ בחזה (שעלולים להתפשט לזרועות, ללסת, לצוואר, לגב), קוצר נשימה, זיעה קרה, תחושה שאתה עומד להתעלף או סחרחורת פתאומית מאחר שאלו עלולים להיות סימנים של התקף לב.

• מפתח נפיחות של בלוטות הלימפה בצוואר, בבית השחי או במפשעה, מרגיש עייף באופן קבוע, מפתח חום, מזיע בלילה, יש לך שיעול מתמשך או שהוא מחמיר, מפתח קשיי נשימה, צרידות או צפצופים, או ירידה לא מוסברת במשקל.

4