

بطاقة معلومات السلامة للمعالجة  
بـ كسيلجانز  
XELJANZ®



## التبليغ عن أعراض جانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال بوابة التبليغ عن أعراض جانبية الموجودة على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة:

[www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

أو عبر تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

أيضاً يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لشركة فايزر عن طريق البريد الإلكتروني:

[isr.aereporting@pfizer.com](mailto:isr.aereporting@pfizer.com)

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تمت الموافقة على هذه البطاقة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة في آب 2024.

- كنت تخطط لتلقي لقاح أياً كان. هناك أنواع معينة من اللقاحات التي يُمنع تلقيها أثناء العلاج بـ كسيلجانز.
- حصل لديك حمل أو تخططين للحمل.
- لا يجوز استعمال كسيلجانز أثناء الحمل. تحتاج النساء في سن الخصوبة إلى استعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل أثناء العلاج بـ كسيلجانز ولمدة 4 أسابيع على الأقل بعد آخر جرعة.
- لا يجوز الإرضاع أثناء العلاج بـ كسيلجانز.



## حامل/ة هذه البطاقة يتعالج/ تعالج بـ XELJANZ®

اسم المتعالج/ة:

اسم الطبيب/ة:

رقم هاتف الطبيب/ة:

تاريخ بدء العلاج بـ كسيلجانز:

تحتوي هذه البطاقة على معلومات سلامة مهمة حول كسيلجانز.

إذا لم تكن المعلومات واضحة بالنسبة لك، يرجى الاتصال بالطبيب أو الصيدلي حتى يتمكن من شرحها لك. يجب حفظ البطاقة وعرضها لأي طبيب أو صيدلي ضالع في علاجك.

إذا توقفت عن تناول كسيلجانز، احتفظ بالبطاقة لمدة شهرين على الأقل بعد تناول الجرعة الأخيرة من كسيلجانز.

لمزيد من المعلومات، اقرأ نشرة المستهلك. يجب استعمال كسيلجانز وفقاً لنشرة المستهلك.

**أخبر طبيبك أو الصيدلي عن جميع الأدوية التي تتناولها،** بما في ذلك الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، فيتامينات والمكملات النباتية. قد يؤدي تناول كسيلجانز مع بعض الأدوية الأخرى إلى زيادة خطورة حدوث أعراض جانبية وتثبيط جهاز المناعة وحدوث حالات عدوى.

قد يزيد العلاج بكسيلجانز من خطر الإصابة بحالات العدوى، الأورام الخبيثة (بما في ذلك سرطان

الرئة وسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان جلد ليس ميلانوما).

قد يكون المتعالجون الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر، بخطر أعلى للإصابة بحالات عدوى، نوبة قلبية وأنواع معينة من السرطان. قد يقرر طبيبك أن كسيلجانز غير مناسب لك.

اتصل بالطبيب على الفور إذا كنت:

- تطور ضيق مفاجئ في التنفس أو صعوبة في التنفس، آلام في الصدر أو الجزء العلوي من الظهر، انتفاخ في الرجل أو الذراع، ألم أو تحسس في الرجل، أو احمرار أو تغير في لون الرجل أو الذراع أثناء تناول كسيلجانز، لأن هذه قد تكون علامات على وجود خثرة دموية في الرئتين أو الأوردة.

- ظهور أعراض التلوث مثل سخونة، سعال مستمر، تناقص الوزن، أو تعب مفرط.

- ظهور أعراض القوباء المنطقية (الهربس النطاقي)، مثل حويصلات مؤلمة أو طفح مؤلم على الجلد.

- لقد كنت على اتصال وثيق مع شخص مصاب بالسل.

- تطورت لديك آلام شديدة أو ضغط في الصدر (والذي قد ينتشر إلى الذراعين، الفك، الرقبة، الظهر)، ضيق في التنفس، عرق بارد، شعور وكأنك على وشك الإغماء أو دوار مفاجئ لأن هذه قد تكون علامات نوبة قلبية.

- تطور تورم في الغدد الليمفاوية في العنق، الإبطن أو الأربية، تشعر بالتعب على الدوم، تطور سخونة، تعرق في الليل، تعاني من سعال مستمر أو متفاقم، تطور صعوبة في التنفس، بحة في الصوت أو صفير، أو فقدان الوزن غير المبرر.

- تلاحظ نمو جديد على الجلد أو أي تغيير في الشامات أو نقاط موجودة.

- ظهور أعراض مرض الرئة الخلالي (interstitial lung disease) مثل ضيق التنفس.

- ظهور علامات وأعراض بطنية مثل آلام في المعدة، آلام في البطن، وجود دم في البراز، أو أي تغيير في عادات الأمعاء مصحوباً بسخونة.

- تطور لديك اصفرار في الجلد، غثيان أو تقيؤات.