

©2024 Селджин ЛТД, компания из группы Бристол Майерс Сквиб.
Абекма® - это торговый знак Селджин ЛТД.



Абекма® (идекабтаген виклейцел) Карточка для пациента

ABECMA® (IDECABTAGENE VICLEUCEL)

Абекма®

(идекабтаген виклейцел)

Карточка для пациента



Следует всегда носить эту карточку с собой. Предъявляйте ее каждому врачу/члену медперсонала, ухаживающего за вами, включая экстренные случаи.

Сообщайте каждому врачу/члену медперсонала, ухаживающего за вами, что вы получаете лечение препаратом Абекма.

В течение не менее 4 недель после получения препарата Абекма вам следует планировать таким образом, чтобы вы находились поблизости (в пределах двух часов езды) от медицинского центра, в котором вы получили лечение.

Данная карточка и ее содержание одобрены Министерством здравоохранения в октябре 2024 года

2012-IL-2400009 10/24

Я получал лечение препаратом Абекма

Важные контактные данные (записываются печатными буквами)

Мое имя и фамилия:

Имя и фамилия врача, предоставившего мне лечение препаратом Абекма:

Телефон и часы приема клиники/больницы:

Телефон для экстренных случаев/после часов приема:

Название больницы:

Дата инфузии препарата Абекма (укажите день, месяц и год):

Номер партии (печатью):

Информация для врача/члена медперсонала

Этот пациент получил аутологичную иммунотерапию, CAR Т-клеточную терапию на основе генетически модифицированных Т-клеток, нацеленных на антиген ВСМА (B-Cell Maturation Antigen). После лечения препаратом Абекма может развиться синдром высвобождения цитокинов (СВЦ) и/или неврологическая токсичность, включая синдром нейротоксичности ICANS (immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome), что может привести к летальному исходу или представлять угрозу для жизни. Синдром высвобождения цитокинов может поражать любую систему органов. Дополнительные побочные явления могут включать цитопению, гипогаммаглобулинемию и инфекционные процессы.

Следует немедленно связаться с лечащим врачом пациента, специалистом по лечению препаратом Абекма, для получения дополнительной информации.

Следует ознакомиться с инструкцией для врача и инструкцией по применению препарата Абекма на веб-сайте Министерства здравоохранения по адресу: <https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug>

Данная карточка и ее содержание одобрены Министерством здравоохранения в октябре 2024 года

2012-IL-2400009 10/24

Вы можете сообщить о побочных явлениях в Министерство здравоохранения с помощью электронного бланка для отчета о побочных явлениях на главной странице веб-сайта Минздрава: www.health.gov.il или перейдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

Можно также сообщить о побочных явлениях в компанию BMS по телефону: 1809-388054 (бесплатный номер) или по электронной почте: MedInfo.Israel@bms.com

Информация для пациента

Абекма может вызывать серьезные или опасные для жизни побочные явления

Немедленно позвоните лечащему врачу, специалисту по лечению препаратом Абекма, или в приемное отделение больницы в случае появления одного или нескольких следующих симптомов:

Неврологические побочные явления

Симптомы неврологической токсичности типа ICANS:

- дезориентация
- нарушения памяти
- затруднённая или замедленная речь
- затрудненное понимание речи
- потеря равновесия или координации
- неспособность ориентироваться
- потеря концентрации внимания (понижение уровня сознания), чрезмерная сонливость
- потеря сознания
- делирий
- судороги

Синдром высвобождения цитокинов (СВЦ)

- Жар
- Озноб
- Затрудненное дыхание
- Головокружение или ощущение вращения
- Тошнота
- Головная боль
- Учащенный ритм сердца
- Пониженное артериальное давление
- Сильная усталость

Инфекции

- Жар
- Озноб или дрожь
- Кашель
- Одышка
- Учащенное дыхание
- Учащенный пульс

Кроме того, тремор, слабость с потерей подвижности одной стороны тела, дрожь, замедленные или скованные движения – могут быть симптомами паркинсонизма.

Для получения дополнительных копий данной карточки для пациента свяжитесь с компанией BMS в Израиле по телефону 03-5231021, по факсу 03-9226896 или по электронной почте: Office_IL@bms.com