

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

תרודנט שטיפת פה

0.2% w/v

חומר פעיל

כלורהקסידין גלוקונאט 0.2% w/v chlorhexidine gluconate

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

- לעיכוב היווצרות פלאק
 - כעזר לטיפול בדלקת חניכיים ומניעתה (ג'ינג'יביטיס)
 - כעזר בשמירה על היגיינת הפה
 - לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי החניכיים
 - לשימוש בכיבים, בדלקות עקב שיניים תותבות ובפטרת בפה
- קבוצה תרפויטית: אנטיספטי (נגד זיהום)

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל כלורהקסידין גלוקונאט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 12 אלא בהמלצת רופא.
- יש להשתמש בחלל הפה בלבד. אין לבלוע. שטוף ביסודיות במים אם התכשיר בא במגע עם העיניים או האוזניים.
- במקרה של תגובה אלרגית קשה, עליך להפסיק השימוש ולגשת מייד לקבלת עזרה. ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".
- משחות שיניים עלולות לפגום בפעילות של שטיפת הפה. לאחר צחצוח השיניים, שטוף את פיך ביסודיות עם מים והמתן 5 דקות לפני השימוש בתרודנט לשטיפת הפה. לחלופין, אתה יכול להשתמש בשטיפת הפה בזמן אחר של היום.
- אין להלבין בדים שהיו במגע עם שטיפת הפה.
- עלולה להופיע הכתמה זמנית של השיניים והלשון. ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".
- ייתכן שיחול שינוי בתחושת הטעם או שתורגש תחושת צריבה, עקצוץ או נימול בחלל הפה. ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".

ילדים ומתבגרים

התרופה מיועדת לשימוש במטופלים מעל גיל 12. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא לפני השימוש.

אינטראקציות/תגובות בין תרופות
אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון והנקה
ניתן להשתמש בתרופה אם את בהיריון או מיניקה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:
השתמש פעמיים ביום. מלא את כוסית המדידה עד לקו 10 מ"ל. שטוף את הפה ביסודיות למשך דקה אחת ולאחר מכן תירק.
דלקת חניכיים: מומלץ להשתמש במשך חודש.
כיבים בפה ופטרית פה: המשך להשתמש במשך 2 ימים לאחר החלמה.
דלקות פה עקב שיניים תותבות: נקה והשרה את התותבות בשטיפת הפה למשך 15 דקות פעמיים ביום.
לאחר ניתוחים דנטליים: לשטוף לפי הוראות רופא השיניים.

אם התסמינים נמשכים, **פנה לרופא.**
אין לעבור על המנה המומלצת.
אין לבלוע.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתרודנט שטיפת פה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בשטיפת הפה ולפנות מייד לעזרה רפואית אם מופיעה אצלך **פריחה, נפיחות בשפתיים, בלשון, בגרון או בפנים** או אם **יש לך קשיי נשימה**. תופעות אלה עלולות להיות תסמינים של תגובה אלרגית חמורה שהיא נדירה מאוד.

יש להפסיק את השימוש בשטיפת הפה ולפנות לרופא אם מופיע **גירוי בפה, כאב או נפיחות של פנים הלחיים**. תופעות אלו אמורות לחלוף עם הפסקת הטיפול.

תופעות לוואי נוספות:

- הכתמה זמנית של הלשון. התופעה נעלמת עם הפסקת הטיפול.
- הכתמה זמנית של השיניים. זו בדרך כלל ניתנת להסרה על ידי צחצוח. אתה יכול למנוע הכתמה באמצעות הימנעות משתיית תה, קפה או יין אדום - במיוחד שעה לאחר השימוש, ועל ידי צחצוח יומיומי במשחת שיניים (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?"). אם ההכתמה נותרת, היא ניתנת להסרה באמצעות ניקוי וליטוש אצל רופא השיניים או השיננית. אתה יכול לנקות את התותבות באמצעות חומר לניקוי תותבות.

- ייתכן שתבחין בשינוי בחוש הטעם, בתחושת צריבה, נימול, או עקצוץ בלשון כאשר אתה משתמש בשטיפת הפה לראשונה. זה בדרך כלל חולף עם המשך הטיפול.
- אם מתרחש קילוף של העור בתוך הפה, דלל את שטיפת הפה עם כמות שווה של מים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציננה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תימנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסן במקום קריר וחשוך.
- אחסן באריזה המקורית.
- אריזת 300 מ"ל: לשימוש עד 9 חודשים מהפתיחה.
- אריזת 50 מ"ל: לשימוש עד חודש מהפתיחה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Purified water, sorbitol 70% solution, alcohol, polysorbate 80, peppermint oil

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תמיסה שקופה, צלולה עד מעט עכורה, בריח מנטה. התרופה ארוזה בבקבוק פלסטיק עם מכסה עמיד בפני ילדים וכוסית מדידה. הבקבוק מכיל 300 מ"ל או 50 מ"ל של תמיסה. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

היצרן ובעל הרישום וכתובתו:

תרו תעשייה רוקחית בע"מ, רח' הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761.

נערך באוקטובר 2024.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 060-32-27698-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.